RELATO DE CASO - RELATO DE CASO

ABORDAGEM INICIAL DE CISTO DE UTRÍCULO EM LACTENTE: UM RELATO DE CASO.

Vitoria Rocha Amaral (vitoriaramaral97@gmail.com)

Raissa Valente Costa (raissa_valente@hotmail.com)

Fabrizia Reis Pinto Brandão (fabrizia93@hotmail.com)

Cleize Silveira Cunha (cunhacleize@gmail.com)

OBJETIVO: Relatar o caso de lactente com cisto de utrículo, raro na literatura médica. **METODOLOGIA:** análise qualitativa e descritiva de um relato de caso: **RESULTADOS:** Lactente B.L.R.S., um ano, 10,7 kg, apresentou, em 2018, quadro de ITU – Infecção do Trato Urinário. Após o tratamento inicial, realizou-se investigação anatômica das vias urinárias com Ultrassonografia (USG) e Uretrocistografia, obtendo o diagnóstico de Cisto de Utrículo. Iniciou profilaxia para ITU com sulfametoxazol + trimetoprim 2 ml por 5 meses, sem queixas. Por quatro meses não apresentou demais sintomas. Em março de 2019, paciente compareceu ao ambulatório, levado pela mãe, com história de febre (39,6°) e vômitos por quatro dias, a mesma relata ter procurado o pronto atendimento onde criança recebeu medicações para controle dos sintomas e foi realizada análise laboratorial de urina, a qual demonstrou hematúria, bacteriúria, com depósito de Escherichia coli. Em consulta pediátrica prescreveu-se antibioticoterapia a partir de análise de antibiograma em conjunto com ajuste da dose da profilaxia de acordo com peso. Paciente em espera para cirurgia de retirada do cisto. O utrículo prostático, um

remanescente embriológico, é uma evaginação na uretra prostática, com prevalência na faixa etária pediátrica e no sexo masculino. Origina-se no declínio do fator anti – mulleriano e na hipossensibilidade da testosterona, aos quais impedem a regressão do seio urogenital. Mediante associação com ITU recorrente, o cisto de utrículo é evidenciado por exames sensibilizadores de alterações anatômicas das vias urinárias, como USG e Uretrocistografia. O tratamento profilático preconizado para ITU recorrentes é o uso contínuo de sulfametoxazol + trimetropim. Entretanto, o tratamento definitivo neste caso, é a remoção cirúrgica do cisto via transvesical, o que melhora significativamente a qualidade de vida do paciente. **CONCLUSÃO:** A principal manifestação do cisto de utrículo é a ITU de repetição, dessa forma, a importância do diagnóstico precoce de tal patologia tem como finalidade prevenir e minimizar a formação e progressão da cicatriz renal, além de atenuar os sintomas referidos no paciente.