



**ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA**

**ALEITAMENTO MATERNO: CONSEQUÊNCIAS DO DESMAME PRECOCE E O  
PAPEL DA ENFERMAGEM: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA**

Ji-Paraná  
2020

**ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA**

**ALEITAMENTO MATERNO: CONSEQUÊNCIAS DO DESMAME PRECOCE E O  
PAPEL DA ENFERMAGEM: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA**

Artigo apresentado no curso de Enfermagem, na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso II, como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Enfermagem.

Orientador: Me. Francieli Carniel

Ji-Paraná  
2020

O48a

Oliveira, Adriana dos Santos

Aleitamento materno: consequências do desmame precoce e o papel da enfermagem: uma revisão bibliográfica / Adriana dos Santos Oliveira. Ji-Paraná: Centro Universitário São Lucas, 2020. 14 p. il.

Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário São Lucas, Curso de Enfermagem, Ji-Paraná, 2020.

Orientadora: Prof.<sup>a</sup>. Me. Francieli Carniel

1. Desmame Precoce. 2. Aleitamento Materno. 3. Assistência de Enfermagem. I. Carniel, Francieli. II. Aleitamento materno: consequências do desmame precoce e o papel da enfermagem: uma revisão bibliográfica. III. Centro Universitário São Lucas.

CDU: 618.63

Ficha catalográfica elaborada pelo bibliotecário José Fernando S Magalhães  
CRB 11/1091

**ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA**

**ALEITAMENTO MATERNO: CONSEQUÊNCIAS DO DESMAME PRECOCE E O  
PAPEL DA ENFERMAGEM: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA**

Artigo apresentado no curso de Enfermagem, na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso II, como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Enfermagem.

Orientador: Me. Francieli Carniel

Ji-Paraná, Rondônia \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020.

Resultado: ( ) Aprovado - ( ) Reprovado - Avaliação/Nota: \_\_\_\_\_

_____	Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná - UniSLJP
Titulação e Nome	
_____	Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná - UniSLJP
Titulação e Nome	
_____	Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná - UniSLJP
Titulação e Nome	

# ALEITAMENTO MATERNO: CONSEQUÊNCIAS DO DESMAME PRECOCE E O PAPEL DA ENFERMAGEM: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA<sup>1</sup>

Adriana Dos Santos Oliveira<sup>2</sup>  
Francieli Carniel<sup>3</sup>

Este estudo objetivou reunir os resultados de pesquisas sobre os fatores que influenciam no desmame precoce. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura cuja coleta e análise de dados foram realizadas nos meses de junho a agosto de 2020. Ao realizar o cruzamento dos descritores obteve-se um total de 3105 estudos, entre os anos de 2015 e 2020, estes passaram por um filtro e foram lidos manualmente, chegando ao total de 26 artigos. Os principais resultados desses artigos foram sintetizados em 3 (três) categorias temáticas para melhor compreensão do conteúdo proposto: Fatores relacionados ao recém-nascido, fatores relacionados aos pais e Fatores Externos. As variáveis envolvendo a criança foram: alterações fisiológicas no recém-nascido e a recusa do seio por parte da criança. Com relação aos pais, se destacou os fatores sociodemográficos, a idade materna e a crença do leite ineficiente. Já dentre as variáveis externas, o retorno ao trabalho ou estudo foi o predominante. Portanto, torna-se necessário o fortalecimento de ações comunitárias, reorientação dos serviços de saúde, orientações às nutrizes e na formação e articulação de redes de apoio a esta prática a fim de promover resultados que possam contribuir à promoção de saúde da mãe-filho.

**Palavras chaves:** Desmame Precoce; Aleitamento Materno; Assistência de Enfermagem.

## BREASTFEEDING: CONSEQUENCES OF EARLY WEANING AND THE ROLE OF NURSING: A BIBLIOGRAPHIC REVIEW

This study aimed to gather the results of research on the factors that influence early weaning. It is an integrative literature review whose data collection and analysis were carried out from June to August 2020. When crossing the descriptors, a total of 3105 studies were performed, between the years 2015 and 2020, these they passed through a filter and were read manually, reaching a total of 26 articles. The main results of the articles were summarized in 3 (three) thematic categories for a better understanding of the proposed content: Factors related to birth, factors related to parents and External Factors. The variables involving the child were: physiological changes in the newborn and the child's refusal of the breast. Regarding parents, sociodemographic factors, maternal age and inefficient milk change were highlighted. Among the external variables, the return to work or study for the predominant. Therefore, it is necessary to strengthen community actions, reorient health services, guidance to nursing mothers and in the formation and articulation of support networks for this practice in order to promote the results that can be promoted to the health of the mother-child.

**Keywords:** Early weaning; Breast Feeding; Nursing Care

## 1 INTRODUÇÃO

O Aleitamento Materno tem relevância no combate a fome extrema e desnutrição estabelecida nos dois primeiros anos de vida, sendo mesmo responsáveis pela

---

<sup>1</sup> Artigo apresentado à Banca Examinadora do Centro Universitário São Lucas de Ji-Paraná, como requisito parcial de aprovação para obtenção do Título de Bacharel em Enfermagem sob orientação da Professora Mestre Francieli. E-mail: francieli.carniel@saolucas.edu.br

<sup>2</sup> Adriana Dos Santos Oliveira, graduanda em Enfermagem do Centro Universitário São Lucas, 2020. E-mail: adrianaoliversantos@hotmail.com

<sup>3</sup> Francieli Carniel. Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal de Pelotas. Professora do Centro Universitário São Lucas de Ji-Paraná. E-mail: francieli.carniel@saolucas.edu.br.

sobrevivência da criança, principalmente aquelas em condições desfavoráveis. E isso ocorre devido às inúmeras vantagens imunológicas e psicológicas (DIAS et al., 2016; OLIVEIRA et al., 2015).

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde (MS) recomendam que os recém-nascidos (RN) recebam o aleitamento materno exclusivo (AME) até os 6 meses de vida e o aleitamento materno (AM) até os 2 anos de idade (BRASIL, 2015; OMS, 2009). Ainda segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o AME previne cerca de 6 milhões de mortes infantis por ano (UNICEF, 1992).

No entanto, a prática de amamentação exclusiva até os seis meses no Brasil, ainda permanece longe de atingir o patamar ideal preconizado pelo UNICEF, da OMS e do MS. Segundo dados da II Pesquisa de Prevalência do AM nas capitais brasileiras e Distrito Federal, realizada em 2008, apontaram que apenas 41,0% das crianças até 6 meses de vida recebiam AME. Dentre as regiões, o Norte foi a que apresentou a maior prevalência (45,9%) e os indicadores mais baixos foram apresentados na região nordeste (37%). Ou seja, mesmo na região mais prevalente, não foi atingido a meta de 50% de AME preconizado pela OMS, o que torna a situação preocupante (MARGOTTI e MATTIELLO, 2016; PRADO et al., 2016).

Nestas condições, os profissionais de saúde que fazem parte dessas instituições são responsáveis por promover, apoiar e proteger a prática do aleitamento materno e apoiar as nutrizes para evitar o desmame precoce no Brasil. Nessa perspectiva, o(a) enfermeiro(a) da equipe de saúde tem um papel primordial frente à amamentação, pois são eles quem mais se relacionam com a mulher durante o ciclo gravídico-puerperal, principalmente no pré-natal, lidando com as demandas do aleitamento e são por meio de suas práticas que as nutrizes aperfeiçoam a amamentação, melhorando assim, os índices de aleitamento materno, e conseqüentemente, diminuindo as taxas de desnutrição infantil, alergias, anemias, doenças dentárias e infecções que podem elevar à mortalidade infantil, além de diminuir as internações, custos com consultas, medicamentos e outros (MARGOTTI e MATTIELLO, 2016; MARINHO et al., 2015).

Diante do fato de que já existem estudos sobre o tema, mas que mesmo assim, ainda há o desafio de agregar e sintetizar o conhecimento específico disponível para contribuir com sua aplicabilidade. Assim sendo, a pergunta norteadora da busca foi: O

que está posto na literatura como fatores que interferem o aleitamento materno, quais motivos levam ao desmame precoce e qual a função da enfermagem em tudo isso? A partir de tal questão levantada, este estudo tem por objetivo reunir os resultados de pesquisas sobre os fatores mais citados na literatura que influenciam no desmame precoce e o impacto do profissional de enfermagem nesse processo.

## **2 METODOLOGIA**

Trata-se de um artigo de revisão integrativa da literatura, cuja elaboração da pesquisa utilizou-se das seguintes etapas: determinação do tema e definição da pesquisa, definição da questão da pesquisa, estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão (amostra), definição das categorias/informações a serem retiradas dos artigos utilizados como subsídios: autor, ano, título, revista, objetivo e desfecho.

A coleta de dados foi realizada nos meses de junho e julho de 2020 e a análise dos mesmos no mês de agosto de 2020, onde foram acessados os artigos publicados no período de 2015 a 2020, indexados nas bases de dados da Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e periódicos CAPES/MEC.

Para a busca dos artigos, foram utilizados descritores selecionados mediante consulta aos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e com a combinação dos operadores booleanos “aleitamento materno exclusivo” AND “lactente” AND “desmame precoce” AND “breast feeding” and Infant AND “Early weaning”. Os critérios de inclusão foram: pesquisas publicadas em português, inglês ou espanhol em formato de artigos entre os anos de 2015 e 2020. Como critérios de exclusão: optou-se pela não utilização de teses, dissertações ou monografias, bem como trabalhos que não apresentasse o artigo na íntegra nas bases de dados.

Ao realizar o cruzamento dos descritores obteve-se um total de 3105 estudos, depois de realizado o filtro obteve-se a amostra de 200 artigos, estes foram lidos título e resumos para identificar aqueles que se relacionavam com a temática do estudo, identificando ao final o total de 26 artigos, sendo cinco estudos da SCIELO, seis da LILACS, doze do CAPES e três da MEDLINE.

Prosseguindo com a organização dos estudos conciliados em tabelas, possibilitando uma visão mais ampla das principais temáticas abordadas, conseqüentemente possibilitou a extração das informações mais relevantes para esta revisão.

### 3 RESULTADOS

A amostra foi composta por 26 artigos, dos quais dezessete (17) estavam disponíveis na língua portuguesa, seis (6) foram escritos em espanhol e (3) em inglês. Quanto ao período de publicação, constatou-se que os anos que apresentaram maior número de artigos publicados foi 2015, com oito publicações, correspondendo a 30% das incluídas no estudo. Seguido pelo ano 2016 com cinco publicações, o que corresponde a 19%. O ano de 2019 e 2018 possuem quatro estudos, o que representa 15%, 2017 com três estudos (15%) e por fim, o ano de 2020 com dois artigos (7%).

Em relação ao delineamento de pesquisa, identificou-se que das 26 publicações, 12 (doze) utilizaram um método quantitativo (46%), 10 (dez) eram estudos qualitativos (38%) e 4 (quatro) eram revisões integrativas da literatura (15%).

Os principais resultados desses artigos foram sintetizados em 3 (três) Categorias Temáticas para melhor compreensão do conteúdo proposto. Categoria I — fatores do recém-nascido, Categoria II — fatores relacionados aos pais, Categoria III — Fatores Externos, que estão apresentadas na Tabela 1. O número de artigos (n) mostrado na coluna refere-se à frequência com que esse fator se repetiu em diferentes pesquisas, pois um artigo pode trazer uma ou várias características.

Tabela 1 - Síntese das categorias Temáticas após análise dos artigos da Revisão Integrativa, Ji-Paraná-RO, Brasil, 2020.

<b>CATEGORIAS TEMÁTICAS:</b>	<b>FREQUÊNCIA Nº26</b>	<b>%</b>
<b>Fatores Relacionados à Criança</b>		
<b>Alteração fisiológica que afete o recém-nascido na hora de mamar (doença, hospitalização, baixo peso ao nascer).</b>	1	4
<b>Recusa ao seio por parte da criança.</b>	2	8
<b>Fatores Relacionados aos Pais</b>		

<b>Mãe jovem e inexperiente (primigesta).</b>	11	42
<b>Baixa renda.</b>	10	38
<b>Baixa escolaridade.</b>	10	38
<b>Crença do leite fraco e ineficiente.</b>	10	38
<b>Trauma Mamilar ou dor ao Amamentar.</b>	8	30
<b>Uso de Bicos artificiais.</b>	6	23
<b>Depressão Materna.</b>	4	15
<b>Parto cesáreo.</b>	4	15
<b>Escolaridade</b>		
<b>Retorno ao trabalho ou Estudo.</b>	11	42
<b>Interferência Familiar</b>	5	19
<b>Profissionais de saúde ineficientes.</b>	6	23
<b>Pré-natal tardio; Pré-Natal realizado em instituição privada.</b>	2	7

**Fonte** OLIVEIRA, AS; CARNIEL F., 2020.

Dentre os fatores relacionados à criança, 3% estava relacionado às alterações fisiológicas, tais como: boca demasiado pequena, bebês imaturos que ainda não desenvolveram o reflexo de sucção; ou algumas iatrogenias decorridas do parto, como luxação de ombros, que produz desconforto no bebê dependendo da posição e, conseqüentemente, faz com que não recuse o seio, relatado em 7% dos artigos selecionados.

Já entre os fatores relacionados aos pais, o mais relatado foi a idade materna, aproximadamente 42%, seguido pelas variáveis: baixa renda, baixa escolaridade e crença do leite fraco e ineficiente, com 38% cada. O trauma mamilar ou dor ao amamentar foi descrito em 8 dos 26 artigos selecionados, o uso de bicos artificiais em 6 dos 26, e a depressão materna e o parto cesáreo, ambos foram descritos em apenas 15% das pesquisas selecionadas para o presente estudo.

Entre as variáveis externas ou ambientais, o retorno ao trabalho ou ao estudo foi o fator predominante, sendo citado em 11 dos 26 artigos. Os demais citados foram: Interferência familiar (19%), profissionais de saúde ineficientes (23%) e o pré-natal tardio e/ou realizado em instituição privada (7%).

#### 4. DISCUSSÃO

O aleitamento materno exclusivo (AME) que consiste na oferta de apenas leite materno aos lactentes, sem ingestão de alimentos sólidos ou outros líquidos como água e suco, sendo apenas permitida a ingestão de medicamentos e/ou complexo vitamínicos é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde até os seis meses de idade da criança (LIMA et al., 2018; MONTEIRO et al., 2020). Mas são diversos os fatores que podem ocasionar o desmame precoce da criança ou a suplementação com outros alimentos. Dentre eles, variáveis envolvendo a própria criança, os pais e fatores ambientais ou externos.

Os fatores para o desmame precoce envolvendo a criança, são de forma geral, qualquer alteração fisiológica que afete o recém-nascido na hora de mamar, o que pode alterar o seu desejo. Entre as características do recém-nascido foram associados os seguintes variáveis: Alterações fisiológicas que afetem o recém-nascido na hora de mamar (doença, hospitalização, baixo peso ao nascer) e recusa ao seio por parte da criança (ALVARENGA et al., 2017; MONTESCHIO et al., 2015).

O desinteresse ou a recusa do bebê quanto à amamentação podem influenciar a interrupção precoce da amamentação exclusiva. Essa rejeição pode acontecer devido a uma má postura ou causas físicas, como: a criança possuir uma boca demasiado menor ou a mama ser grande com uma aréola tensa fazendo com que o peito fique mais plano; além dos bebês imaturos que ainda não possui desenvolvido o reflexo de sucção; ou algumas latrogenias resultantes do parto, como luxação de ombros, que dependendo da posição produz dor no bebê e, conseqüentemente, faz com que não possua o interesse em mamar (ALVARENGA et al., 2017).

É válido ressaltar que nos artigos selecionados para o presente estudo, os fatores relacionados à criança foram menos discutidos que os demais. Isso pode ser explicado pelo fato da maior parte dos artigos darem maior enfoque às variáveis tanto internas quanto externas que acometem as nutrizes. Enquanto que nas crianças, o assunto mais abordado foi relacionado aos benefícios da amamentação e as conseqüências do desmame precoce.

Dentre os fatores de risco relacionados aos pais, a variável que mais se acentua é o sociodemográfico (renda encontrado em 38% dos artigos e escolaridade em 38% dos artigos pesquisados) que foi citado em 76% dos artigos selecionados. As mulheres que possuem um nível de instrução mais alto associado a uma maior renda, tendem a expressar mais leite materno, bem como manter a AME até os seis meses com mais frequência que as aquelas com um menor grau de escolaridade. Uma das explicações possíveis é que mulheres com mais tempo de estudo tendem a procurar mais informações acerca da amamentação. Além disso, por possuírem maior renda, tem mais acesso a recursos tecnológicos e humanos para as auxiliarem no período de amamentação (CRISTOFARI et al., 2019; GONÇALVES et al., 2019; HAS et al., 2018; PANG et al., 2017).

Outro fator de risco muito citado na literatura é a idade materna associada à primigestação (GONÇALVES et al., 2019). Há uma maior tendência de interrupção do AME em mulheres mais jovens. Um estudo realizado em Pernambuco constatou que adolescentes ( $\leq 19$  anos) apresentavam chance 1,89 vez maior de interromper precocemente do AME, enquanto que as mulheres entre 20 e 29 anos mostraram chance 1,27 vez maior quando comparadas com aquelas  $\geq 30$  anos (SILVA et al., 2017).

Esse achado pode ser explicado pela possível insegurança das adolescentes quanto à habilidade de amamentar e também pelo fato de essas serem mais propensas a erros de introdução alimentar, o que pode estar associado ao baixo poder aquisitivo ou à repetição do hábito alimentar, que em muitos casos se apresenta inadequado. Enfim, mulheres com mais idade possuem maiores possibilidade de manter a AME até os seis meses por conta da maior experiência e maior conhecimento acerca da amamentação (SILVA et al., 2017).

Outro fator de risco relacionado ao desmame precoce é o trauma mamilar e a dor durante a prática de amamentar (GONÇALVES et al., 2019). Fissuras e rachaduras na aréola podem surgir nos primeiros dias de amamentação, tais problemas geralmente são ocasionados pelo ato da sucção ou pela pega incorreta do lactente (LIMA et al., 2018). Os traumas mamilares/dor devem ser notados pela equipe de saúde como marcadores de dificuldades e podem ser evitados quando se adotam medidas profiláticas durante as

consultas de pré-natal, momento em que há a oportunidade de promoção e incentivo à amamentação (ALVARENGA et al., 2017).

Destarte, é importante uma maior adesão, por parte das gestantes e lactantes, às ações de aconselhamento sobre o aleitamento, principalmente para as primíparas. Estas ações partem preferencialmente da Unidade Básica de Saúde (UBS), objetivando principalmente a promoção do aleitamento materno e prevenção de agravos decorrentes da interrupção desta prática (ANDRADE et al., 2018)

Dentre os fatores ambientais que mais surgiram, o mais predominante foi o retorno ao trabalho que apareceu em 42% dos artigos pesquisados, dentro das variáveis ambientais foi a mais prevalente. Na literatura, fica claro que a introdução de novos alimentos na dieta do lactente inicia-se justamente no período do término da licença maternidade (CRISTOFARI et al., 2019; LIMA et al., 2018). Isso ocorre devido à necessidade financeira familiar que fazem com que as mulheres tenham que ajudar nas despesas de casa e em alguns casos até assumir o papel de chefes de famílias (ALVARENGA et al., 2017). Outro fator muito comum, é a interferência familiar, em uma pesquisa realizada na Indonésia, foi constatado que mães que moram em famílias extensas (mais de cinco familiares em uma casa) têm mais chances de ocorrer o desmame precoce que nas famílias nucleares (HAS et al., 2018).

Esta relevante evidência respalda a importância do profissional se relacionar com o ambiente familiar da nutriz, conciliando sua assistência com a rede social da mesma, valorizando as ações em saúde, o vínculo, reconhecendo o papel determinante da família dentro dessa prática, trazendo-a para junto de si, para que o cuidado em saúde seja em prol do aleitamento materno, pois entendendo toda a bagagem familiar materna, permite uma maior adesão e manejo dessa prática (DIAS et al., 2016).

Assim sendo, a função do enfermeiro, é de suma importância. Pois é o profissional que atua na assistência direta as mulheres e crianças, no âmbito hospitalar e comunitário. Possuindo papel importante na promoção e proteção ao aleitamento materno, por meio do fortalecimento de ações comunitárias, reorientação dos serviços de saúde, orientações as gestantes e puérperas e na formação e articulação de redes de apoio a esta prática (MONTESCHIO et al., 2015). Além de desenvolver habilidades para

identificar quais crenças estão atreladas a prática de cada nutriz, assim como quais delas podem ou precisam ser mantidas, modificadas, reestruturadas ou ressignificadas.

O enfermeiro utiliza-se da promoção, para educação de adultos, favorecendo um ambiente acolhedor, onde as mulheres e familiares possam expor suas crenças, dúvidas e sentimentos. No entanto, Figueiredo et al., (2015) em sua pesquisa observou uma baixa adesão ao AME no primeiro semestre de vida, independente do fato de as genitoras terem ou não recebido orientação quanto a essa prática. Isso ocorre por dois motivos: o primeiro é à falta de incentivo dos profissionais de Saúde e o segundo é que informações entregues sem uma estratégia técnico-científica, por si só não é sinônimo de eficácia na amamentação (LIMA et al., 2018; PÉREZ et al., 2016).

Quando uma orientação é realizada de forma desconexa a realidade da mãe, a mesma se torna ineficaz. E um dos motivos para isso se deve a um despreparo dos profissionais envolvidos (CALVACANTE et al., 2019). Pela falta de experiência e/ou conhecimento, muitas vezes as angústias maternas são banalizadas, os fatores familiares e econômicos da mãe são desconsiderados e o vínculo de confiança entre profissional e nutriz não é formado (MARINHO et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2015). Portanto, a assistência de enfermagem deve fundamentada em teorias baseadas na atualidade, direcionando o modo do cuidar. E quanto mais capacitados estes profissionais forem, menores são as chances das mulheres se sentirem desamparadas e maiores são as de se sentirem empoderadas (OLIVEIRA et al., 2015).

## **5 CONSIDERAÇÕES FINAIS**

A partir da síntese dos diferentes estudos evidenciou que há uma diversidade de fatores que podem influenciar no desmame precoce e na introdução de outros alimentos antes dos seis primeiros meses de vida do lactente, correlacionando-se aos múltiplos contextos em que as mães estão inseridas.

Dessa maneira, há a necessidade de haver fomento da prática do aleitamento materno, promovendo resultados que possam contribuir com a prevenção de agravos e a promoção de saúde do binômio mãe e filho. Além disso, por meio do fortalecimento de ações comunitárias, reorientação dos serviços de saúde, orientações as gestantes e puérperas e na formação e articulação de redes de apoio a esta prática.

Destarte é função do enfermeiro e dos demais profissionais da saúde identificar as famílias vulneráveis e mais propensas a um desmame precoce, pois a participação conjunta entre as nutrizes e seus familiares desde as consultas de pré-natal, bem como no acompanhamento da gestação e na amamentação são inquestionáveis para o sucesso da referida prática.

Entre as limitações deste estudo pode-se citar o acesso a um número reduzido das bases de dados eletrônicas, bem como a heterogeneidade metodológica dos estudos que traz dificuldades em realizar análises estatísticas para conferir maior validade para os resultados discutidos.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVARENGA, S.C.; et al. Fatores que influenciam o desmame precoce. **Aquichan**, v. 17, n. 1, p. 93–103, 2017.

ANDRADE, H.S.; et al. Fatores relacionados ao desmame precoce do aleitamento materno. **Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade**, v. 13, n. 40, p. 1–11, 2018.

BARONA, C.; et al. ¿Mejora el bono de desarrollo humano la lactancia materna exclusiva en Ecuador? Estudios Sociales. **Revista de Alimentación Contemporánea y Desarrollo Regional**, v. 23, n. 45, p. 63–81, 2015.

BASAIN VALDÉS, J.M.; et al. Duración de lactancia materna exclusiva, estado nutricional y dislipidemia en pacientes pediátricos. **Revista Cubana de Pediatría**, v. 87, n. 2, p. 156–166, 2015.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Cadernos de Atenção Básica. Saúde da criança: aleitamento materno e alimentação complementar**. Brasília: Ministério da Saúde; 2015.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde. Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. **Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno em municípios Brasileiros**. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2010.63p. Disponível em: <http://www.redeblh.fiocruz.br/media/pamuni.pdf>.

CALVACANTE AVSON.; et al. Avaliação dos conhecimentos e práticas em aleitamento materno dos profissionais de saúde em um hospital amigo da criança. **Revista Brasileira de Educação e Saúde**, v. 9, n. 2, p. 13–20, 2019.

CAMPOS, M.A.S.; et al. Prática de aleitamento materno exclusivo informado pela mãe e oferta de líquidos aos seus filhos. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 23, n. 2, p. 283–290, 2015.

CRISTOFARI, R.C.; et al. Conhecimento acerca do aleitamento materno de gestantes atendidas na atenção básica de saúde. **Revista Brasileira em Promoção Saúde**, v. 32, p. 1–10, 2019.

DIAS, R.B.; et al. Conhecimento de enfermeiras e estratégias de incentivo da participação familiar na amamentação. **Ciência e Saúde Coletiva**, v. 21, n. 8, p. 2527–2536, 2016.

FIGUEIREDO, M.C.D.; et al. Banco de leite humano: o apoio à amamentação e a duração do aleitamento materno exclusivo. **Journal of Human Growth and Development**, v. 25, n. 2, p. 204–210, 2015.

FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA. Dez passos para o sucesso do aleitamento materno. Brasília: **UNICEF**; 1992. Disponível em: [https://www.unicef.org/brazil/pt/activities\\_9999.html](https://www.unicef.org/brazil/pt/activities_9999.html).

GONÇALVES, G.P.; et al. Fatores que contribuem para a interrupção do aleitamento materno exclusivo e complementar. RESU – **Revista Educação em Saúde**, v. 7, n. suplemento 2, p. 233–239, 2019.

HAS, E.M.M.; et al. Early weaning food for infants (0-6 months old) in maduresse people based on transcultural nursing theory. **IOP Conference Series: Earth and Environmental Science**, v. 116, n. 1, p. 0–7, 2018.

LIMA, A.P.C.; et al. A prática do aleitamento materno e os fatores que levam ao desmame precoce: uma revisão integrativa. **J. Health Biol Sci**, v. 26, n. 6, p. 189–196, 2018.

MACIEL, V.B.S.; et al. Aleitamento materno em crianças indígenas de dois municípios da Amazônia Ocidental Brasileira. **Acta Paul Enferm**, v. 29, n. 4, p. 469–475, 2016.

MARGOTTI, E, MATTIELLO, R. Fatores de risco para o desmame precoce. **Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste**, v. 17, n. 4, p. 537–544, 2016.

MARINHO, M.S.; et al. A Atuação Do (A) Enfermeiro (A) Na Promoção, Incentivo e Apoio Ao Aleitamento Materno: Revisão da Literatura. **Revista Enfermagem Contemporânea**, v. 4, n. 2, p. 189–198, 2015.

MONTEIRO, J.N.S, et al. Fatores associados à interrupção precoce do aleitamento materno exclusivo em prematuros. **Arquivos Catarinenses de Medicina**, v. 49, n. 1, p. 50–65, 2020.

MONTESCHIO, C.A.C.; et al. O enfermeiro frente ao desmame precoce na consulta de enfermagem à criança. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 68, n. 5, p. 869–875, 2015.

OLIVEIRA, C.S.; et al. Amamentação e as intercorrências que contribuem para o desmame precoce. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 36, n. spe, p. 16–23, 2015.

**ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS)**. Infant and young child feeding: model chapter for textbooks for medical students and allied health professionals. Geneva: WHO; 2009.

PANG, W.W.; et al. Direct vs. Expressed breast milk feeding: Relation to duration of breastfeeding. **Nutrients**, v. 9, n. 6, p. 1–13, 2017.

PÉREZ, R.R.G.; et al. Tiempo de lactancia materna exclusiva y estructura familiar: Duration of exclusive breastfeeding and the family structure. **Revista Cubana de Pediatría**, v. 88, n. 1, p. 43–54, 2016.

PRADO, C.V.C.; et al. Desmame Precoce Na Perspectiva De Puérperas: Abordagem Dialógica. **Texto Contexto Enferm**, v. 25, n. 2, p. 1–9, 2016.

QUISPE ILANZO, M.P.; et al. Características y creencias maternas asociadas al abandono de la lactancia materna exclusiva. **Revista Cubana de Salud Pública**, v. 41, n. 4, p. 582–592, 2015.

RAMIRO GONZÁLEZ, M.D.; et al. Prevalence of breastfeeding and factors associated with the start and duration of exclusive breastfeeding in the Community of Madrid among participants in the ELOIN. **Anales de Pediatría (English Edition)**, v. 89, n. 1, p. 32–43, 2018.

SANTO, F.A.; et al. Conhecimento de mães sobre formas de aleitamento e hábitos deletérios. **Distúrb Comun**, v. 31, n. 4, p. 641–650, 2019. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.23925/2176-2724.2019v31i4p641-650>>.

SILVA, C.S.; et al. Association between postpartum depression and the practice of exclusive breastfeeding in the first three months of life. **Jornal de Pediatria (Versão em Português)**, v. 93, n. 4, p. 356–364, 2017. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.jpedp.2017.01.003>>.

TAVEIRO, E.A.N.; et al. Adesão Ao Aleitamento Materno Exclusivo Em Bebês De 0 a 6 Meses Nascidos Em Um Hospital E Maternidade Do Município De São Paulo. **Revista Brasileira de Ciências da Saúde**, v. 24, n. 1, p. 71–82, 2020.