



SCHMERZ-STOPP-GEL

Medizinprodukt

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten müssen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

SOS Schmerz-Stopp-Gel ist eine Akuthilfe zur schnellen Linderung von Muskel- und Gelenkschmerzen, Verstauchungen und Zerrungen. Das Gel wird direkt auf die schmerzende Stelle aufgetragen und wirkt zunächst kühlend und anschließend wohltuend wärmend. Dank des integrierten Applikators lässt sich das Gel leicht auftragen, während die Handinnenflächen sauber bleiben, was eine Anwendung unterwegs erleichtert. Gleichzeitig bietet die 3-Ball-Technik einen angenehmen Massageeffekt.

SOS Schmerz-Stopp-Gel ist wirksamer als ein Gel auf Ibuprofen-Basis (5%)* und für Erwachsene und Kinder ab 7 Jahren geeignet.

* Die Wirksamkeit wurde wissenschaftlich nachgewiesen (In-vivo-Studie 12POGAD02, November 2013).

Anwendungsgebiet:

Linderung bei Muskel-, Gelenk- und post-traumatischen Schmerzen.

SOS Schmerz-Stopp-Gel hemmt auch die Bildung von Ödemen. Die Anwendung ist daher geeignet bei Verspannungen, Verstauchungen, Verdrehungen, Zerrungen, Überdehnungen, Muskelfaserrissen und diversen Traumata.

Zusammensetzung:

Aqua; Alcohol; PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether; Menthol; Mentha Piperita Oil; Aqua;

Propylene Glycol, Equisetum Arvense Extract; Aqua, Propylene Glycol, Harpagophytum Procumbens Root Extract; Camphor; Illite; Carbo-mer; Rosmarinus Officinalis Leaf Oil; Melaleuca Leucadendron Cajaputi Oil; Thymus Vulgaris Flower/Leaf Oil; Sodium Hydroxide; CI 42090

Anwendung:

Erwachsene und Kinder ab 7 Jahren. Drücken Sie leicht die Tube. Tragen Sie das Gel mit Rotationsbewegungen auf den schmerzenden Bereich auf, indem Sie es mit dem speziellen Massage-Applikator 3- bis 4-mal täglich leicht einmassieren. Gegebenenfalls nach Gebrauch Hände waschen. Das Gel nach Gebrauch wieder gut verschließen.

Hinweis:

Das Kalt-Warm-Empfinden wird je nach Anwender unterschiedlich wahrgenommen.

Warnhinweise:

Nur zur äußerlichen Anwendung. Nicht schlucken. Nicht bei Kindern unter 7 Jahren anwenden. Nicht während der Schwangerschaft oder der Stillzeit anwenden. Personen, die schon unter Krampfanfällen oder epileptischen Anfällen gelitten haben, müssen vor Anwendung ihren behandelnden Arzt konsultieren. Kontakt mit den Augen und /oder Schleimhäuten vermeiden. Nicht auf offene Wunden oder auf verletzte oder gereizte Haut auftragen. Einige Inhaltsstoffe können allergische Reaktionen hervorrufen. Wenn eine Reizung auftritt oder andere Anzeichen einer Überempfindlichkeit auftreten, beenden Sie die Behandlung sofort. Nicht unter einem Okklusivpflaster anwenden.



Nicht in Verbindung mit anderen Cremes, Balsamen, Einreibemitteln, Sprays oder Massageölen verwenden.

Nicht zusammen mit wärmespendenden Vorrichtungen anwenden. Im Falle einer versehentlichen Einnahme ist ein Arzt, Apotheker oder eine Giftnformationszentrale zu konsultieren.

Falls die Schmerzen länger als 5 Tage anhalten oder falls es nach dem Auftragen zu Hautreizungen kommt, ist die Anwendung des Gels abzusetzen und fachlicher Rat einzuholen.

Nach Ablauf des Verwendbarkeitsdatums nicht mehr anzuwenden.

Vor Kindern sicher aufbewahren.

Jeder in Zusammenhang mit dem Produkt auftretende schwerwiegende Vorfall (der zum Tod oder einer ernsthaften Verschlechterung des Gesundheitszustands des Patienten geführt hat oder wahrscheinlich dazu führen wird) ist an vigilance@polidis.fr sowie an die zuständige nationale Behörde zu melden.

Inhalt: 50 ml



Hersteller:
LABORATOIRE POLIDIS
19, Rue Edmond Blanc
92500 Rueil-Malmaison
FRANCE
www.polidis.fr

Vertrieb:
DISTRICON GmbH
Bessie-Coleman-Straße 13
D-60549 Frankfurt

Bedeutung der Symbole auf Packung:

- Hersteller
- Vertrieb
- Temperaturbegrenzung
- Vor Sonnenlicht schützen
- Trocken lagern
- Medizinprodukt
- Gebrauchsinformation beachten
- Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden
- Chargenbezeichnung
- Verwendbar bis

Stand der Information: 2024-10