


Gebrauchsinformation – bitte sorgfältig lesen!



# DORN- WARZEN- EX



Medizinprodukt



**SOS Dornwarzen-Ex** entfernt Dornwarzen leicht und gleichzeitig schonend. Dornwarzen treten überwiegend an der Fußsohle auf. Bedingt durch das Körpergewicht, das auf der Fußsohle lastet, wachsen sie wie ein Dorn tief in das Bindegewebe und Fettgewebe der Unterhaut ein und können beim Gehen stechende Schmerzen bereiten. Dank des Pinsel-Applikators lässt sich die Lösung präzise auf die Dornwarze auftragen, bis die Hornhaut gelöst und die Infektion beseitigt ist. Die Lösung trocknet schnell, bildet einen wasserabweisenden

Schutzfilm und verhindert die Ausbreitung der Infektion.

**Anwendungsgebiet:**

Lösung zur Anwendung bei Dornwarzen.

**Zusammensetzung:**

Wirkstoff: Milchsäure und Salicylsäure

**Sonstige Bestandteile:**

Ether, Ethylacetat, 2-Propanol, Collodiumwolle, dickflüssiges Paraffin, Rizinusöl.

**Darreichungsform und Inhalt:**

10 ml Lösung zum Auftragen auf die Haut

## **Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:**

Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da die Dornwarzen-Lösung sonst nicht richtig wirken kann!

## **In welcher Dosierung und wie oft sollten Sie Dornwarzen-Ex anwenden?**

1-2 mal täglich jeweils 1-2 Tropfen der Lösung auf die zu behandelnde Stelle auftragen, verstreichen und antrocknen lassen. Anwendungsdauer beträgt 4-5 Tage. Bei hartnäckigen Fällen wiederholt man die Behandlung, wartet

jedoch so lange, bis die zuvor aufgetragene Schicht fest angetrocknet ist.

Zum Schutz der gesunden Haut kann diese mit Vaseline abgedeckt werden. Nach Gebrauch Flasche sofort wieder gut verschließen, da Dornwarzen-Ex leicht verdunsten.

### **Wie lange sollten Sie Dornwarzen-Ex anwenden?**

Bei regelmäßiger Anwendung lässt sich die erweichte Hornhaut nach 3-5 Tagen mühelos entfernen. Ein heißes Bad erleichtert das Herauslösen der Dornwarze.

Die Behandlung kann gegebenenfalls wiederholt werden

## **Gegenanzeigen:**

### **Wann dürfen Sie Dornwarzen-Ex nicht anwenden?**

Sie dürfen Dornwarzen-Ex nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe, sowie bei eingeschränkter Nierenfunktion. Fragen Sie hierzu bitte Ihren Apotheker. Dornwarzen-Ex darf nicht auf Muttermale, behaarte Warzen, Warzen im Genitalbereich oder im Gesicht angewendet werden.

## **Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?**

Dornwarzen-Ex darf in der Schwangerschaft nur kleinflächig (kleiner als 5 cm<sup>2</sup>) angewendet werden.

Dornwarzen-Ex darf nicht an der stillenden Brust angewendet werden. Die zufällige Aufnahme von Dornwarzen-Ex durch den Säugling durch Kontakt mit der behandelten Körperstelle muss vermieden werden. Sollte eine regelmäßige Behandlung großer Hautflächen mit Dornwarzen-Ex für notwendig erachtet werden, so ist frühzeitig abzustillen, da

Risiken wegen mangelnder Entgiftung bei Neugeborenen nicht auszuschließen sind.

### **Was ist bei Kindern und Säuglingen zu beachten?**

Bei Säuglingen sollte Dornwarzen-Ex nicht angewendet werden. Das Produkt ist für Kinder ab 6 Jahre. Bei Kindern ist eine Langzeitbehandlung auf großen Flächen zu vermeiden.

### **Sicherheitshinweise:**

Leicht entzündlich. Vor Feuer schützen. Wirkt ätzend auf Oberflächen und Haut. Salicylsäure darf in der Schwangerschaft nur kleinflächig angewendet werden.

Dicht verschlossen, nicht über 25°C lagern. Nur zur äußerlichen Anwendung! Für Kinder ab 6 Jahre. Nach Gebrauch Flasche sofort wieder verschließen. Dornwarzen-Ex ist für Kinder unzugänglich aufzubewahren!

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:  
Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?**

Dornwarzen-Ex darf nicht mit Schleimhäuten in Berührung kommen, insbesondere ist ein Kontakt mit den Augen zu vermeiden.

## **Hinweis zur Aufbewahrung:**

Dornwarzen-Ex ist feuergefährlich und sollten nicht in der Nähe von offenen Flammen angewendet werden.

Dornwarzen-Ex ist unzugänglich für Kinder aufzubewahren!

## **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**

**Welche anderen Arzneimittel werden in ihrer Wirkung durch Dornwarzen-Ex beeinflusst?**

Salicylsäure kann die Aufnahme anderer örtlich angewandter Arzneimittel verstärken. Die durch die Haut aufgenommene

Salicylsäure kann mit bestimmten Substanzen (Methotrexat und Sulfonylharnstoffen) in Wechselwirkung treten.

Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch für vor kurzem angewandte Arzneimittel gelten können.

## **Überdosierung und andere Anwendungsfehler:**

**Was ist zu tun, wenn Dornwarzen-Ex in zu großen Mengen angewendet wurden (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?**

Bei äußerlicher Anwendung von

Salicylsäurepräparaten sind auch bei versehentlicher kurzzeitiger Überschreitung der angegebenen Höchstmengen im Allgemeinen keine toxischen Nebenwirkungen zu erwarten. Örtlich kann es zu Hautreizungen kommen. Als Gegenmaßnahme genügt das Entfernen des Präparates.

### **Was ist zu tun, wenn Dornwarzen-Ex versehentlich verschluckt wurden?**

Der Mund ist sofort mit reichlich Wasser auszuspülen. Anschließend ist ohne Verzögerung ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Sollten Sie Fragen zur Klärung

der Anwendung haben, empfehlen wir Ihnen, Ihren Apotheker zu fragen.

### **Nebenwirkungen:**

#### **Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Dornwarzen-Ex auftreten?**

Selten kann Dornwarzen-Ex örtliche Hautreizungen (Rötungen oder Brennen) hervorrufen, die jedoch im Normalfall in kurzer Zeit wieder verschwinden.

Bei übermäßiger Reizung der Haut sollten Sie die Behandlung mit Dornwarzen-Ex abbrechen. In Einzelfällen können Kontaktallergien auftreten.

## **Schwangerschaft:**

Salicylsäure darf in der Schwangerschaft nur kleinflächig (Fläche kleiner als 5 cm<sup>2</sup>) angewendet werden.

## **Stand der Information:**

2024-11

**MD** Medizinprodukt



Nicht über 25°C lagern.



Gebrauchsanweisung  
beachten



Chargenbezeichnung



und Verfallsdatum

284\_REV07 / G05



## **Hersteller:**

Dr. Kleine Pharma GmbH  
Heidsieker Heide 114  
D-33739 Bielefeld



## **Vertrieb:**

DISTRICON GmbH  
Bessie-Coleman-Str. 13  
D-60549 Frankfurt



## **Importeur:**

Dr. Dünner AG  
Artherstraße 60  
6405 Immensee  
Switzerland

