



BLÄHUNGEN AKUT

Mundlösliche Sticks

Gegen Schwellungen im Magen-Darm-Trakt, verhindert Beschwerden bei Flatulenz und Blähungen und senkt den Taillenumfang bei übermäßiger Gasbildung im Darm.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten müssen.

Diese Gebrauchsinformation beinhaltet:

1. Identifizierung, Wirkmechanismus, Bestandteile und Zusammensetzung
2. Packungsgröße
3. Dosierung und Art der Anwendung
4. Nebenwirkungen
5. Wechselwirkungen mit Nahrungsergänzungsmitteln, Medikamenten und Arzneimitteln
6. Aufbewahrung
7. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
8. Verfalldatum
9. Entsorgung

1. Identifizierung

SOS Blähungen AKUT ist ein Medizinprodukt, das die Ansammlung von Gasen verhindert sowie Bauchschwellungen und Beschwerden in Verbindung mit Meteorismus wie Blähungen und Völlegefühl entgegenwirkt.

Dadurch kann SOS Blähungen AKUT indirekt ein nützliches Hilfsmittel bei Abnehmprogrammen sein, da es den Bauchumfang aufgrund von übermäßigen Darmgasen vermindert.

1.1 Wirkmechanismus

Die wirksamen Bestandteile von SOS Blähungen AKUT sind zwei verschiedene Polymere, die in einem quantitativen Verhältnis von 1:1 vorliegen. Auch wenn sie scheinbar ähnliche bindende und oberflächenaktive Eigenschaften haben, sind ihre Wirkmechanismen nicht identisch, weshalb die Kombination synergistische Wirkungen zu haben scheint.

Einer der Wirkstoffe fungiert hauptsächlich als Entschäumer, indem er die Gasblasen zerstört, die sich auf der Oberfläche von Flüssigkeiten im Magen-Darm-Trakt gebildet haben, und anschließend das Gas bindet. Der andere wirksame Bestandteil bildet, zusätzlich zu seiner stark entwässernden und gasbindenden Aktivität, dünne Schutzschichten an den Darmwänden. Diese helfen dabei, die Reizzustände der gastrointestinalen Schleimhaut zu lindern, die häufig mit der Überproduktion von Gasen einhergehen.

1.2 Bestandteile

SOS Blähungen AKUT mundlöslicher Stick enthält zwei inerte Stoffe mit stark gasbindender und oberflächenaktiver Wirkung.

Das Produkt ist nicht nur bei der Reduktion übermäßiger Gase im Darm ohne weitere Komplikationen nützlich, sondern auch bei Flatulenz in Verbindung mit Dyspepsie und Magenschwellungen.

1.3 Zusammensetzung

SOS Blähungen AKUT enthält: Simeticon und Polyvinylpolypyrrolidon

Hilfsstoffe: Sorbitol, Erdbeeraroma, Siliciumdioxid, Zitronensäure, Sucralose.

2. Packungsgröße

Eine Packung enthält 10 mundlösliche Sticks.

3. Dosierung und Art der Anwendung

Es wird empfohlen, einen Stick bis zum Abklingen der Beschwerden und einer sichtbaren Abflachung des Bauchs anzuwenden.

Das Produkt sollte nach allen Hauptmahlzeiten eingenommen werden, indem der Inhalt eines Sticks direkt in den Mund gegeben wird.

Das Produkt nicht bei Kindern unter 15 Jahren anwenden. Das Produkt bei Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren nur unter ärztlicher Aufsicht anwenden.

Nicht während der Schwangerschaft oder der Stillzeit anwenden.

4. Nebenwirkungen

Bei Dosen, die zur Erzielung einer therapeutischen Wirkung erforderlich sind, wurden keine Nebenwirkungen beobachtet.

Die Anwendung höherer Dosen kann zu Verstopfung führen. In den meisten Fällen klingt diese Nebenwirkung innerhalb von einigen Tagen nach dem Absetzen der Behandlung ab.

Wenn die Beschwerden länger als drei Tage anhalten, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

5. Wechselwirkungen mit Nahrungsergänzungsmitteln und Medikamenten

Für die Bestandteile von SOS Blähungen AKUT sind keine Wechselwirkungen mit Nahrungsergänzungsmitteln bekannt.

Generell sollten jedoch alle Nahrungsergänzungsmittel einschließlich Vitamine, Nährstoffe, pflanzliche und homöopathische Mittel mindestens zwei Stunden vor oder zwei Stunden nach der Anwendung von adsorbierenden Mitteln wie SOS Blähungen AKUT eingenommen werden.

5.1 Arzneimittelwechselwirkungen

Da SOS Blähungen AKUT Adsorbentien enthält, könnte die Aufnahme von gleichzeitig verabreichten Arzneimitteln verzögert oder vermindert sein.

Es wurde z. B. von Wechselwirkungen mit Antazida, Antibiotika und Antidiabetika berichtet. SOS Blähungen

AKUT ist mindestens zwei Stunden vor oder nach der Einnahme anderer Arzneimittel oder der Verhütungspille einzunehmen. Es wird dringend empfohlen, stets Ihren Hausarzt zu Rate zu ziehen, bevor Sie mit der Anwendung adsorbierender Medizinprodukte wie SOS Blähungen AKUT beginnen.

6. Aufbewahrung

Bewahren Sie SOS Blähungen AKUT an einem trockenen Platz und geschützt vor direkter Hitze oder Lichtquellen auf. Öffnen Sie den Stick erst unmittelbar vor Gebrauch. Beschädigte Beutel nicht verwenden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Das Produkt bei Temperaturen nicht über 25 °C aufbewahren.

7. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Das Produkt nicht bei Kindern unter 15 Jahren anwenden. Nicht während der Schwangerschaft oder der Stillzeit anwenden. Nicht die empfohlene Dosierung überschreiten, da größere Mengen zu Verstopfung führen können. Das Produkt nicht länger als 30 Tage hintereinander anwenden; falls die Symptome länger anhalten, einen Arzt konsultieren.

Die empfohlene Dosis ist sowohl bei gewöhnlichem Überschuß an Darmgasen als auch bei komplizierteren Fällen von Gasproduktion infolge von entzündlichen Darm-erkrankungen, Dyspepsie, postprandialen Schwellungen u. a. ausreichend.

Die Zeit bis zum Erzielen einer zufriedenstellenden Wirkung ist je nach Ursache der übermäßigen Gasproduktion verschieden.

Die Beutel sind zum Einmalgebrauch und sollten erst unmittelbar vor der Anwendung geöffnet werden.

Nicht einnehmen bei Unverträglichkeit des Produktes.

Nicht einnehmen bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile, Simeticon oder Polyvinylpyrrolidon.

8. Verfalldatum

Nicht nach Ablauf des auf der Verpackung angegebenen Verfalldatums anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf das im unversehrten Behältnis gelagerte Produkt.

9. Entsorgung

Das abgelaufene Produkt muss gemäß den geltenden örtlichen Bestimmungen zur Abfallentsorgung entsorgt werden. Das Produkt oder seine Verpackung keinesfalls in der Umwelt entsorgen.

Bedeutung der Symbole auf Packung:



Hersteller



Vertrieb



Medizinprodukt



Achtung



Nicht über 25 °C lagern



Nur einmal verwenden



Nicht bei beschädigter Packung verwenden
Gebrauchsinformation beachten



Chargenbezeichnung



Verwendbar bis

Stand der Information: März 2025



Hersteller:

SIIT srl
Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano sul Naviglio
(MI), Italien



0426



Vertrieb:

DISTRICON GmbH
Bessie-Coleman-Straße 13
D-60549 Frankfurt am Main

www.sos.de