

Resumo

A Hiperplasia Fibrosa Inflamatória (HFI) desponta no tecido conjuntivo fibroso e embora sejam análogas as neoplasias, todavia, são lesões benignas que surgem após a irritação crônica relacionada ao uso de próteses dentárias mal adaptadas. Estas lesões são consideradas reativas e proliferativas, as quais crescem às bordas das dentaduras, contudo possuem um prognóstico bom e o tratamento é cirúrgico atrelado concomitantemente à substituição das próteses antigas com as novas e consequentemente bem adaptadas. Ademais, o presente trabalho busca descrever um caso clínico de excisão de HFI em paciente com prótese mal adaptada analisando sinais, sintomas e tratamento odontológico. Nesse sentido, para atingir tal objetivo o método para elaboração foi o caso clínico e revisão bibliográfica realizada em artigos científicos 4 ISSN 1678-0817 Qualis B2 publicados nos últimos anos, sem restrições de idiomas, e indexados nos seguintes sites de pesquisa: PUBMED, Scientific Electronic Library (SciELO) e Google Acadêmico utilizando como palavras-chave: “Hiperplasia Fibrosa Inflamatória”, “prótese mal adaptada” e “tratamento”. Conclusão, o tratamento cirúrgico extraíndo completamente a lesão, bem como a remoção de agentes irritantes, através de próteses adaptadas, tem por intento o bem-estar e também estabelecer qualidade de vida aos pacientes edêntulos.

Palavras-chave: Hiperplasia Fibrosa Inflamatória. Lesão. Excisão.

Autores: Orlei Rodrigues Ramos, Jozias Teixeira Júnior, Isa Lima de Moraes, Rodrigo Jacon Jacob.