

Resumo

Os cistos odontogênicos constituem lesões benignas associadas aos tecidos formadores dos dentes, sendo o cisto dentígero um dos mais prevalentes, frequentemente relacionado a dentes inclusos, especialmente terceiros molares. O presente estudo tem como objetivo relatar um caso clínico em mandíbula, enfatizando a relevância do diagnóstico precoce e do manejo cirúrgico adequado. Paciente do sexo feminino, 47 anos, foi submetida a exames de imagem, os quais evidenciaram lesão radiolúcida unilocular associada ao elemento 38, sugestiva de cisto dentígero. A conduta terapêutica adotada consistiu em marsupialização, seguida de enucleação associada à exodontia do dente incluído. O diagnóstico foi confirmado por meio de exame histopatológico. No período pós-operatório, observou-se parestesia transitória, com regressão após tratamento instituído. A evolução clínica mostrou-se satisfatória, sem evidências de recidiva. Conclui-se que o diagnóstico por imagem, aliado ao planejamento cirúrgico criterioso, é determinante para o sucesso terapêutico, contribuindo para a preservação das estruturas anatômicas adjacentes e para a adequada reabilitação do paciente.

Palavras-chave: Cisto dentígero. Terceiro molar incluído. Cirurgia bucal. Marsupialização.

Autores: Ana Emanuelle Sousa Ferreira; Emily Batista dos Santos; Samuel Evangelista da Silva Bicalho.