

Resumo

A doença periodontal é uma condição inflamatória multifatorial que compromete os tecidos de suporte dentário, podendo demandar abordagens cirúrgicas complementares ao tratamento convencional. Dentre essas abordagens, destaca-se a raspagem a campo aberto (*open flap debridement*), técnica que permite acesso direto às superfícies radiculares para remoção de cálculo, biofilme e tecido de granulação. O presente estudo teve como objetivo relatar um caso clínico e analisar a evolução de um paciente com periodontite avançada submetido à terapia periodontal associada à raspagem. O paciente, sexo masculino, 56 anos, apresentou sangramento gengival espontâneo e bolsas periodontais profundas na região dos dentes 26 e 27. Inicialmente, realizou-se raspagem e alisamento radicular subgengival em todos os dentes, seguida de reavaliação periodontal após 30 dias. Diante da persistência de bolsas periodontais, foi realizada raspagem a campo aberto com utilização de curetas. O acompanhamento clínico demonstrou melhora dos parâmetros periodontais, especialmente redução da profundidade de sondagem em diferentes sítios avaliados. Conclui-se que a raspagem a campo aberto, quando associada à terapia periodontal básica, apresenta resultados clínicos favoráveis no controle da periodontite avançada, contribuindo para estabilização dos tecidos periodontais.

Palavras-chave: Doença periodontal. Periodontite. Raspagem a campo aberto. Terapia periodontal.

Autores: Gabriela Lima Dalazen; Tamires Castro Alves da Silva; Leslie Cristine Fiori Leite; Leiciane Moura Graça Fernandes.