




O B L I K

E S T H E T I C

G U I D E

S

M

L



## Jufora® ULTRALINK®

Монофазный имплантат  
для заполнения тканей  
в трёх вариантах исполнения



ULTRALINK®  
TECHNOLOGY

Таргетная технология  
ступенчатой сшивки  
по активированным участкам  
цепи гиалуроновой кислоты



**Наталья Новикова**

врач-дерматовенеролог,  
косметолог, трихолог,  
Москва

Генетически детерминированный, комбинированный или склонный к жирности тип кожи пациента обеспечивает плотность и подтянутость, замедляя деформационные изменения. Однако в данном случае ранние инволютивные изменения в околоушно-жевательной зоне (проекция S3) подчёркивают возрастные особенности, придавая лицу утомлённый вид.

Учитывая молодой возраст и субтильное телосложение пациента, требуется выверенная техника с точным подбором препарата с целью улучшить профиль лица и устранить светотеневые акценты, подчёркивающие визуальные недостатки.

Рекомендуется филлер с оптимальными реологическими свойствами: высоким  $G'$ , когезивностью и оптимальными показателями гигроскопичности, что особенно важно при недостаточном объёме мягких тканей и риске гиперкоррекции.

Препаратом выбора является Jufores Ultralink S с реологическими характеристиками, соответствующими зоне коррекции. Инъекции проводятся подкожно канюлей 22G  $\times$  70 мм. Точки доступа: скуловая дуга (2 см от линии роста волос), нижняя точка скуловой кости, угол нижней челюсти. Трассы располагаются веерно, объём препарата — 0,1–0,2 мл на каждую, суммарно до 0,5–1,0 мл на сторону. Процедура завершается лёгким массажем для равномерного распределения препарата.

Работа с данной анатомической зоной позволит восстановить недостающий объём в зоне дефицита, тем самым добиться усиления женского гендера, плавных линий и изящных пропорций, присущих молодому лицу. При использовании препарата Jufores Ultralink S исключена возможность гиперкоррекции, что сохраняет баланс между молодостью и природной эстетикой.



**Татьяна Овчаренко**


клинический анатом,  
Москва

Околоушно-жевательная область ограничена сверху нижним краем скуловой дуги, снизу — нижним краем нижней челюсти, спереди — передним краем жевательной мышцы (*m. masseter*), сзади — задним краем ветви нижней челюсти. В пределах области находится околоушная слюнная железа (*glandula parotidea*), капсула которой прочно срастается с вышележащей поверхностной фасцией; эта плотная соединительная ткань получила название платизменно-аурикулярной фасции (*platysma-auricular fascia*). Формообразующей структурой околоушно-жевательной области является жевательная мышца (*m. masseter*). Она берёт начало на нижней поверхности скуловой дуги и широко прикрепляется к углу и ветви нижней челюсти, где для неё формируется хорошо выраженная жевательная бугристость.

Наиболее безопасным слоем для работы врача является подкожная клетчатка. Несмотря на то, что выраженные соединительнотканые септы могут создавать препятствие для прохождения инструмента, этот слой не содержит магистральных сосудисто-нервных структур. Однако он требует особой точности, поскольку при заглублении инструмента существует риск травмы околоушной слюнной железы.

Глубже, в занижнечелюстной ямке проходит одноимённая крупная вена (*v. retromandibularis*), собирающая кровь от глубоких отделов лица, а ещё глубже располагается наружная сонная артерия (*a. carotis externa*). По переднему краю жевательной мышцы, под мышечно-апоневротическим слоем проходят лицевые сосуды (*a. et v. faciales*), через которые перекидывается краевая ветвь нижней челюсти лицевого нерва (*r. marginalis mandibularis*).

# ОКОЛОУШНО- ЖЕВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ. 37 ЛЕТ

- 
- The diagram illustrates the anatomical structures of the periauricular-masticatory area on a woman's face. A green shaded region highlights the parotid gland (3) and the masseter muscle (5). A red line indicates the facial artery (1), and a blue line indicates the facial vein (2). A blue line also indicates the retromandibular vein (4). The diagram is overlaid on a photograph of a woman's face, showing the ear, nose, and mouth.
1. Лицевая артерия (*a. facialis*)
  2. Лицевая вена (*v. facialis*)
  3. Околоушная железа (*glandula parotidea*)
  4. Занижнечелюстная вена (*v. retromandibularis*)
  5. Жевательная мышца (*m. masseter*)