

Klientvejledning

Behandling med

Booster

Klientvejledning ÅP-1

Godkendt af ansvarlig hudlæge Anne Åbom.
Skrevet af hudlæge Atle Wærsted.

Gennemgås mindst 1 gang årligt. Godkendt d. 3/9-2025.



Information til dig som klient

Denne klientvejledning er udarbejdet for at give dig den bedst mulige forberedelse inden din behandling. Når du møder op til din behandling, bekræfter du samtidig, at du har læst og forstået indholdet i vejledningen.

Vores klientvejledninger er udført af ansvarlig hudlæge Anne Åbom og hudlæge Atle Wærsted. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte klinikken.

Klientvejledning ÅP-1

Godkendt af ansvarlig hudlæge Anne Åbom.
Skrivet af hudlæge Atle Wærsted.

alma

Behandling med Booster

Med tiden og alderen mister huden gradvist sin elasticitet og fylde, hvilket skyldes nedbrydningen af forskellige komponenter i huden som hyaluronsyre, elastin og kollagen. Behandling med booster (ejal40, Prophilo m.fl.), der består af vand og stabiliseret hyaluronsyre, tager sigte på at erstatte tabt fylde. Booster har en høj koncentration af hyaluronsyre, som stimulerer bindevævet's egen produktion af både hyaluronsyre, kollagen og elastin. Injektionsteknikken sikrer, at produktet fordeler sig i hele det injicerede område, som derved løftes, fugtes og udglattes.

Hvor kan man anvende Booster?

Booster kan anvendes som "alenebehandling" eller som supplement til ikke-permanent fillerbehandling, der lægges dybere i huden. Anvendes typisk i kinder og/eller hals, men kan også bruges til hænder og overarme.

Hvor længe holder resultatet?

Holdbarheden varierer efter alder og placering. Generelt er holdbarheden 6-12 måneder.

Hvordan udføres behandlingen?

Der tages klinisk foto inden første behandling, efter behandlingen og ved kontrol.

Du bør så vidt muligt møde op uden makeup.

Huden afsprittes og med en tynd kanyle injiceres booster i et fastlagt mønster.

Der bruges 1 ml i hver kind fordelt i 5 punkter, på halsen 2 ml i 10 punkter. Behandlingen tager oftest 20-30 minutter, afhængigt af hvor mange og hvilke områder, der skal behandles. Der afsættes altid mindst 30 minutter til en behandling. Hvis du ønsker, kan du have en ven/veninde eller familiemedlem med til behandlingen.

Er der forholdsregler før og efter behandlingen?

Før behandlingen anbefales det at holde pause i 1-2 uger med brug af fiskeolie og visse typer af håndkøbsmedicin, der kan virke blodfortyndende.

Man kan genoptage arbejde og almindelige gøremål lige efter behandlingen, dog skal man være opmærksom på at undgå hård fysisk aktivitet de to første døgn.

Man skal undlade at massere eller gnide på det behandlede område og der må først anvendes makeup 4 timer efter behandlingen.

Du skal også undgå at udsætte huden for ekstrem varme eller kulde.

Du bør afstå fra laserbehandlinger, kemiske peelinger, microneedling o.lign. i ansigtet i 2 uger efter behandlingen. Ultraformer/ HIFU-behandling må ikke gives i det behandlede område. Spørg personalet, hvis du er i tvivl.

Hvem kan ikke behandles med Booster?

- Børn og unge under 18 år.
- Gravide eller ammende.
- Personer med aktiv infektion i de ønskede behandlingsområder.
- Personer, som er behandlet med permanent filler i samme område.
- Personer i blodfortyndende behandling eller med alvorlig sygdom.
- Husk at oplyse, hvis du har kroniske smitsomme infektioner som HIV eller smitsom leverbetændelse.

Kan der opstå bivirkninger eller komplikationer efter behandlingen?

Før behandlingen anbefales det at holde pause i 1-2 uger med bEfter behandlingen kan der opstå hævelse, rødme, misfarvning og små buler ved injektionsstederne. Disse forsvinder typisk i løbet af 12-24 timer, men det kan variere, ift. hvor hurtigt produktet fordeler sig. I sjældne tilfælde kan misfarvning vare i flere uger eller måneder.

Enkelte får bumselignende udslæt, som kan vare et par dage. Der ses sjældent infektion; opstår dette, kan det afhjælpes med antibiotikabehandling.

Ved behandling med ikke-permanent filler er der rapporteret følgende sjældne bivirkninger: Granulomdannelse, biofilmdannelse, infektion og, meget sjældent, øjenkomplikationer. Vi kender ikke til, at nogle af disse sjældne fillerbivirkninger er rapporteret ved brug af booster alene.

Hvordan udføres behandlingen?

Før behandling med booster skal du møde til en konsultation hos vores læge eller sygeplejerske. Konsultationen tager udgangspunkt i denne skriftlige information, som du skal have læst. Du må gerne stille spørgsmål, og du er velkommen til have en ven/veninde eller et familiemedlem med.

Herefter skal der gå mindst 48 timer, før du kan blive behandlet. Behandlingen forudsætter dit samtykke. Du skal kun til forkonsultation den første gang, du skal behandles i en ny klinik; herefter kan du komme direkte til efterfølgende behandlinger samme sted.

Ved konsultation og behandling føres journal, inkl. billeder af det behandlede område og CPR-nr. GDPR-regler følges, og informationen lagres krypteret.

Du kan til enhver tid vælge at afbryde/aflyse et behandlingsforløb. Husk at melde afbud, hvis du udebliver. Du er selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os under og efter behandlingsforløbet, hvis du har spørgsmål, eller hvis der opstår bivirkninger efter behandlingen.

