

4.4.3. : Femmes enceintes

Vaccins contre	Pré-conceptionnelle	0-3 SA	4-7 SA	8-11 SA	12-15 SA	16-19 SA	20-23 SA	24-27 SA	28-31 SA	32-36 SA	37-40 SA	Post-partum
Coqueluche (Vaccin Dtcap)						Vaccination recommandée à partir du 2 ^e trimestre (soit 16 SA) et de préférence entre la 20 ^e et la 36 ^e SA, à chaque grossesse, indépendamment du statut vaccinal ^{1,2} .						Une dose est recommandée pour la mère et son entourage, si la vaccination n'a pas été réalisée lors de la grossesse (stratégie de cocooning).
Virus Respiratoire Syncytiaux (VRS)										Une dose est recommandée entre les mois de septembre et janvier ³ .		
Grippe		Une dose est recommandée quel que soit le stade de la grossesse, pendant la campagne saisonnière. La co-administration est possible avec les vaccins contre le VRS ou la Covid-19 ou le dTcaP.										
Covid-19		Une dose est recommandée quel que soit le stade de la grossesse à l'automne. La co-administration est possible avec les vaccins contre le VRS ou la grippe ou le dTcaP										
Rougeole-Oreillons-Rubéole	Si nécessaire, mise à jour avant le début d'une grossesse											Si nécessaire, mise à jour en cas de sérologie négative
Varicelle	Si nécessaire, mise à jour avant le début d'une grossesse											

¹ Un intervalle minimum de 2 semaines est recommandé entre l'administration du vaccin diphtérie-tétanos-coqueluche- polio acellulaire (dTcaP) et l'administration d'Abrysvo.

² Si la naissance intervient dans un délai de moins de 1 mois après la vaccination, la stratégie cocooning doit être mise en place.

³ La HAS recommande que la campagne de vaccination soit concomitante avec la campagne d'immunisation passive par anticorps monoclonal (Beyfortus), soit en amont du début de la période épidémique et jusqu'à la fin de cette période (de septembre à janvier pour la métropole). Si la naissance intervient dans un délai de moins de 14 jours après la vaccination, ou en cas de naissance prématurée un rattrapage par Beyfortus est recommandé. Le vaccin Abrysvo n'est pas recommandé chez les femmes immunodéprimées.