



TIKUN CAP J 31/1 KULTIVAR CAP J

Dopiopharm GmbH
Vermarktung durch Canify

31/1  31%  <1%

Wirkstoffgehalt THC

Wirkstoffgehalt CBD

SORTE	Cap J ist eine hybride Sorte, die aus einer Kreuzung von Alien Cookies und Kush Mints hervorgegangen ist. Cap J zeichnet sich durch einen außergewöhnlich hohen THC-Gehalt aus.
HERKUNFT	Griechenland
SORTIMENT	Dopiopharm
ANBAUSTÄTTE	Tikun Olam Europe
DOMINANZ	Hybrid
KEIMREDUKTION	unbestrahlt
PZN	19856519 (10g) 19856525 (100g)

INHALTSSTOFFE UND POTENZIELLE EFFEKTE

BEKANNTE HAUPTWIRKUNGEN VON THC^{1,2}


- analgetisch
- appetitstimulierend
- muskelrelaxierend
- antiemetisch
- bronchienerweiternd
- psychoaktiv
- krampflösend
- juckreizstillend
- antiinflammatorisch

BEKANNTE WIRKUNGEN DER HAUPTTERPENE³⁻⁶

LIMONEN:	Ist ein Terpen, das u.a. muskelentspannend, stressreduzierend und stimmungsaufhellend wirken kann.
LINALOOL:	Ist für seine beruhigenden und entspannenden Eigenschaften bekannt. Daneben kann das Terpen auch entzündungshemmend und schmerzlindernd wirken.
β-CARYOPHYLLEN:	Hat u.a. entzündungshemmende und angstlindernde Eigenschaften und kann das Immunsystem stärken. Es kann durch Interaktion mit dem CB2-Rezeptor die Wirkung der Cannabinoide unterstützen.
β-MYRCEN:	Ist ein eher dämpfend wirkendes Terpen, das sowohl schmerzlindernde, muskelrelaxierende als auch sedierende Eigenschaften aufweisen kann.

MÖGLICHE EINSATZGEBIETE AUFGRUND DES TERPENPROFILS:

- > zur Beruhigung/Entspannung
- > zur Stimmungsaufhellung
- > Behandlung von Angst- und Schlafstörungen
- > Therapie entzündlicher Erkrankungen sowie zum Nervenschutz
- > Linderung akuter Schmerzen und Muskelentspannung



* Cannabis ist ein Naturprodukt; der prozentuale Anteil der Terpene kann deshalb je nach Charge variieren.



Fachbereich Canify

Pharmazeutischer Unternehmer: **Dopiopharm GmbH**

Friedrich-Eckardt-Straße 22, 36433 Bad Salzungen

Vermarktung: **Canify AG**

Gewerbestraße 11, 82211 Herrsching

0800 1 420 420

kundenservice@canify.com



**TIKUN CAP J 31/1
KULTIVAR CAP J**

Dopiopharm GmbH
Vermarktung durch Canify

DOSIERUNG UND WIRKSHEMA BEI INHALATIVER APPLIKATION VON CANNABISBLÜTEN⁷⁻¹⁰

Die Dosierung von Cannabis erfolgt einschleichend.
Die Startdosis sollte 100 mg Blüte betragen.

EXEMPLARISCHES DOSIERSHEMA

wenn vom Arzt nicht anders verordnet

(„START LOW, GO SLOW AND STAY LOW“)

INHALATIVE APPLIKATION

Wirkungseintritt nach 2–8 min
Maximale Wirkung nach 10–30 min
Dauer der Wirkung: 2–3 h

TAG 1

tgl. Gesamtdosis
100 mg*
entspricht
1 Inhalation/Tag

TAG 2

tgl. Gesamtdosis
200 mg*
entspricht
2 Inhalationen/Tag

TAG 3

tgl. Gesamtdosis
300 mg*
entspricht
3 Inhalationen/Tag

TAG 4

tgl. Gesamtdosis
400 mg*
entspricht
4 Inhalationen/Tag

*Empfohlene Dosis je Inhalation = 100 mg getrocknete Cannabisblüte.

BEISPIELREZEPT: VERORDNUNG VON CANNABISBLÜTEN

Ausdruck zur Einlösung Ihres E-Rezeptes

für	geboren am
Mustermann 1 Niels	05.10.82

ausgestellt von	ausgestellt am
Dr. Sebastian Muster 6 Facharzt für Innere Medizin Tel 12345-67890 praxis@praxis.de	01.10.25 2

3 Tikun CAP J 31/1
unzerkleinert abgeben
abends 200mg verdampfen und
inhalieren 4

5

Samenloske zur Einlösung aller Verordnungen

Die App zum E-Rezept
einfach • schnell • flexibel
E-Rezept jetzt papierlos empfangen

Die Voraussetzungen und weitere Informationen finden Sie
online auf www.schulmedizin.de/gesundheitspolitik und
bei der technischen Hotline 0900 277 377 7

Barneausdruck DTM AG (© 2021)

- 1 Name und Vorname des Versicherten
- 2 Datum der Rezeptaussstellung
- 3 Eindeutige Arzneimittelbezeichnung
- 4 Mengenangabe und Wirkstoffstärke (je Packungseinheit und absolut)
- 5 Genaue Dosierangabe (Einzel-/Tagesdosis)
- 6 Angaben des Arztes

REFERENZEN

- ¹ Modifiziert nach Narouze SN and MacCallum CA. Cannabinoids and Pain. © Springer Nature Switzerland AG 2021.
- ² De Fátima dos Santos Sampaio, M., de Paiva, Y. B., Sampaio, T. B., Pereira, M. G., & Coimbra, N. C. (2024). Therapeutic applicability of cannabidiol and other phytocannabinoids in epilepsy, multiple sclerosis and Parkinson's disease and in comorbidity with psychiatric disorders. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 134(5), 574-601.
- ³ Baron EP et al. Patterns of medicinal cannabis use, strain analysis, and substitution effect among patients with migraine, headache, arthritis, and chronic pain in a medicinal cannabis cohort. J Headache Pain 2018; 19:37.
- ⁴ Russo EB. Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects. BJP 2011; 163:1344-1364. lupulus. Eur J Med Chem 2018; 157:198-228.
- ⁵ Nuutinen T. Medicinal properties of terpenes found in Cannabis sativa and Humulus lupulus. Eur J Med Chem 2018; 157:198-228.
- ⁶ Mahita M. Identification of a Novel GABAA Receptor Channel Ligand Derived from Melissa officinalis and Lavandula angustifolia Essential Oils. European Journal of Medicinal Plants, 4(7), 2014; 810-818.
- ⁷ Häuser W. European Pain Federation (EFIC) position paper on appropriate use of cannabis based medicines and medical cannabis for chronic pain management. Eur J.
- ⁸ MacCallum C and Russo E. Practical considerations in medical cannabis administration and dosing. Eur J Intern Med 2018;49:12-19.
- ⁹ Health Canada. INFORMATION FOR HEALTH CARE PROFESSIONALS Cannabis (marihuana, marijuana) and the Cannabinoids. 2018.
- ¹⁰ Hazekamp A et al. Evaluation of a vaporizing device (Volcano) for the pulmonary delivery of Tetrahydrocannabinol. J Pharm Sci 2006;95:1308-17.

Pharmazeutischer Unternehmer: **Dopiopharm GmbH**

Friedrich-Eckardt-Straße 22, 36433 Bad Salzungen

Vermarktung: **Canify AG**

Gewerbestraße 11, 82211 Herrsching

0800 1 420 420

kundenservice@canify.com



Fachbereich Canify

CFY-K030-04-07-25