



Module 3

CONTRE INDICATIONS DE L'HYDRALIFT

ÆSTHETEC

Infections actives de la peau

Herpès labial : Si le patient présente des boutons de fièvre actifs ou un herpès labial, il est préférable de reporter le traitement pour éviter toute aggravation de l'infection.

Infections bactériennes : Les infections cutanées bactériennes, telles que l'impétigo, doivent être traitées et résolues avant de réaliser un Hydralift.

Acné active

Affections dermatologiques sévères

Rosacée sévère : Bien que l'Hydralift puisse être bénéfique pour la rosacée légère à modérée, les formes sévères de cette affection nécessitent souvent des traitements spécifiques et un suivi médical étroit.

Eczéma et psoriasis : Les zones de peau atteintes d'eczéma actif ou de psoriasis doivent être évitées, car le traitement pourrait irriter davantage la peau.

ÆSTHETEC

Plaies ouvertes et brûlures

Coup de Soleil : La peau récemment brûlée par le soleil est trop sensible pour subir un traitement Hydralift. Il est recommandé d'attendre que la peau ait complètement guéri.

Plaies et Écorchures : Toute plaie ouverte ou écorchure doit être complètement guérie avant d'entreprendre un traitement pour éviter toute irritation ou infection supplémentaire.

Cicatrice de moins 1 an (2 pour être sur)

Allergies Connues

Allergies aux ingrédients des sérums : Si le patient est allergique à l'un des ingrédients des sérums utilisés dans le traitement Hydralift, des réactions indésirables peuvent survenir. Il est important de vérifier les allergies avant le traitement.

ÆSTHETEC

Conditions médicales spécifiques

Grossesse : Bien que l'Hydra-Lift soit généralement considéré comme sûr, il est recommandé de consulter un médecin avant de subir ce traitement pendant la grossesse.

Affections auto-immunes : Les patients atteints de certaines affections auto-immunes, telles que le lupus, doivent consulter leur médecin avant de recevoir un traitement Hydra-Lift

Prise de médicaments : Les patients prenant des médicaments photosensibilisants ou immunosuppresseurs doivent discuter des risques potentiels avec leur médecin

Attention : Traitement Roaccutane **OK après 6 mois d'arrêt**

Attention : Traitement chimiothérapie : **NON**

Procédures Récentes

Interventions esthétiques récentes : Les patients ayant récemment subi des interventions esthétiques invasives, comme les peelings chimiques profonds ou les traitements au laser, doivent attendre que la peau soit complètement guérie avant de recevoir un Hydralift.

Injection de produits de comblement : Il est recommandé d'attendre au moins deux semaines après des injections de produits de comblement (comme le Botox ou les fillers) avant de subir un Hydralift.