

Münchener Nomenklatur III

modifiziert nach Koordinations-Konferenz Zytologie (KoKoZyt)

| GRUPPE | DEFINITION |
|-------------|---|
| 0 | Unzureichendes Material |
| I | Unauffällige und unverdächtige Befunde |
| II-a | Unauffällige Befunde bei auffälliger Anamnese |
| II | Befunde mit eingeschränkt protektivem Wert |
| II-p | Plattenepithelzellen mit geringergradigen Kernveränderungen als bei CIN1, auch mit koilozytärem Zytoplasma/Parakeratose |
| II-g | Zervikale Drüsenzellen mit Anomalien, die über das Spektrum reaktiver Veränderungen hinausreichen |
| II-e | Endometriumzellen bei Frauen >40. Lebensjahr in der zweiten Zyklushälfte |
| III | Unklare bzw. zweifelhafte Befunde |
| III-p | CIN2 / CIN3 / Plattenepithelkarzinom nicht auszuschließen |
| III-g | Ausgeprägte Atypien des Drüsenepithels, Adenocarcinoma in situ/invasives Adenokarzinom nicht auszuschließen |
| III-e | Abnorme endometriale Zellen (insbesondere postmenopausal) |
| III-x | Zweifelhafte Drüsenzellen ungewissen Ursprungs |
| IIID | Dysplasiebefunde mit größerer Regressionsneigung |
| IIID1 | Zellbild einer leichten Dysplasie analog CIN1 |
| IIID2 | Zellbild einer mäßigen Dysplasie analog CIN2 |
| IV | Unmittelbare Vorstadien des Zervixkarzinoms |
| IVa-p | Zellbild einer schweren Dysplasie / eines Carcinoma in situ analog CIN3 |
| IVa-g | Zellbild eines Adenocarcinoma in situ |
| IVb-p | Zellbild einer CIN3, Invasion nicht auszuschließen |
| IVb-g | Zellbild eines Adenocarcinoma in situ, Invasion nicht auszuschließen |
| V | Unmittelbare Malignome des Zervixkarzinoms |
| V-p | Plattenepithelkarzinom |
| V-g | V. a. endozervikales Adenokarzinom |
| V-e | V. a. endozervikales Adenokarzinom |
| V-x | V. a. andere Malignome, auch unklaren Ursprungs |