


Vlčí kaluž



49.5187500N, 18.6730853E

Název: Vlčí kaluž

Výměra: 12,85 ha

Evidenční číslo: 053

Organizační jednotka LČR: OŘ Severní Morava, Lesní správa Jablunkov

Rok zařazení mezi ostrovy obnovy přírody: 2025

Údaje o lokalizaci ostrova:

- LHC Jablunkov, dílec 410 F
- Moravskoslezské Beskydy, v blízkosti NPR Mionší, PR Uplaz a PR Velký Polom
- katastrální území Dolní Lomná, p.č.: 1372/1

Předmět péče: biotop pro tetřeva hlušce

Popis předmětu péče:

Ostrov se nachází v nadmořské výšce od cca 850 – 950 m n.m. Ze severní strany navazuje na národní přírodní rezervaci Mionší, ze západní na přírodní rezervaci Uplaz. V blízkosti jižním směrem je přírodní rezervace Velký Polom a hranice se Slovenskem. Celá plocha ostrova je součástí „Tetřeví oblasti Mionší – Polom“ vymezené na základě dohody mezi Lesy ČR, s.p. a Agenturou ochrany přírody. Účelem oblasti je zajištění existence funkční tetřeví populace při současném umožnění přírodě blízkého hospodaření v lesích.

Popis současného stavu v souvislosti s předmětem péče:

Největší část plochy ostrova zaujímá plocha po kůrovcové kalamitě. Na této ploše se nachází 4 oplocenky z drátěného pletiva se zradidly pro zamezení zranění tetřeva hlušce při případných přeletech. V oplocenkách jsou dřeviny z přirozené obnovy – bříza, jeřáb ptačí, smrk, buk a modřín doplněné umělou výsadbou jedle a javoru klenu. Na ploše mimo oplocenky byl kromě dřevin z přirozené obnovy uměle dosazen buk. Ve zbytcích starých porostů (90-130 let) se nachází staré sterilní souše včetně zdravých jedinců smrku a buku. V těchto porostech jsou provedeny podsadby jedle. Poslední součástí ostrova jsou mladé lesní porosty ve věku od 10 do 35 let. Jsou tvořeny smrkem, bukem a jedlí. Na ploše ostrova byla provedena strojní úprava několika přibližovacích linek, které byly poškozeny při zpracovávání kůrovcové kalamity a byly zdrojem soustředěného povrchového odtoku srážkové vody. Asanace byla provedena certifikovanou metodou „jáma – hráz – jáma“, která eliminuje povrchový odtok a zajišťuje její vsakování. Za účelem zadržení vody a vytvoření vhodného biotopu pro vodní organismy bylo součástí asanace i vybudování 2 vodních tůň.

Historický vývoj ekosystému, který je předmět péče, nebo biotopu předmětu péče:

Významným fenoménem ovlivňujícím tvář a využití beskydské krajiny se od konce 15. století stala valašská kolonizace, tedy využití zvláště plochých hřebenů ve vyšších polohách pro pastvu ovcí a dalšího dobytka, spojené s poměrně velkým odlesněním nebo proředěním lesních porostů a jejich přeměnou na pastviny. K postupnému úpadku salašnictví začalo docházet na přelomu 18. a 19. století v důsledku příchodu industrializace, a tím i zvýšené poptávky po dřevě vedoucí k zavádění intenzivního lesního hospodářství. Plocha pastvin i množství dobytka, který se na nich pásal, byly postupně omezovány a nahrazovány lesními porosty, často smrkovými monokulturami. Tyto stejnověké smrkové monokultury se ještě nedávno nacházely i na podstatné ploše ostrova. Postupné chřadnutí smrkových porostů, které se v Moravskoslezských Beskydech již nějakou dobou projevuje, a následná kůrovcová kalamita v letech 2019-2020 způsobily jejich rozpad a vznik holiny. V současné době je snaha různými postupy obnovit na této ploše druhově pestrý a odolný les.

Popis plánované péče:

Na ploše po kůrovcové kalamitě budeme ve stávajících oplocenkách i mimo ně sledovat a podporovat vývoj přirozené obnovy s cílem zajistit vznik druhově pestrého a výškově a prostorově diferencovaného lesního porostu. Místa bez přirozené obnovy uměle doplníme stanovištně vhodnými dřevinami. Při následných výchovných zásazích budeme usilovat o zachování co nejpestřejší druhové skladby a zajištění stability porostu. Způsob provádění výchovných zásahů přizpůsobíme požadavkům na vytváření vhodného biotopu pro obnovu populace tetřeva hlušce. Zbytky starých porostů ponecháme samovolnému vývoji s možností pokračování v podsadbách jedle. Výchovné zásahy v mladých porostech ostrova budeme rovněž směřovat pro podporu tetřeví populace. Vodní tůňe plánujeme udržovat tak, aby neztratily svoji funkčnost a schopnost tvořit vhodný biotop pro vodní organismy (periodické prohlubování, výsek břehů pro zabránění zastínění apod.).

Porostní lesnická mapa se zákresem hranic ostrova:

