3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Hoeveel van dit middel moet u gebruiken?
Uw behandeling wordt gestart met een lage dosis die gedurende 12 weken behandeling geleidelijk wordt verhoogd.

- De startdosis is één tablet van 1,5 mg eenmaal per dag, gedurende vier weken.
- Uw arts zal u instructies geven om uw dosis geleidelijk aan elke vier weken te verhogen tot u de aanbevolen dosis van 25 mg eenmaal daags. Indien nodig kan de dosis gelijk blijven aan de vorige dosis.
- Wanneer u de aanbevolen dosis van 25 mg heeft bereikt, mag u deze dosis niet verder verhogen.

Meestal zult u de volgende tabel moeten aanhouden:

Dosis ophoging	Dagelijkse dosis
Week 1–4	1,5 mg
Week 5–8	4 mg
Week 9–12	9 mg
Vanaf week 13	25 mg

Uw arts zal uw behandeling regelmatig controleren. U mag niet twee tabletten nemen om het effect van een hogere dosis te krijgen.

Inname van dit middel

- Neem de Wegovy tablet in op een lege maag, aanbevolen wordt inname nadat u ten minste 8 uur niets gegeten of gedronken heeft.
- Slik de Wegovy tablet in zijn geheel door met een slok water (maximaal 120 ml). Tabletten mogen niet worden gebroken, geplet of gekauwd, aangezien niet bekend is of dit de absorptie van semaglutide beïnvloedt.
- Wacht na het innemen van de Wegovy tablet minstens 30 minuten voordat u iets eet, drinkt of andere orale geneesmiddelen inneemt. Minder dan 30 minuten wachten vermindert de absorptie van semaglutide.

Mensen met diabetes type 2
Vertel het uw arts als u diabetes type 2 heeft. Uw arts kan de dosis van uw geneesmiddelen voor diabetes aanpassen om te voorkomen dat u een lage bloedsuiker krijgt.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Neem onmiddellijk contact op met uw arts. U kunt bijwerkingen krijgen, zoals misselijkheid.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Als u bent vergeten een dosis in te nemen, slaat u de vergeten dosis over en neemt u de volgende dag uw gebruikelijke dosis in.

Als u stopt met het gebruik van dit middel
Stop het gebruik van dit middel niet zonder dit met uw arts te bespreken.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.