



POUČENIE A INFORMOVANÝ SÚHLAS PACIENTA OČKOVANIE (VAKCINÁCIA)

Vážený pán / Vážená pani,

do rúk sa Vám dostávajú informácie o povinnom očkovaní - vakcinácii. Chceme, aby ste boli o tomto zdravotnom výkone náležite informovaný/á, nielen ústne, ale aj v písomnej forme.

Tento dokument je vypracovaný v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti.

V prvom rade Vám chceme dať na vedomie, že Informovaný súhlas pre nás nie je iba Váš „podpis“, ale predstavuje vzájomnú, zrozumiteľnú komunikáciu medzi nami ako poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a Vami ako zákonným zástupcom dieťaťa. Prostredníctvom Informovaného súhlasu rozhodujete o zdraví dieťaťa a určujete akými prostriedkami môžeme zasahovať do jeho integrity. Naším cieľom je, aby zdravotná starostlivosť v každom ohľade rešpektovala osobnostné práva dieťaťa a v čo najmenšej miere do nich zasahovala.

Nasledujúce poučenie je napísané preto, aby Vám na základe informácií v ňom obsiahnutých umožnilo rozhodnúť sa, či súhlasíte s takouto formou prevencie. Súčasťou je písomný informovaný súhlas, ktorý sa nachádza na konci tohto poučenia.

Keďže informovaný súhlas je právny dokument, žiadame Vás, aby ste si ho pozorne prečítali. Ak po prečítaní a porozumení všetkých informácií, vrátane možných komplikácií, súhlasíte s podstúpením vyšetrenia, prosíme Vás, aby ste toto poučenie a informovaný súhlas podpísali.

V prípade, že niečomu nerozumiete, prípadne si želáte niečo prekonzultovať, nepodpisujte informovaný súhlas ihneď, ale až po konzultácii a vysvetlení zdravotníckym pracovníkom.

Tento dokument je rozdelený na dve časti:

1. Informácie týkajúce sa zdravotného výkonu (očkovanie)
2. Informované rozhodnutie pacienta

1. INFORMÁCIE O VÝKONE

Prosíme Vás, aby ste si nižšie uvedené informácie prečítali pozorne. **Pokiaľ niečomu nerozumiete alebo budete mať ďalšie otázky, neváhajte sa s nimi na nás obrátiť.** Cieľom informácií nie je podať vyčerpávajúci vedecký/odborný opis (očkovania), ale zrozumiteľným spôsobom informovať o základných znakoch, dôvode pre realizáciu, rizikách, možných následkoch a alternatívnych postupoch.

A) ÚČEL OČKOVANIA - VAKCINÁCIE

Očkovanie (vakcinácia) je preventívnym opatrením, ktorého cieľom je aktívna ochrana pred vznikom prenosného, tj. infekčného ochorenia. To je spôsobené mikroorganizmami - baktériami, vírusmi, plesňami alebo parazitmi, pričom niektoré z nich môžu spôsobiť závažné poškodenie zdravia až smrť. Do 19. storočia boli infekčné choroby najčastejšou príčinou úmrtia, až očkovanie sa ukázalo ako zatiaľ najlepší spôsob ako dosiahnuť zníženie počtu ochorení na prenosné infekčné choroby.

Pod termínom očkovanie rozumieme podanie očkovacej látky tj. vpravenie vakcinálnych antigénov do tela s cieľom vyvolať imunitnú reakciu organizmu. Po tom, ako sa očkovacia látka so svojou aktívnou zložkou dostane do organizmu, dostáva sa do lymfatickej uzliny, kde následne dochádza k vytvoreniu imunitnej odpovede, tento proces sa nazýva imunizácia, ktorej výsledkom je vytvorenie špecifickej imunity.

Postup pri očkovaní ako aj zloženie vakcíny sa určuje na základe predklinického skúšania. Skúšanie je dlhodobý proces trvajúci aj niekoľko rokov (15 – 20 rokov), v ktorom sa testuje bezpečnosť a účinnosť vakcín. Z celkovej doby vývoja vakcíny odhadom až 70% času pripadá na skúmanie jej

bezpečnosti a efektívnosti. Výsledkom skúšania očkovacích látok je určenie dávky, postup a schéma pri podaní každej vakcíny. Každá vakcína má príbalovú informáciu, ktorá obsahuje popis jej základných vlastností a pôsobenia.

B) SPÔSOB ZDRAVOTNÉHO VÝKONU A JEHO ROZSAH

Preto, aby bolo očkovanie účinné, je potrebné podať niekedy nielen jednu ale aj viac dávok očkovacej látky v dopredu určených intervaloch. Pre očkovanie, ktoré má vytvoriť základnú ochranu organizmu sa používa termín základná schéma očkovania. Tá je určená zložením konkrétnej vakcíny alebo aj charakterom samotného ochorenia, proti ktorému sa očkuje. Z pohľadu možných kontraindikácií, opatrnosti alebo intervalov medzi jednotlivými očkovaniami rozlišujeme medzi vakcináciou **živými** a **neživými vakcínami**.

Živé očkovacie látky obsahujú živé oslabené mikroorganizmy. V rámci povinného očkovania sa očkuje u nás živou vakcínou proti osýpkam, mumpsu a rubeole. Nepovinne sa môže očkovať proti rotavírusovým infekciám a ovčím kiahňam. Živá očkovacia látka je aj proti tuberkulóze, očkovanie však u nás už nie je v povinnom očkovačom kalendári. Pri ceste do endemických krajín sa očkuje proti žltej zimnici.

Vakcinácia neživými látkami si vyžaduje na stimuláciu imunity opakované podanie, preto sa pri neživých očkovacích látkach podávajú spravidla viaceré injekcie. Pre predĺženie ochranných účinkov je potrebné očkovanie opakovať s určitými časovými odstupmi.

Očkovacie látky sa môžu podávať do svalu, do podkožia, do kože alebo sa podávajú ústami (perorálne), prípadne

Prehlasujem, že som bol poučený/bola poučená, a že rozumiem informáciám uvedeným v tomto dokumente.

Dňa:

Podpis:

inhalačne. U malých detí sa vakcíny podávajú do štvorhlavého stehenného svalu, od veku 1 roka sa môže očkovať do ramenného svalu. Podanie vakcíny závisí od typu vakcíny a realizuje sa na základe o cialneho odporúčania v príbalovom letáku vakcíny.

Očkovanie má v populácii dve základné funkcie:

- **individuálna funkcia**
- **kolektívna funkcia**

Individuálna funkcia spočíva v ochrane konkrétneho zaočkovaného jednotlivca.

Kolektívna funkcia značí, že pri vysokej preočkovanosti populácie sa vytvára tzv. kolektívna ochrana. Kolektívna ochrana chráni nielen očkované, ale aj nezaočkované osoby. V závislosti od konkrétneho ochorenia sa vyžaduje preočkovanosť populácie od 80 percent až k 95 percentám. Potvrďuje sa, že zníženie preočkovanosti populácie, a to aj vtedy ak sa ochorenie v populácii už neobjavuje, znamená zníženie kolektívnej ochrany a riziko znovu vypuknutia prenosných ochorení.

C) KONTRAINDIKÁCIE PRE REALIZÁCIU VÝKONU

Vhodnosť očkovania sa posudzuje individuálne podľa zdravotného stavu dieťaťa resp. dospelaj osoby.

Lekár teda v spolupráci s pacientom (zákonným zástupcom) zhodnocuje zdravotný stav pacienta. Následne môže pristúpiť k zhodnoteniu, že:

- **existuje kontraindikácia:** pri kontraindikácii sa očkovacia látka nesmie podať. U pacienta totiž hrozí riziko nežiaducich účinkov s trvalým následkom alebo stavom ohrozujúcim život. V prípade, ak sa z dôvodu výskytu kontraindikácie neočkuje, sú v niektorých prípadoch stanovené preventívne postupy.
- **je vhodná opatrnosť pri očkovaní:** je na mieste tam, kde je prítomné riziko vzniku vedľajších príhod alebo existuje možnosť, že očkovanie nevytvorí žiaducu ochrannú imunitu. Tu sa zvažuje a očkovanie indikuje vtedy, keď úžitok ochrany preváži riziko vzniku nežiaducich účinkov alebo nedostačujúcej imunitnej odpovede.
- **je vhodný odklad očkovania (dočasná kontra-indikácia):** v prípade akútnych ochorení alebo zhoršenia chronického ochorenia, užívania niektorých liečiv, ktoré zasahujú do imunitného systému. Očkovanie sa potom realizuje čo najskôr, keď pominú zdravotné dôvody na odklad očkovania.

D) OČKOVACÍ KALENDÁR

VEK	DRUH	TYP OČKOVANIA
3. mesiac	záškrt, tetanus, detská obrna, čierny kašeľ, vírusová hepatitída B, hemofilové invazívne infekcie, pneumokokové invazívne	1.dávka
5.mesiac		2.dávka
11.mesiac		3.dávka

	ochorenia	
15.-18. mesiac	osýpky, mumps, rubeola	I.dávka
5. rok	osýpky, mumps, rubeola	II. dávka
6. rok	záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna	preočkovanie
13. rok	detská obrna, čierny kašeľ, detská obrna	preočkovanie
dospelí	záškrt, tetanus	prvé preočkovanie sa odporúča vo veku 30 rokov a potom každých 15 rokov

E) MOŽNÉ VEDĽAJŠIE PRÍHODY PO OČKOVANÍ

Každý liek môže mať nežiaduce účinky. Nežiaduce účinky lieku, tak aj očkovacích látok (vakcín), sa zisťujú počas predklinického aj klinického skúšania. Nežiaduce účinky očkovacích látok sa striktne posudzujú v niekoľkých fázach (a to aj po uvedení na trh).

Teda aj po podaní vakcín sa môžu vyskytnúť vedľajšie príhody, za ktoré sa považuje každý klinický príznak, subjektívne ťažkosti, ochorenie, patologické (nezdravé - nevyhovujúce) laboratórne nálezy, ktoré sa objavia u jedinca v období po očkovaní.

Môže ísť o prejavy vyvolané:

- stresovou reakciou na očkovanie,
- imunitnou reakciou organizmu na vpichnutú látku pretrvávajú, kontaktujte lekára.
- alergickou reakciou na očkovaciu látku (zriedkavé),
- závažnejšiu reakciu (extrémne zriedkavé).

Pre optimálne zvládnutie očkovania je preto vhodné v pokoji sa pripraviť na možný výskyt, a to najmä očakávaných reakcií. Najčastejšie sú vedľajšie príhody spojené s tým, že po očkovaní tj. vpichnutí očkovacej látky imunitný systém dieťaťa „pracuje“ a teda reaguje na cudzorodý antigén, akým je očkovacia látka.

Veľmi časté reakcie (viac ako 10 % prípadov):

- Opuch, začervenanie, citlivosť kože – Miesto vpichu môže byť bolestivé na dotyk, začervenané, tvrdé s opuchom do 5 cm. Mierne príznaky nie je potrebné ošetrovať. Pri výraznejších opuchoch prikladajte studené obklady, prípadne kontaktujte pediatra, či je vhodné podávať lieky proti bolesti alebo alergickému zápalu. V prípade hnisanie v mieste vpichu alebo neustupujúceho opuchu a začervenania, vyhľadajte lekára.

Časté nežiaduce účinky (v 1 – 10 % prípadov):

- Nepokoj, podráždenosť – Príčinou zmien správania môžu byť pocity pri očkovaní samotnom, ktoré nemusia byť príjemné. Môže ísť aj o postresovú situáciu, ak bolo očkovanie pre dieťa traumatické. Väčšina týchto prejavov odznie, je potrebné vytvoriť dieťaťu pocit bezpečia a lásky. V

- prípade, ak takýto stav trvá dlhšie ako 1 týždeň, vyhľadajte lekára.
- Poruchy spánku – Po očkovaní môže byť dieťa unavenejšie alebo naopak môže mať problémy so zaspávaním. V prípade, ak veľa spí, netreba ho budiť, ak naopak má problémy so zaspávaním, malo by byť hore, až kým sa neunaví. Lekára kontaktujte v prípade, ak sa tieto problémy vyskytujú dlhšie ako týždeň.
 - Zvýšená teplota – Dieťaťu po očkovaní pravidelne merajte teplotu. Ide o očakávanú prirodzenú reakciu imunitného systému. Zvýšenú teplotu (do 38 stupňov Celsia) nie je potrebné zrážať, pri teplote nad 38 stupňov Celsia (horúčka) je potrebné podávanie liekov proti horúčke. Tie podávajte v pravidelných intervaloch. Pokiaľ teplota stále stúpa v intervale medzi podaním lieku na zníženie teploty, podajte iný liek. Ak teplota pri podávaní lieku neklesá, pristúpte k zábalom. V prípade, ak teplota vystúpi na viac ako 40 stupňov alebo horúčka pretrváva viac ako 24 hodín, vyhľadajte lekára.
 - Nechutenstvo, zvracanie – Ak sa vyskytne riedka stolica, zvracanie alebo strata chuti do jedla, nepodávajte lieky na hnačku, ale dbajte na pitný režim dieťaťa, aby nedošlo k dehydratácii, na ďalšom postupe sa dohodnite s ošetrovateľom lekárom. V prípade, ak stav opakovaného vracania riedkej stolice pretrváva, kontaktujte lekára.

Menej časté nežiaduce účinky (0,1-1 %):

- Nezvyčajný plač – Ak plač dieťaťa neustále trvá dlhšie ako tri hodiny a je vo vyššom tóne ako obvyčajne, kontaktujte pre preverenie príčiny svojho ošetrojúceho lekára.
- Teplota na 39 stupňov Celzia – Horúčku zrážame s pomocou liekov, ktoré je potrebné podávať v pravidelných intervaloch. Ak teplota aj po podaní liekov prípadne zábalov trvá viac ako 24 hodín, vyhľadajte lekára.
- Bolesť svalov

Zriedkavé nežiaduce účinky (0,01- 0,1 %):

- Alergická kožná reakcia – je taktiež alergickou reakciou, prejavujúcou sa na koži. Toto alergické zápalové kožné ochorenie je reakciou na vystavenie kože alergénu. Prejavy môžu byť rozmanité. Pri výskyte svrbivých pupencov, pľuzgierov, kontaktujte ošetrojúceho lekára.
- Bolesť kĺbov, krčie

Veľmi zriedkavé nežiaduce účinky (menej ako 0,01 %):

- Anafylaktický šok – Ide o veľmi zriedkavú systémovú alergickú reakciu. Prejavuje sa rôzne – závrat, vracanie, pocit chladu, trasenie. Táto reakcia sa prejavuje do hodiny, preto je dôležité zotrvať na pozorovaní cca 30 minút po očkovaní. Vo väčšine prípadov tieto reakcie vyvolávajú stabilizujúce a pomocné látky než účinná látka vakcíny. Najčastejšími alergénmi sú kvasnice, antibiotiká, želatína, proteíny.
- Poruchy vedomia - kolapsový stav alebo hypotonicko-hyporesponzívna epizóda u dojčiat (stav, kedy je dieťa apatické, ochabnuté, má slabšie pohyby, nereaguje na podnety z okolia ako predtým)
- Zápal nervov (neuritída) – prejavuje sa zvýšenou alebo zníženou citlivosťou nervu a výraznou bolesťou.

- Poruchy hybnosti – Šetrenie končatiny z dôvodu bolesti po očkovaní je normálna. Pri poruche chôdze však kontaktujte lekára.
- Slabosť – V prípade ak je dieťaťo po očkovaní ochabnuté, prejavuje sa to ochabnutým ležaním, je potrebné kontaktovať lekára a vyšetrenie u špecialistu.

V prípade, že sa objavia vedľajšie príhody, informujte svojho pediatra. Ten zváži, či ide o kontraindikáciu ďalšieho očkovania alebo dieťaťo odporučí na návštevu špecializovaného centra na očkovanie prípadne zároveň podá lieky na zmiernenie nežiaducich účinkov.

F) RIZIKÁ ODMIETNUTIA VÝKONU

Odmietnutie výkonu znamená, že osoba, ktorá nebude očkovaná, nie je chránená pred závažnými infekčnými ochoreniami, ktoré môžu spôsobiť nezvratné poškodenie zdravia až smrť. Rovnako v prípade svojho nakazenia môže významne ohroziť zdravie ešte neočkovaných osôb.

G) ALTERNATÍVY VÝKONU

Alternatívou očkovania podľa schémy je odloženie očkovania, voľba alternatívnej štátom hradenej vakcíny alebo vakcíny štátom nehradenej, voľba inej očkovacej schémy.

H) ODPORÚČANIA PRED VÝKONOM

Pred podpisom tohto IS informujte lekára o:

- alergií na lieky alebo potraviny,
- vedľajších príhodách po predchádzajúcom očkovaní (po konkrétnej vakcíne),
- ochoreniach, na ktoré je dieťa dlhodobo liečené (neurologické, kardiologické, poruchy imunity a pod.),
- aktuálne užívaných liekoch,
- očkovaníach za posledné 3 mesiace.

Oddych: Dieťaťu sa pred očkovaním odporúča dopriať dostatok oddychu, málo stresu a zachovať jeho bežný denný režim.

Vhodné oblečenie:

- Odporúča sa voľnejšie oblečenie. Oblečenie by nemalo byť tesné, dieťaťo obmedzovať v pohybe, ťahať, svrbieť – cieľom je predísť podráždeniu miesta vpichu.
- Snažte sa vybrať oblečenie dieťaťu tak, aby pediatri neprekážalo pri očkovaní, a aby ste strávili minimum času jeho dooblekaním po očkovaní.

I) POSTUP PRI OČKOVANÍ

1. informujte pediatra o akýchkoľvek ťažkostiach dieťaťa, o prejavoch, ktoré sa Vám nepozdávajú (zmeny správania, spánok...),
2. informujte pediatra o Vašich plánovaných cestách, aktivitách v nasledujúcom období,
3. samotné očkovanie by malo nasledovať v závere návštevy pediatra,
4. počas očkovania sa snažte dieťaťo zaujať napríklad jeho obľúbenou hračkou,
5. neodchádzajte počas očkovania od dieťaťa,
6. dieťaťo po očkovaní vezmite na ruky, aby sa upokojilo, čo môže trvať ešte nejakú chvíľu,
7. staršie deti za ich statočnosť pochváľte,
8. počas nasledujúcich 30 minút sa zdržujte v dosahu lekára (v ambulancii alebo v čakárni), aby ste mohli zareagovať

v prípade, ak by sa vyskytla zriedkavá, ale závažná vedľajšia príhoda – ťažká alergická reakcia a s ňou spojený anafylaktický šok.

J) POSTUP PO OČKOVANÍ

Dieťaťko môže byť po očkovaní plačlivé, apatické, unavené alebo podráždené. Jeho organizmus „pracuje“, vytvára sa mu špecifická imunita. Imunitná odpoveď sa zvyšuje, keď dieťaťko veľa spí. V tomto období je potrebné venovať dieťaťu svoju energiu, upokojiť ho, zabaviť ho jeho obľúbenou hračkou. Očkovaný jedinec má mať minimálne 24 hodín telesné šetrenie (žiadne tréningy, športové aktivity a pod.), to isté platí pred samotným výkonom očkovania. Dieťaťku je potrebné kontrolovať telesnú teplotu, a to aj počas spánku. Ak je pre dieťa meranie teploty stresujúce, skúste vybrať taký teplomer, ktorý mu spôsobuje čo najmenší diskomfort (napr. ušný, cumlíkový...).

IHNEĎ pediatra upozornite (telefonicky, emailom, osobne), ak sa u dieťaťka vyskytne:

- dlhodobo zvýšená teplota nad 38 °C,
- bolesť, ktorá sa napriek užívaniu vyššie odporúčaných liekov
- proti bolesti zvyšuje, alebo dlhšie neustupuje,
- ďalšie zvýrazňovanie opuchov alebo krvácanie,
- nevoľnosť alebo zvracanie, odmietanie stravy,

- neutišiteľný plač, apatia, ochabnosť, sťažené dýchanie.

K) ZLOŽENIE VAKCÍNY

Pozorne si prečítajte písomnú informáciu o zložení vakcíny predloženú pediatrom. V prípade, ak niečomu nerozumiete, nebojte sa opýtať.

I) PLÁNOVANÉ CESTY

Zvážte odloženie plánovaných ciest (dovolenky, služobné cesty, škola v prírode...) v období bezprostredne po očkovaní. Aj keď riziká opísané vyššie nepredpokladáme, môžu sa vyskytnúť a môžu zabrániť realizácii plánovaných ciest. Uvedené je potrebné brať do úvahy.

Vážený pán/Vážená pani,

táto naša dôkladná a dôfame, že zrozumiteľná informácia isto nemôže byť úplne vyčerpávajúca a nemusí plne zodpovedať Vaše otázky. Pýtajte sa nás preto na všetko, čo Vás vo vzťahu k Vášmu zdravotnému stavu a odporúčanej zdravotnej starostlivosti zaujíma. **Prosím, pýtajte sa na všetko, čo sa Vám zdá dôležité!**

2. Informované rozhodnutie pacienta s očkovaním (ďalej ako „výkon“)

Pacient ¹:

Meno a priezvisko:

Rodné číslo:

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (tiež ako „ambulancia“) ²:

Názov: SLUŠNÁ AMBULANCIA, s. r. o.

Sídlo: ŠPITÁLSKA 13, 949 01 NITRA

IČO: 456 33 470

Tel./ E-mail: dostupné na webe ambulancie

1) VYHLÁSENIE PACIENTA (ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU)

Ja ako pacient svojim podpisom potvrdzujem, že som bol/a pred udelením informovaného súhlasu plne poučený/a (zrozumiteľne, bez nátlaku a v dostatočnom časovom predstihu) v rozsahu uvedenom v písomnom vyhotovení poučenia a to najmä:

- o povahe môjho ochorenia, o dôvode, účele, spôsobe a možnostiach zdravotnej starostlivosti, ktorá mi má byť poskytnutá, vrátane diagnostických a liečebných postupov,
- o povahe navrhovaného výkonu, dôvodoch pre jeho vykonanie, ako aj o iných dostupných možnostiach jeho realizácie,
- o rizikách spojených s realizovaním výkonu, ako aj o riziku pre moje zdravie, ak navrhovaný výkon odmietnem,
- o tom ako mám postupovať po výkone a o ďalšom liečebnom režime,
- (v prípade ak je s výkonom spojené podanie lieku, či používanie lieku v domácom prostredí pacienta) o obsahu príbalového letáku lieku a o možných nežiadúcich účinkoch a podmienkach pre podanie/užívanie lieku,
- (v prípade ak je s výkonom spojené použitie zdravotníckej pomôcky) o spôsobe fungovania zdravotníckej pomôcky a možných rizikách spojených s jej použitím.

Svojím podpisom vyhlasujem, že:

- dokážem čítať a písať,
- ošetrojúci lekár mi okrem poučenia pred výkonom dal možnosť sa s poučením o výkone oboznámiť vopred v dostatočnom predstihu a to tak, že som mal možnosť si prečítať poučenie na webe ambulancie a tiež v tlačenej forme v čakárni ambulancie,
- pred výkonom som mal možnosť vysvetliť svoj zdravotný problém a mal som možnosť klásť doplňujúce otázky a na všetky mi bolo zrozumiteľne odpovedané,
- v danej veci nemám žiadne ďalšie otázky a bol mi poskytnutý dostatočný čas na rozhodnutie či výkon podstúpim,
- som nezatajil/a žiadne ochorenie, ktoré má súvis s výkonom, pre ktoré som sa v minulosti liečil/a, prípadne, ktoré mi bolo v minulosti diagnostikované. Beriem na vedomie, že zatajenie údajov o mojom zdravotnom stave môže mať priame alebo nepriame dôsledky na zvýšenie rizika spojeného s výkonom. Mojou anamnézou (súbor informácií o mojom zdravotnom stave), z ktorej lekár pred výkonom vychádza, sa považuje rozsah informácií v písomnej zdravotnej dokumentácii v ambulancii v čase podpisu tohto dokumentu,
- som rozumel otázkam, ktoré mi lekár pred výkonom položil,
- užívam len tieto lieky/výživové doplnky a bol som v posledných 6 mesiacoch očkovaný touto vakcínou (doplňte; pokiaľ ostane prázdne má sa za to, že pacient neoznámil lekárovi, že užíva nejaké lieky, alebo že bol očkovaný) ³:
- netrpím žiadnymi alergiami okrem týchto (doplňte; pokiaľ ostane prázdne má sa za to, že pacient neoznámil lekárovi, že trpí alergiami) ⁴:

- bol som poučený, že v prípade nezlepšenia môjho zdravotného stavu, alebo pri prejavení sa rizík spojených s výkonom mám bezodkladne kontaktovať ambulanciu,
- som oboznámený so všeobecnými zmluvnými podmienkami ambulancie, pravidlami spracovania mojich osobných údajov a právami s tým spojenými a všetkým týmto informáciám rozumiem, som poučený o cenníku poskytovateľa v prípade ak je s výkonom spojená aj platba z mojej strany, tak s touto platbou súhlasím,
- súčasťou formuláru poučenia a informovaného rozhodnutia je aj podpisový list týkajúci sa mojich budúcich rozhodnutí vo vzťahu k prípadnej budúcej potrebe opätovnej realizácie výkonu.

2) V PRÍPADE VÝKONU U NESPOSOBILÉHO PACIENTA

Vyhlásenie nespôsobilého pacienta: Týmto potvrdzujem, že mi poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sohľadom na môj vek a rozumovú vyspelosť vysvetlil všetky podstatné otázky týkajúce sa výkonu a vyjadrujem s ním:

(správne zakrúžkovať a nesprávne preškrtnúť) ⁵

- ☒ súhlas
- ☐ nesúhlas

Vyhlásenie zákonného zástupcu: Týmto vyhlasujem, že som zákonným zástupcom nespôsobilého pacienta a že neexistuje žiadna právna prekážka ktorej, aby som za nespôsobilého pacienta udelil informovaný súhlas k výkonu. Vyhlasujem, že som bol pred udelením súhlasu poučený.

3) ROZHODNUTIE PACIENTA

Ja, pacient (správne zakrúžkovať a nesprávne preškrtnúť) ⁶

- ☒ Udeľujem informovaný súhlas

- ☐ Neudeľujem súhlas (s vedomím všetkých rizík uvedených v poučení)

ambulancii na realizovanie výkonu. V prípade udelenia súhlasu tento pokrýva aj všetky ďalšie nevyhnutné postupy/čiastkové zákroky, pokiaľ si ich vyžiada situácia počas realizovania výkonu a pokiaľ budú nevyhnutné pre zamedzenie vzniku škody na mojom zdraví.

Dátum (poučenia a rozhodnutia pacienta) ⁷:

Miesto podpisu: miesto prevádzky ambulancie

Podpis pacienta/zákonného zástupcu (potvrdzujem rozhodnutie vyznačené vyššie) ⁸

.....

Poučenie pred udelením súhlasu poskytol ⁹:

SLUŠNÁ AMBULANCIA, s. r. o.
Špitálska 13, 949 01 Nitra..
IČO: 45 633 410 DIČ: 2023077738
Pečiatka poskytovateľa a podpis ošetrojúceho lekára
Tel. č.: +421 37 694 225

Pozn.: Kompletne písomné poučenie a toto informované rozhodnutie pacienta s výkonom bude založené do zdravotnej dokumentácie pacienta. V prípade ďalšej realizácie tohto istého výkonu, bude informované rozhodnutie pacienta s výkonom zaznamenané v Podpisovom liste pre zaznamenanie realizovania poučenia o výkone a o rozhodnutí pacienta, či výkon podstúpi, ktorý bude tiež založený v zdravotnej dokumentácii pacienta.