



BASIC-COMPONENTS

zur Anwendung auf Coco mit Osmose-Wasser

Keimung (Woche 0–1)

ALL ESSENTIALS: 0,30 g/L

(vorwiegend Biostimulation, kaum EC)

EC 0,1–0,2 | pH 5,8

Jungpflanze (Woche 1–2)

ALL ESSENTIALS: 0,50 g/L

GROWTH: 0,50 g/L

EC 0,6–0,8 | pH 5,8–5,9

Wachstum (frühestens Woche 3–5)

ALL ESSENTIALS: 1,00 g/L

GROWTH: 1,1 g/L

EC 1,2–1,5 | pH 5,8–6,0

Vorblüte (frühestens Wochen 6–7)

ALL ESSENTIALS: 1,00 g/L

GROWTH: 0,8 g/L

BLOOM: 0,35 g/L

EC 1,5–1,6 | pH 5,9–6,0

Hauptblüte (frühestens Woche 8–10)

ALL ESSENTIALS: 1,00 g/L

GROWTH: 0,4 g/L

BLOOM: 1,1 g/L

EC 1,7–1,9 | pH 6,0–6,1

Spätblüte (frühestens Woche 11–12)

ALL ESSENTIALS: 0,50 g/L

GROWTH: 0,10 g/L

BLOOM: 1,0 g/L

EC 1,3–1,5 | pH 6,0–6,2

Spülung (7–10 Tage)

Nur Wasser pH 5,8–6,0 (leichter Drain)

Coco-Besonderheiten:

- Coco bindet Ca & Mg → im Gegensatz zu Hydro muss hier ständig Ca/Mg ergänzt werden (empfohlen: 80–120 mg/L Ca, 30–50 mg/L Mg). Ideal z. B. Ca-BOOST + P&T.
- pH-Bereich leicht breiter toleriert: 5,8–6,2.
- Regelmäßiger Drain nötig (20–30 %), um Na/Cl-Anreicherung auszuspülen.
- Jungpflanzen: Substrat vorab mit leichter Ca/Mg-Lösung „vorladen“, um Kationenfallen zu verhindern.