

## Einnahme Ihrer Medikamente nach dem Eingriff

MEDIKAMENT		MENGE/WANN	WAS IST DAS?	ERGÄNZUNGEN
CLINDASAAR 600 CLINDAMYCIN 600		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 3 x täglich je 1 Kapsel morgens, mittags, abends</li> <li>&gt; 7 Tage lang   _____</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Antibiotikum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; mindestens 2-3 Liter Wasser am Tag trinken</li> <li>&gt; bei Juckreiz oder schwerer Übelkeit in der Praxis melden</li> </ul>
CLINDASAAR 600 CLINDAMYCIN 600 [Kinder]		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 2 x täglich je 1 Kapsel morgens, abends</li> <li>&gt; 7 Tage lang   _____</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Antibiotikum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; mindestens 2-3 Liter Wasser am Tag trinken</li> <li>&gt; bei Juckreiz oder schwerer Übelkeit in der Praxis melden</li> </ul>
CLINDASAAR 600 CLINDAMYCIN 600		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 1 Kapsel 1 Stunde vor dem geplanten Eingriff einnehmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Antibiotikum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; mindestens 2-3 Liter Wasser am Tag trinken</li> <li>&gt; zur ENDOKARDITIS Prophylaxe</li> </ul>
AMOXICILLIN 500		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 3 x täglich je 1 Kapsel morgens, mittags, abends</li> <li>&gt; 7 Tage lang   _____</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Antibiotikum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; mindestens 2-3 Liter Wasser am Tag trinken</li> <li>&gt; bei Juckreiz oder schwerer Übelkeit in der Praxis melden</li> </ul>
AMOXICILLIN 1000		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 2 Kapseln 1 Stunde vor dem geplanten Eingriff einnehmen</li> <li>&gt; zur ENDOKARDITIS Prophylaxe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Antibiotikum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; mindestens 2-3 Liter Wasser am Tag trinken</li> </ul>
PERENTEROL Forte		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 2 x täglich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Arznei - Hefe pflanzlich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; zur Unterstützung des Magen-Darm-Traktes bei der Antibiotika-Therapie</li> </ul>
PANTOPRAZOL 40		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 1 x täglich 1/2 h vor Antibiotikum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Kombinationstherapie mit anderen Medikamenten</li> <li>&gt; Hemmt die Ausschüttung von Magensäure</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; zur Unterstützung des Magen-Darm-Traktes bei der Antibiotika-Therapie</li> </ul>
IBUPROFEN 600 / 800		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 3 x täglich je 1 Tablette morgens, mittags, abends</li> <li>&gt; 2 Tage lang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Entzündungshemmer</li> <li>&gt; Schmerzmittel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; auf jeden Fall bitte einnehmen, auch wenn keine Schmerzen vorhanden sind, wegen der entzündungshemmenden Wirkung</li> </ul>
PARACETAMOL		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 3 x täglich je 1 Tablette morgens, mittags, abends</li> <li>&gt; 2 Tage lang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Schmerzmittel</li> <li>&gt; Fiebersenker</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; maximal 4000 mg pro Tag</li> </ul>
DEXAMETHASON		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 2 Tabletten</li> <li>1 am OP-Tag</li> <li>1 am nächsten Tag</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Glucocorticoid</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; mindestens 2-3 Liter Wasser am Tag trinken</li> <li>&gt; bei Juckreiz oder schwerer Übelkeit in der Praxis melden</li> </ul>
CHX Mundspülung		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 3 x täglich ca. 30 Sekunden spülen</li> <li>&gt; 5 Tage lang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Antibakterielle</li> <li>&gt; Mundspülung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; maximale Anwendung 3 Wochen</li> <li>&gt; wirkt auch gegen GUTE Mundbakterien</li> </ul>
Nasentropfen/-spray		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 2 Wochen nach Bedarf</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Rhinologika</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; nach Sinuslift nicht schnäuzen</li> <li>&gt; Nasentropfen benutzen und rauslaufen lassen</li> </ul>
Nurofen Saft [Kinder]		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; nach Gewicht</li> <li>&gt; Apotheker fragen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Schmerzmittel</li> <li>&gt; Entzündungshemmer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Maximaldosis pro Tag beachten</li> </ul>
Lutschtabletten [Jugendliche]		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; nach Gewicht</li> <li>&gt; Apotheker fragen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Schmerzmittel</li> <li>&gt; Entzündungshemmer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Maximaldosis pro Tag beachten</li> </ul>