

PREPARACIÓN DE ESTUDIOS RADIOLÓGICOS – ENDOSCÓPICOS Y CIRUGÍA DE COLON CON LUMENCOL 2F

Estudios a realizar por la mañana

La realización del estudio está sujeta a una adecuada preparación. Por favor siga estrictamente los siguientes pasos. Es **importante** para un estudio completo una **correcta preparación**.

Para este estudio usted deberá comprar 1 envase de LUMENCOL 2F. Prepare el LUMENCOL 2F de acuerdo con las instrucciones del envase original y colóquelo en la heladera. Para mejorar el gusto de la preparación, puede agregar 1 sobre de jugo dietético a cada litro de solución LUMENCOL 2F obtenida.

Día previo al examen



Evitar frutas, verduras y lácteos. Puede tomar líquidos claros no gasificados (agua mineral, caldos colados, mate, café o té).



12 hs. Almuerzo: carnes rojas o blancas condimentadas. Gelatina de frutas. Está es la última comida sólida previa al examen.



14 hs. Tomar 4 comprimidos de Bisacodilo con un vaso de agua sin masticarlos, puede tomar líquidos claros no gasificados (agua mineral, caldos colados, mate, café o té).



19 hs. Comenzar a tomar **LUMENCOL 2F**. Debe tomarlo a razón de ¼ litro cada 15 minutos, hasta finalizar el contenido del envase.

Día del examen



Puede ingerir líquidos hasta 6 hs. antes del examen.



Concurrir acompañado



Ayuno de 8 horas.



No manejar el día del estudio.



La **temperatura** en la sala puede resultar baja. Puede acudir con una **remera manga corta**, teniendo en cuenta que esta puede ensuciarse durante el estudio.



Debe concurrir **sin ningún metal, ni joyas**. Uñas **sin pintura**.

Deberá traer el día del estudio:



- Orden con el pedido médico, con autorización.
- Credencial de su cobertura médica y DNI.
- Estudios anteriores.
- Consentimiento.



ADVERTENCIA

Para esta preparación debe tenerse en cuenta que, si usted padece de diabetes, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, está embarazada o cree estarlo, debe consultar previamente con su médico.

Medicación habitual



- **NO** suspender la medicación antihipertensiva.
- Si toma anticoagulantes (como acenocumarol, warfarina, rivaroxabán, dabigatrán u otro) o antiagregantes plaquetarios (como aspirina, clopidogrel, ticagrelor u otro), debe traer por escrito la indicación de su médico clínico, cardiólogo o hematólogo, donde conste:
 - Si debe suspender la medicación.
 - Cuando suspenderla.
 - Cuando reiniciarla.
- Si utiliza análogos de GLP-1 como Ozempic o Saxenda u otro, consulte previamente con su médico tratante para definir cuándo suspender la medicación antes del estudio.



Si presenta náuseas o vómitos durante la preparación.

- Suspenda la toma de la preparación durante 30 a 60 minutos y luego reiníciela lentamente.
- Puede tomar Reliverán:
 - 20 gotas en un vaso de agua, o, un comprimido sublingual.

Se recomienda tomar la preparación **bien fría** para mejorar la tolerancia.