

Lattante (0 - 12 mesi)

DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE



- A cavalcioni sul braccio non dominante
- Bloccare la mandibola



- Bloccare la gamba sotto l'ascella
- Appoggiarsi sul ginocchio



- Praticare 5 colpi decisi in mezzo alle scapole



- Bloccare la testa
- Capovolgere il bambino a cavalcioni sull'altro braccio



- Bloccare la gamba sotto l'ascella
- Appoggiarsi sul ginocchio



- Praticare 5 compressioni toraciche sullo sterno con indice e medio della mano non dominante

Ripetere la sequenza di 5 colpi interscapolari e 5 compressioni toraciche

Se il bambino perde i sensi = ARRESTO CARDIACO

- Allertare il 112 comunicando che c'è un bambino in "arresto cardiaco"
- Iniziare immediatamente RCP

RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE



- Sdraiare il bambino a terra orizzontalmente
- Rimuovere vestiti se spessi (es. giacche)



- Praticare 30 compressioni toraciche (1 al secondo) sullo sterno (tra i capezzoli) con indice e medio della mano dominante



- Aderire con la bocca sia al naso che alla bocca del bambino
- Praticare 2 ventilazioni (1 al secondo)

Ripetere la sequenza di 30 compressioni toraciche e 2 ventilazioni fino all'arrivo dei soccorsi

Bambino (12 mesi - Pubertà)

DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE



- Posizionarsi dietro alla vittima adattandosi alla sua altezza
- Porre la testa lateralmente
- Se in piedi posizionare una gamba tra le sue
- Afferrare la mandibola tra pollice e indice con la mani a "C"



- Chinare il bambino ponendo il suo addome sulla coscia
- Praticare 5 colpi decisi in mezzo alle scapole
- Praticare 5 compressioni addominali con movimenti "a cucchiaio" (entrando e salendo)



- Posizionare la mano non dominante a pugno con il pollice dentro sotto la bocca dello stomaco
- Avvolgerla con la mano dominante

Ripetere la sequenza di 5 colpi interscapolari e 5 compressioni toraciche

Se il bambino perde i sensi = ARRESTO CARDIACO

- Allertare il 112 comunicando che c'è un bambino / adulto in "arresto cardiaco"
- Iniziare immediatamente RCP

RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE

- Sdraiare il bambino a terra orizzontalmente
- Rimuovere vestiti se spessi (es. giacche)
- Posizionare la mano non dominante sullo sterno e afferrarla con la dominante
- Mantenere le ginocchia aperte
- Porre le spalle perpendicolarmente ai polsi
- Tenere i gomiti rigidi senza mai piegarli


PORTALE DELLA GRAVIDANZA



- Praticare 30 forti compressioni toraciche (1 al secondo)



- Inclinare leggermente la testa
- Tappare il naso



- Praticare 2 ventilazioni sulla bocca (1 al secondo)

Ripetere la sequenza di 30 compressioni toraciche e 2 ventilazioni fino all'arrivo dei soccorsi