



PROTEKTA

Biopect

- Efficace en cas de troubles digestifs
- Ajout de fibres végétales pour stabiliser la digestion
- Teneur élevée en électrolytes
- Fournit de l'énergie hautement digestible
- Rétablit le microbiote intestinal
- Peut être utilisé dans le lait



Biopect est un complément alimentaire régénératif utilisé pour stabiliser l'équilibre des fluides et des électrolytes chez les veaux souffrant de troubles digestifs.

biopect®



PROTEKTA

Biopect est composé de fibres végétales spécialement traitées, d'énergie hautement digestible et contient une teneur élevée en électrolytes. C'est un produit finement granulé, sans poussière, et avec une solubilité élevée. Il peut être incorporé au lait sans risque de séparation.

Administration:

Biopect est utilisé pendant les épisodes de troubles digestifs, qu'ils soient d'origine bactérienne, virale, ou alimentaire. Il peut aussi être utilisé de façon préventive chez les animaux à risque dû à un changement de diète, un déplacement, une situation stressante, ou l'usage d'antibiotiques. Lorsqu'il est utilisé comme supplément lors d'un traitement antibiotique, il réduit l'impact négatif de l'antibiotique sur le microbiote intestinal et favorise une restauration rapide du microbiote intestinal.



En cas de troubles digestifs

Composé	%
Protéine crue	3,5
Gras brut	1,0
Fibre brute	8,0
Cendre brute	19,0
Sodium	5,9
Potassium	1,6
Chlore	5,3

SID, mmol/l, eau/lait	64/70
Osmolalité, mOsm/L Dissous dans l'eau.	368
Osmolalité, mOsm/L Dissous dans le lait.	466

Dosage

50 g de Biopect incorporé dans 2 L de lait tiède/ lactoreplaceur (approx. 40 °C).

Cas légers : Deux fois par jour pour 3 à 5 jours.

Cas sévères : Pendant les 24 premières heures de traitement, la dose peut être répétée jusqu'à 4 fois, dépendamment de la gravité des symptômes. Pour les jours suivants, faire le traitement de la même façon que pour les cas légers.

Eau : Lorsqu'utilisé dans l'eau, la dose est doublée : 100 g incorporé dans 2 L d'eau tiède pour les deux premiers traitements. Par la suite, administrer 50 g par dose.

Tasse à mesurer de 50 g incluse. Les doses indiquées s'appliquent pour un veau d'environ 50 kg.

Bénéfices d'éviter les troubles digestifs

- Meilleure santé
- Meilleur taux de survie
- Croissance plus élevée
- Meilleures performances en première lactation
- Plus de temps pour les soins aux animaux
- Diminution des coûts de traitement
- Plus grande satisfaction au travail