




Orale intake checklist

Geen sprake van:

TPV gebruik
Een malabsorptie syndroom
Ernstige gastroparese/ileus
Maaghevel (met continue suctie)

Contra-indicaties

Centrale zenuwstelsel infectie (meningitis)
Candidemie
S. aureus bacteriëmie
Intravasculaire infectie (endocarditis)
Osteomyelitis of septische artritis
Geïnfecteerde gewrichtsprotheses
Hoog-risico neutropenie
Mediastinitis
Fascites necroticans
Ongedraineerde abcessen of -empyemen

Telefoonnummers

Voorbeelden van orale alternatieven staan op de achterkant van dit kaartje.

Neem bij twijfel hierover laagdrempelig contact op met de consulent infectieziekten

(*6808)

òf met de arts-microbioloog

(*6645, *6014 of 6304 afhankelijk van de afd.)

Overzicht van middelen die zowel oraal als intraveneus kunnen worden gebruikt.

	I.V.	Oraal
amoxicilline	4 dd 1000 mg	3 dd 750 mg
amoxicilline-clavulaanzuur	4 dd 1200 mg	3 dd 625 mg
ciprofloxacin	2 dd 400 mg	2 dd 500 mg
	3 dd 400 mg*	2 dd 750 mg*
clindamycine	3 dd 600 mg	3 dd 600 mg
cotrimoxazol	2-3 dd 960-1920 mg	2-3 dd 960-1920 mg
doxycycline	1 dd 100-200 mg	1-2 dd 100-200 mg
flucloxacilline	4 dd 1000 mg	4 dd 500-1000 mg
fluconazol	1 dd 200-400 mg	1 dd 200-400 mg
fusidinezuur	3 dd 500 mg	3 dd 500 mg
metronidazol	3 dd 500 mg	3 dd 500 mg
rifampicine	1 dd 600 mg	1 dd 600 mg
voriconazol	2dd 4 mg/kg	2dd 4 mg/kg

* voor sommige indicaties, m.n. Pseudomonas infecties, wordt hoger gedoseerd

Omzetting van middelen, van intraveneuze naar orale therapie

Parenteraal middel	Dosering	Oraal middel	Dosering
aciclovir	3 dd 5-10 mg/kg	valaciclovir	3 dd 500-1000 mg
benzylpenicilline	4-6 dd 1 ME	feneticilline	4 dd 500 mg
ceftriaxon	1 dd 2000 mg	amoxicilline-clavulaanzuur*	3 dd 625 mg
ceftazidim	3-4 dd 1000 mg	ciprofloxacin*	2 dd 750 mg
erythromycine	4 dd 500 mg	claritromycine	2 dd 500 mg

* indien gevoelig getest