

SOP: Sürekli Kullanılan İlaçlarda Yapılan Değişikliklerin Sipariş ve Değişiklik Portalına Kaydedilmesi


Amaç

Bu SOP, **sürekli kullanılan ilaçlarda (Dauermedikation)** yapılan değişikliklerin **Sipariş ve Değişiklik Portalı** üzerinden doğru şekilde kaydedilmesini, belgelenmesini ve **Blisterzentrum**'a iletilmesini açıklar.

Amaç; ilaç değişikliklerinin **hızlı, izlenebilir ve kalite yönetimine (QM) uygun** şekilde işlenmesini sağlamaktır.


Önemli Adımlar

1. Portala giriş yapın ve hastayı açın (0:12)




- **bestellung.blisterzentrum.de** adresi üzerinden portala giriş yapın.
- Hasta yönetimi bölümünden ilgili hastayı açın.
- Herhangi bir değişiklik yapmadan önce doğru hasta dosyasını açtığınızdan emin olun.

2. Değişikliği öncelikle eczaneye mesaj olarak belgeleyin (0:27)



- Değişikliğe başlamadan önce "**Nachricht an Apotheke**" (**Eczaneye Mesaj**) butonunu kullanarak hastaya özel bir mesaj gönderin.
- Konu (Betreff) olarak "**Änderung**" (**Değişiklik**) yazın.
- Değişikliği isteyen (tedaviyi düzenleyen) doktorun adını girin.
- İlaç değişikliğini düzenlemeden önce bu belgelendirmenin eksiksiz olduğundan emin olun.

3. İlaç değişikliği ekranını açın (0:40)



- Tekil ilaç değişikliği bölümüne geçin.
- "**Medikationsaktionen**" menüsünü seçin ve ardından "**Medikation ändern**" seçeneğine tıklayın.
- Buradan gerekli ilaç değişikliğini düzenlemeye başlayın.

4. Dozu değiştirin, silin veya ekleyin (1:00)

[illegible]


- Bir **doz zamanını** silmek için "**Löschen**" (**Sil**) sekmesini etkinleştirin ve ilgili dozu kaldırın.
- Yeni bir doz zamanı eklemek için yeni uygulamayı doğrudan girin; örneğin:
- **Saat 18:00 – 2 tablet**
- Her değişiklikten sonra yeni dozun tıbbi açıdan doğru ve eksiksiz olduğundan emin olun.

5. Tekrarlayan uygulamaları ve ilaçsız günleri tanımlayın (1:20)

[illegible]


- Gerekirse belirli **ilaçsız günleri (Pausentage)** belirleyin.
- İlacın uygulanacağı **hafta günlerini** tanımlayın.
- Aylık tekrar eden tarihleri girin (örneğin **her ayın 6. günü**).
- Gerekirse **periyodik aralıklar** kullanın (örneğin **iki günde bir** veya **üç günde bir**).
- Gerektiğinde ilaçsız günleri diğer ilaçlarla uyumlu olacak şekilde planlayın; örneğin belirli bir ilacın haftanın belirli bir gününde verilmemesi gerekiyorsa.

6. Karmaşık ilaç tedavileri için uygun saatleri ve ayarları kullanın (1:49)




- Sistemde toplam **üç farklı kurulum (Setup)** ve **serbest tanımlanabilir uygulama saatleri** bulunduğunu unutmayın.
- Bu özellikleri özellikle **Parkinson tedavisi** veya gün içinde farklı saatlerde verilmesi gereken ilaçlar gibi karmaşık tedavi planlarında kullanın.
- Tüm uygulama saatlerini eksiksiz girin, böylece ilaçlar **Schlauchblister** içerisinde doğru şekilde hazırlanabilir.

7. Değişikliği gönderin ve Blisterzentrum'a iletin (2:21)



- Göndermeden önce tüm bilgileri dikkatlice kontrol edin.
- Ardından "**Absenden**" (**Gönder**) düğmesine tıklayın.
- Değişiklik otomatik olarak **Blisterzentrum**'a iletilir.
- Değişikliğin sistemde **başvuru yapıldı (beantragt)** olarak görüldüğünü kontrol edin.

8. Yeni dozun onayını ve görüntülenmesini kontrol edin (2:36)



- Değişiklik gönderildikten sonra, **Blisterzentrum** onay verene kadar mevcut (eski) doz görüntülenmeye devam eder.
- Yeni doz "**Neu**" (**Yeni**) ibaresiyle ve **sarı renkle vurgulanmış** olarak gösterilir.
- Onay verildikten ve tarayıcı yenilendikten (**Browser-Refresh**) sonra eski doz artık görüntülenmez.
- Güncel **başlangıç tarihini**, yeni uygulama saatlerini ve tablet sayısını dikkatlice kontrol edin.

Dikkat!

- **Önemli:** İlaç değişikliklerini yapmadan önce mutlaka "**Nachricht an Apotheke**" (**Eczaneye Mesaj**) üzerinden hastaya özel bir mesaj göndererek değişikliği belgeleyin.
- Değişikliği göndermeden önce her zaman **doğru hastanın** açık olduğundan emin olun.
- **Doktor, başlangıç tarihi, uygulama saati ve tablet miktarının** doğru girildiğini kontrol edin.
- Eski doz, **Blisterzentrum** değişikliği onaylayana kadar görünmeye devam eder.
- Onaydan sonra güncel dozun doğru görüntülenmesi için **tarayıcıyı yenileyin**.

Daha Verimli Çalışmak İçin İpuçları

- Değişikliği girmeden önce **ilacı düzenleyen doktorun bilgilerini** hazır bulundurun.
- Karmaşık ilaç tedavi planlarını daha hızlı oluşturmak için mevcut **Setup** seçeneklerini ve **serbest tanımlanabilir uygulama saatlerini** kullanın.
- Değişiklikleri mümkün olduğunca **tek seferde eksiksiz** girin. Böylece ek soruların ve düzeltmelerin önüne geçebilirsiniz.
- Gönderdikten sonra, değişikliğin başarıyla iletildiğini doğrulamak için **durum göstergesini (Statusanzeige)** kontrol edin.
- Tekrarlayan tedavi planlarında **ilaçsız günler (Pausentage)**, **hafta günleri** ve **periyodik aralıklar** gibi özelliklerden yararlanarak veri girişini önemli ölçüde kolaylaştırabilirsiniz.

<https://loom.com/share/00c26b4b71864e9fbdeb7d1127cb7b1a>