3. Sådan skal du tage Wegovy

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken.

Så meget skal du tage
Din behandling vil starte med en lav dosis, som gradvist øges over 12 ugers behandling.
- Startdosis er én 1,5 mg tablet én gang dagligt i 4 uger.
- Lægen vil instruere dig i trinvist at øge din dosis hver fjerde uge, indtil du når den anbefalede dosis på 25 mg én gang dagligt. Hvis det er nødvendigt, kan dosis opretholdes på det forrige dosisniveau.
- Når du når den anbefalede dosis på 25 mg, må dosis ikke øges yderligere.

Du vil som regel få besked på at følge nedenstående tabel:

Dosisoptrapning	Daglig dosis
Uge 1-4	1,5 mg
Uge 5-8	4 mg
Uge 9-12	9 mg
Fra uge 13	25 mg

Din læge vil jævnligt vurdere din behandling. Du må ikke tage to tabletter for at få effekten af en højere dosis.

Sådan tages dette lægemiddel
- Tag din Wegovy tablet på tom mave efter en anbefalet fasteperiode på mindst 8 timer.
- Synk din Wegovy tablet hel sammen med lidt vand (op til 120 ml). Tabletten må ikke deles, knuses eller tygges, da det ikke vides, om det påvirker optagelsen af semaglutid.
- Når du har taget din Wegovy tablet, skal du vente i mindst 30 minutter, inden du spiser, drikker eller indtager andre orale lægemidler. Hvis du venter mindre end 30 minutter, mindskes optagelsen af semaglutid.

Personer med type 2-diabetes
Fortæl det til lægen, hvis du har type 2-diabetes. Din læge kan justere dosis af dine diabeteslægemidler for at undgå, at du får lavt blodsukker.

Hvis du har taget for meget Wegovy
Tal straks med din læge. Du kan få bivirkninger såsom kvalme.

Hvis du har glemt at tage Wegovy
Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du springe den glemte dosis over og bare tage din normale dosis næste dag.

Hvis du holder op med at tage Wegovy
Du må ikke holde op med at tage dette lægemiddel uden først at have talt med lægen om det. Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om.