3. Hur du tar Wegovy

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Hur mycket du ska ta
Din behandling börjar med en låg dos som gradvis ökas under 12 veckors behandling.
- Startdosen är en 1,5 mg tablett en gång dagligen i fyra veckor.
- Din läkare kommer att instruera dig att gradvis öka din dos var fjärde vecka tills du når den rekommenderade dosen på 25 mg en gång dagligen. Vid behov kan dosen bibehållas på den tidigare dosnivån.
- När du har nått den rekommenderade dosen på 25 mg ska du inte öka dosen ytterligare.

Vanligtvis kommer du bli tillsagd att följa enligt nedan:

Dosupptrappning	Daglig dos
Vecka 1–4	1,5 mg
Vecka 5–8	4 mg
Vecka 9–12	9 mg
Från vecka 13	25 mg

Din läkare kommer att bedöma din behandling regelbundet. Du ska inte ta två tabletter för att få effekten av en högre dos.

Ta detta läkemedel
- Ta din tablett Wegovy på tom mage efter en rekommenderad fasteperiod på minst 8 timmar.
- Svälj din tablett Wegovy hel med lite vatten (upp till 120 ml). Dela, krossa eller tugga inte tabletten eftersom det inte är känt om det påverkar upptaget av semaglutid.
- När du har tagit din tablett Wegovy ska du vänta minst 30 minuter innan du äter, dricker eller tar andra läkemedel via munnen. Kortare väntetid än 30 minuter minskar upptaget av semaglutid.

Personer med typ 2-diabetes
Berätta för din läkare om du har typ 2-diabetes. Din läkare kan justera dosen av dina diabetesläkemedel för att förhindra att du får lågt blodsocker.

Om du har tagit för stor mängd av Wegovy
Kontakta läkare omedelbart. Du kan få biverkningar såsom illamående.

Om du har glömt att ta Wegovy
Om du har glömt att ta en dos ska du hoppa över den missade dosen och bara ta din normala dos nästa dag.

Om du slutar att ta Wegovy
Sluta inte att använda detta läkemedel utan att först tala med din läkare. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.