

# BLÜTEGEL- THERAPIE

## SEHR GEEHRTE PATIENTIN, SEHR GEEHRTER PATIENT:

**Sie haben sich entschieden, eine Blutegelbehandlung durchführen zu lassen. Bei einer solchen Behandlung kann es gelegentlich zu folgenden Nebenwirkungen kommen, welche meist harmlos und vorübergehend sind:**

### **häufige Nebenwirkungen:**

- leichter Schmerz (Brennen, Juckreiz) während der Behandlung
- (gewollte) Blutung mit verlängerter Nachblutung
- juckende Bissstelle
- Rötung mit Schwellung um die Bissstelle
- Hämatom (Bluterguss) um die Bissstelle

### **seltene Nebenwirkungen:**

- lokale allergische Reaktion, Anschwellen des behandelten Areals
- Wundinfektion der Bissstelle
- Wundheilungsstörung
- vorübergehende Lymphknotenschwellung
- Narbenbildung an der Bissstelle, Pigmentstörungen

### **sehr selten:**

- systemische allergische Reaktion

Sollten Nebenwirkungen auftreten, die eine Intervention erfordern (z.B. Infektion – Antibiotika Gabe, Allergien – Antihistaminika), bitte ich um direkte Rückmeldung unter: 077 412 53 68 oder Wiedervorstellung in der Praxis.



## **IRESONA - DOG THERAPY**

Iris Köhler

Bösingenfeldstrasse 20 | 3178 Bösingen

+ 77 412 53 68

info@iresona.ch

**iresona.ch**

# PATIENTENINFORMATION & EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG ZUR BLUTEGELTHERAPIE

Sollte die Blutung nicht stillbar sein oder es zu schweren Komplikationen kommen und Sie mich nicht persönlich erreichen, ist eine notfallmässige Vorstellung im Krankenhaus erforderlich.

## **In folgenden Fällen darf keine Blutegelbehandlung durchgeführt werden (Kontraindikationen):**

- Blutgerinnungsstörungen (angeboren oder durch Medikamente)
- Einnahme gerinnungshemmenden und blutverdünnenden Medikamenten wie:
- Antikoagulans wie Xarelto®, Marcoumar®, Lixiana® etc.
- Aspirin
- hämatologische Erkrankungen, Störungen der Blutbildung (z.B. Hämophilie)
- akute erosive Gastritis oder Magengeschwüre
- ausgeprägte Anämien
- Störungen des Immunsystems (Immunsuppression, Chemotherapie, AIDS)
- bekannte Allergie gegen Inhaltsstoffe des Blutegelspeichels
- Neigung zu überschüssiger Narbenbildung (Keloidbildung)
- Schwangerschaft und Stillzeit

## **Nachbehandlung:**

- Am Behandlungstag sowie am darauffolgenden Tag wird Ruhe empfohlen (kein Sport). Je nach Stärke der Blutung sogar für 48h.

## **Wundversorgung:**

- Die Nachblutung nicht unterbrechen, da es eine Reinigung der Wunde bewirkt und Teil der Therapie ist.
- Ist die Blutung nach 12h immer noch stark, kann ein leichter Kompressionsverband angelegt werden
- Ist die Blutung nach 24 unverändert, muss ein Kompressionsverband angelegt werden
- Bleibt die Blutung nach 48h weiter bestehen, muss ein Arzt aufgesucht werden

## **Einverständniserklärung:**

- Ich habe die Patienteninformation über die Blutegeltherapie gelesen und verstanden
- über mögliche Nebenwirkungen wurde ich von der Hundetherapeutin und Pflegefachfrau Iris Köhler aufgeklärt
- Bei mir sind keine der oben genannten Kontraindikationen bekannt

Ort/Datum .....

Unterschrift .....

