

Modificētā Rankina skala
(*Modified Rankin Scale (mRS), Stroke, 1988*)

Raksturojums	Pakāpe	Datums		
Nav simptomu	0			
Nav nozīmīgas nespējas. Pats spēj izpildīt visus ikdienas pienākumus un darbības	1			
Viegla nespēja, nevar izpildīt dažas darbības, bet spēj veikt ikdienas pienākumus bez citu palīdzības	2			
Mērena nespēja, nepieciešama neliela palīdzība ikdienas darbību veikšanai, bet spēj staigāt bez citu palīdzības	3			
Vidēji smaga nespēja, nespēj staigāt un veikt ikdienas darbības, sevi apkopt bez palīga	4			
Smaga nespēja, gulošs, nepieciešama pastāvīga kopšana un uzraudzība	5			
Pacienta nāve	6			

Modificētā Rankina skala

(Modified Rankin Scale (mRS), Stroke, 1988)

Mērījuma mērķis

Modificētā Rankina skala ir viena jautājuma, rezultātu novērtēšanas skala pacientiem pēc insulta. Tā ir izmantota, lai iedalītu kategorijās funkcionālās neatkarības līmeņus ar atsaukšanos uz aktivitātēm pirms saslimšanas ar insultu drīzāk, nekā uz specifiskas aktivitātes veikšanas novērošanu.

Procedūra

Tests aizņem aptuveni 5-15 minūtes.

Vispārpieņemta metode Modificētās Rankina skalas administrēšanai ir vadīta intervija. Novērtējums tiek veikts, jautājot pacientam par viņa ikdienas aktivitātēm, iekļaujot ārpustelpu aktivitātes. Vajadzētu iegūt informāciju par pacienta neiroloģiskajiem deficītiem, iekļaujot afāziju un intelektuālos traucējumus. Visus pacienta fiziskās un mentālās veikšanas aspektus un runu vajadzētu iekļaut vienā no Modificētās Rankina skalas kategorijām.

Literatūra:

http://strokengine.ca/assess/module_mrs_intro-en.html, apskatīts 12.12.2012.