

POLISTES DOMINULA

nome comune: vespa cartonaia
nome inglese: paper wasp



dimensioni reali
da 12 a 17 mm max

Il *Polistes dominula* è un insetto presente in tutta Europa ed in particolare nelle aree Mediterranee. Il Poliste ha un corpo di lunghezza tra 1,2 e 1,7 centimetri, di colore giallo e nero, dalla caratteristica forma slanciata a "vitino di vespa". Nidifica di preferenza in luoghi molto assolati e caldi (intercapedini sotto le tegole dei tetti, box in metallo o di materiale plastico, serre, luoghi chiusi abbandonati, ecc.). Vive in piccole colonie di circa una cinquantina di adulti nel periodo massimo di sviluppo. Il volo si caratterizza per le zampe stese.

Diffusione: Su tutto il territorio italiano.

Periodo di esposizione agli insetti



Caratteristica:
Nidi piccoli, corpo slanciato e volo con zampe stese

VESPULA VULGARIS

nome comune: vespa comune
nome inglese: yellowjacket




dimensioni reali
da 10 a 20 mm max

La *Vespula vulgaris* ha un corpo di lunghezza tra 1 e 2 centimetri, di colore giallo e nero. Spesso costruisce i nidi sotterranei, per questo è anche chiamata "terragnola", ma talvolta può essere appeso ai rami degli alberi, oppure all'interno delle cassette della posta e sotto vasi rovesciati. Le colonie possono essere composte tra 1.000 e 2.000 individui. La *Vespula vulgaris* può diventare pericolosa se disturbata.

Diffusione: Su tutto il territorio italiano.


Periodo di esposizione agli insetti




Caratteristica:
Nidi grandi e spesso sotterranei



ALBERO ENTOMOLOGICO



ALBERO ENTOMOLOGICO



VESPA CRABRO

nome comune: calabrone europeo
nome inglese: european hornet




dimensioni reali
fino a 35 mm

La *Vespa crabro* ha una lunghezza di 3,5 centimetri (regina) e 2,5 centimetri (operaie) e sono di colore giallo-arancio e rosso-marrone. Questo insetto è presente in pianura ed in collina. Caccia insetti di vario tipo, incluse le api. Nidifica di preferenza in alberi cavi e nei muri. Il nido ha un involucro di colore marrone chiaro, molto fragile. Le colonie sono composte da qualche centinaio di esemplari adulti nel periodo di massimo sviluppo. Riesce a volare anche nelle ore serali e notturne.

Diffusione: Su tutto il territorio italiano.


Periodo di esposizione agli insetti



Caratteristica:
Forte ronzio, volo anche notturno




ALBERO ENTOMOLOGICO



VESPA VELUTINA

nome comune: calabrone asiatico
nome inglese: asian hornet




dimensioni reali
da 17 a 32 mm

Il calabrone asiatico, conosciuto anche come calabrone a zampe gialle, *Vespa velutina*, ha una livrea bruno-nerastra, con una larga banda giallo-arancio sull'addome e una sottile banda gialla sul primo segmento. Le zampe alle estremità sono gialle. Misura tra 17 e 32 mm. Preda principalmente le api.

Diffusione: originario dell'Asia, attraverso la Liguria si sta diffondendo in tutto il Centro-Nord Italia

Periodo di esposizione agli insetti



Caratteristica:
colore quasi nero, distrugge gli alveari



VESPA ORIENTALIS

nome comune: calabrone orientale
nome inglese: oriental hornet




dimensioni reali
fino a 35 mm

Il calabrone orientale, *Vespa orientalis*, ha la stesse dimensioni del calabrone europeo. Ha un corpo rossiccio e solo la testa, vista di fronte, ed una banda dell'addome sono gialli. E' presente solo nel sud-est europeo (sud Italia, Malta, Albania, Grecia, Romania, Bulgaria). Il colore giallo rossiccio è dovuto ad un pigmento che reagisce alla luce del sole. Preda molti insetti e in particolare le api

Diffusione: storicamente presente nel Sud Italia, ma si sta espandendo in tutto il Centro e Nord-Est Italia.

Periodo di esposizione agli insetti



Caratteristica:
colore rossiccio, distrugge gli alveari



APIS MELLIFERA

nome comune: ape

nome inglese: bee




dimensioni reali
da 11 a 15 mm max

L'*Apis mellifera*, conosciuta comunemente come ape, è un insetto molto comune. Allevata e rispettata sin dall'Antico Egitto per il prezioso miele e considerata il più importante impollinatore del pianeta. Le api operaie possono avere una lunghezza tra 1,1 ed 1,5 cm ed hanno una colorazione arancio chiaro e marrone scuro.

Diffusione: Su tutto il territorio italiano.

Periodo di esposizione agli insetti:



Caratteristica:
docile, dopo aver punto muore



ALBERO ENTOMOLOGICO



I PRINCIPALI LUOGHI DI NIDIFICAZIONE



www.anallergo.it

Difendiamo la Natura



sostieni il miele italiano

ANALLERGO
IMMUNOTHERAPY RESEARCH

BOMBUS TERRESTRIS

nome comune: bombo comune

nome inglese: bumblebee




dimensioni reali
fino a 30 mm

Il suo corpo lungo fino a 3 centimetri ed è di forma tozza ricoperto di fitti peli, tanto da aver originato la leggenda di non poter volare e ispirato famose composizioni di musica classica. È docile e ma rispetto alle altre api non produce il miele. Il ruolo del *Bombus terrestris* è quello di impollinatore, grazie alla robustezza e alla peluria che lo caratterizzano e per questo è molto utilizzato in tutta l'agricoltura.

Diffusione: Su tutto il territorio italiano.

Periodo di esposizione agli insetti:



Caratteristica:
docile, utilizzato in agricoltura



ALBERO ENTOMOLOGICO

