



Wound & Scar Protection Hydrogel

X-ONCO CREAM




01 상처가 치유되는 과정




02 상처치유가 지연 되는 이유

- 단백질 분해 효소 촉진 과다
- 상처내 세균 증식
- 피부내 건조 상태 지속



엑손코크림은 정상세포가 증식할 수 있도록 펩타이드구조 단백질과 망상형구조 다당류가 세포조직 형태의 결정 및 정상 기능을 할 수 있는 환경을 제공한다.

03 피부보호 기전



A

엑손코크림에 함유된 올리고펩타이드, 실리카 등의 유효성분이 피부상처에 적용되어 단백질 분해 세균, 각질, 죽은 세포가 축적된 상처 주위로 분포하여 2~4일차 시간이 진행될수록 상처 가장자리에 분포한다.

B~E

2일차부터 7일차까지 함유된 유효성분인자가 각질 세포 및 죽은 세포를 감소 시킨다.

F

엑손코크림이 손상된 상처 가장자리에 자리잡아 각질세포의 증식 없이 통증을 감소시켜 상처에 분포된 유효인자가 Clean wound를 형성한다.


04 상처 치유를 위한 XWF(X-ONCO CREAM Wound Factor)역할




올리고펩타이드-1



소듐 하일루로네이트



치유된 상처



실리카

엑손코크림의 XWF(올리고펩타이드-1, 소듐 하일루로네이트, 실리카) 유효성분이 피부의 작용하여 상처 치유의 도움을 준다.

품목명	국소하이드로겔 창상피복제
제품명	X-ONCO CREAM
비급여코드	BM5000FT
규격	50G
품목허가번호	제인 19-4631호
사용목적	비대성 혹은 켈로이드성 상처의 흉터관리 및 보호
사용방법	별 첨
사용시 주의사항	별 첨
저장 및 보관방법	실온보관
사용기한	사용기간:3년 / 개봉 후:1년



참고문헌

Heparin-binding EGF-like growth factor accelerates keratinocyte migration and skin wound healing 2005 Jun 1;118(Pt 11):2363-70

Use of silicon for skin and hair care: an approach of chemical forms available and efficacy*, 2016 May-Jun; 91(3): 331-335

Role of Hyaluronic Acid Treatment in the Prevention of Keloid Scarring 2012 Jun; 4(2): 23-31.

Biochemical and physical actions of hyaluronic acid delivered by intradermal jet injection route, 16 August 2020

Advanced Growth Factor Delivery Systems in Wound Management and Skin Regeneration, Molecules. 2017 Jul 27

Healing Efficacy of an EGF Impregnated Triple Gel Based Wound Dressing: In Vitro and In Vivo Studies, Hindawai, 23 May 2014

Wound Healing and Repair. Medscape. Jan 22, 2021

Skin tissue regeneration for burn injury.Stem Cell Research & Therapy . 15 March 2019

제조원 : MODA HEALTHCARE ⁺

Tel: 031 707 0673 - Fax: 02 6959 6672 주 소 : 서울시 송파구 백제고분로 36길 4 1층