



ZYTIGA

INFORMATIEBROCHURE

01

ZYTIGA® / ABIRATERONE

In samenspraak met jouw arts is er beslist om te starten met Zytiga® (Abiraterone). Deze brochure bevat extra informatie omtrent het medicijn Zytiga® (Abiraterone) en is bedoeld als aanvulling op de uitleg die je kreeg van jouw uroloog en de oncocoach.

Heb je na het lezen van deze brochure nog bijkomende vragen, aarzel dan niet om ze met jouw behandelend arts of de oncocoach te bespreken.

De contactgegevens vind je achteraan deze brochure.

Wat is Zytiga?

Zytiga® (Abiraterone) is een medicijn dat de productie van het mannelijk geslachtshormoon (testosteron) onderdrukt. Bij patiënten met prostaatkanker kan Zytiga® de verdere groei van prostaatkankercellen verhinderen.

Zytiga® blokkeert de aanmaak van testosteron op drie niveaus:

- Ter hoogte van de teelballen
- Ter hoogte van de bijnieren
- Ter hoogte van de tumor zelf – sommige prostaatkankercellen produceren zelf testosteron

Zytiga® kan worden gestart in één van deze gevallen:

- Bij de behandeling van een prostaatkanker waarbij uitzaaiingen zijn ontstaan die hormoon-gevoelig zijn.
- Bij de behandeling van een prostaatkanker waarbij uitzaaiingen zijn ontstaan die niet meer hormoon-gevoelig zijn.

Hoe wordt Zytiga® ingenomen?

Neem steeds de dosis die door uw behandeld arts werd voorgeschreven.

	2 tabletten van 500mg (=1000mg) samen innemen Niet eten van 2u voor tot 1u na inname	+ cortisonepreparaat
---	---	----------------------

- De aanbevolen dosis Zytiga® bedraagt één keer per dag 1000 mg (2 tabletten van 500 mg). De 2 tabletten dienen samen met een glas water ingenomen te worden.
- Je mag vanaf twee uur voor tot één uur na inname van de tabletten niets eten.
- Neem de tabletten dagelijks in op hetzelfde tijdstip. Dit zorgt ervoor dat de hoeveelheid werkzame stof in het bloed stabiel blijft.
- Slik de tabletten in met een glas water, zonder te kauwen.
- Je mag de tabletten niet pletten, breken of oplossen

In sommige gevallen kunnen dosisaanpassingen nodig zijn. Jouw arts vertelt jou welke dosis je moet nemen.

Bijzondere voorzorgsmaatregelen

- Slik de tablet altijd in zijn geheel door. Kauw niet op de tablet.
- Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van Zytiga® verminderen of verhogen de kans op bijwerkingen. Laat aan jouw arts weten welke medicatie je thuis neemt.
- Bewaar Zytiga® op kamertemperatuur op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen.
- Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van Zytiga® verminderen of verhogen de kans op bijwerkingen. Laat aan jouw arts weten welke medicatie je thuis neemt.
- Gebruik geen preparaten op basis van sint-janskruid (sint-janskruid bestaat onder andere in druppels en tabletten van dr A. Vogel) en drink/eet geen pompelmoes(sap) tijdens jouw behandeling met Zytiga®. Sint-janskruid en pompelmoes kunnen de werking van Zytiga® nadelig beïnvloeden.
- Corticosteroïden verminderen de mogelijke bijwerkingen van Zytiga®. Neem het cortisonepreparaat altijd zoals aangegeven
- Breng overgebleven medicatie terug mee naar het ziekenhuis indien bij jou de therapie wordt stopgezet: spoel die nooit weg via het toilet of de lavabo.

Maatregelen bij verkeerd gebruik of problemen bij inname

- Wanneer je een dosis bent vergeten in te nemen op het juiste tijdstip, neem dan de overgeslagen dosis alsnog in van zodra je eraan denkt vóór de volgende geplande dosis. Indien het tijdstip voor de volgende dosis al is aangebroken, neem dan op dat moment enkel de gebruikelijke dosis in en geen dubbele dosis.
- Bij braken vlak na de inname van Zytiga® hoef je jouw dosis niet te herhalen. Neem de volgende dosis op het geplande tijdstip in.
- Wanneer je een dosis te veel hebt ingenomen, contacteer dan jouw behandelend arts of de arts met wachtdienst via het ziekenhuis.

Bijwerkingen

De nevenwerkingen van Zytiga® zijn over het algemeen mild.

Voor het opvolgen van de bijwerkingen, moet je op regelmatige tijdstippen op controle gaan bij jouw huisarts en/of behandelend uroloog.

Mogelijke bijwerkingen kunnen zijn:

- Vochtopstapeling met gewichtstoename of dikke benen/voeten als gevolg
- Tekort aan kalium in het bloed. Hier merkt je vaak zelf niets van. Bij ernstige verlaging kan dit spierzwakte, spiertrekking of hartkloppingen tot gevolg hebben. Indien je deze symptomen vertoont, raadpleeg dan onmiddellijk een arts. Het kaliumgehalte zal regelmatig worden gecontroleerd via een bloedafname.
- Hoge bloeddruk
- Afwijkende leverwaarden – gecontroleerd via bloedafname
- Diarree
- Urineweginfectie

Contacteer steeds jouw arts of oncocoach bij het optreden van een mogelijke bijwerking.

Als je je slap voelt, herhaaldelijk braakt of diarree hebt gedurende meer dan één dag, neem dan contact op met jouw arts om het kaliumgehalte in je bloed te laten bepalen.

Hoe lang moet Zytiga® genomen worden?

De duur van de behandeling hangt af van hoe je de behandeling verdraagt en wat het effect is van de behandeling. Aan de hand van regelmatige bloedcontroles en eventuele controle scans wordt het effect gecontroleerd. Indien blijkt dat de therapie niet meer of onvoldoende zou werken, zal deze gestopt worden en worden verdere behandelingsopties met jou besproken.

Waar is Zytiga® verkrijgbaar?

Zytiga® is enkel verkrijgbaar op voorschrift in de ziekenhuisapotheek. Zytiga® kan dus niet in een reguliere apotheek afgehaald worden. Deze medicatie wordt volledig terugbetaald door de ziekteverzekering.

Zytiga® kan afgehaald worden in de ziekenhuisapotheek van campus Aalst Moorselbaan, Aalst Merestraat, Asse, Geraardsbergen en Wetteren.

Openingsuren en contactgegevens ziekenhuisapotheek

Campus Aalst Moorselbaan:

Maandag tot vrijdag van 8u00-18u.

Zaterdag van 9u00-13u.

T +32 (0)53 72 48 57 M bestellers_apotheek@azorg.be

Campus Aalst Merestraat:

Maandag tot vrijdag van 8u00-17u00.

T +32 (0)53 76 48 54 M apothekers.aalst@azorg.be

Campus Asse:

Maandag tot vrijdag van 8u30-12u30 en 13u-17u00.

T +32 (0)2 300 62 37 M apotheek.asse@azorg.be

Campus Geraardsbergen:

Maandag tot vrijdag van 8u00-17u00.

T +32 (0)54 43 21 60 M apothekers.gb@azorg.be

02

ONCOLOGISCH BEGELEIDINGSTEAM

AZORG wil zorgen voor volledige oncologische zorg, waarbij ook psychosociale ondersteuning een belangrijke rol speelt. Artsen, verpleegkundigen, psychosociale hulpverleners en andere zorgverleners werken samen om u en uw naasten te ondersteunen.

1. Psychosociale ondersteuning

Psychosociale ondersteuning betekent:

- Dat kankerpatiënten en hun naasten continu en actief worden begeleid.
- Dat het lichamelijk, psychologisch en sociaal welzijn zo goed mogelijk wordt behouden of verbeterd.
- Dat begeleiding wordt gegeven tijdens de ziekte, de behandeling en ook daarna.

2. Begeleidingsteam

De oncocoach kan u en uw naasten gerichte informatie en steun geven. Zij vertelt u meer over hoe de behandeling verloopt, wat het inhoudt en hoe lang het duurt. Na een verwijzing door de uroloog helpt zij u om het proces van onderzoeken en behandelingen te begrijpen en te doorlopen.

T +32 (0)53 72 70 63

T +32 (0)53 72 85 14

T +32 (0)53 76 62 36

De maatschappelijk werker geeft advies bij persoonlijke, familie-, financiële, administratieve en praktische problemen die kunnen ontstaan door uw ziekte en behandeling.

De klinisch psycholoog helpt u en uw naasten omgaan met emoties en veranderingen die kanker met zich meebrengt.

Secretariaat Urologie

T +32 (0)53 72 43 78

T +32 (0)53 76 49 93

NOTITIES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Campus Aalst Moorselbaan

Moorselbaan 164

9300 Aalst

T. 053 72 44 48

Campus Aalst Merestraat

Merestraat 80

9300 Aalst

T. 053 76 49 93

Campus Asse

Bloklaan 5

1730 Asse

T. 053 72 44 48

Campus Geraardsbergen

Gasthuisstraat 4

9500 Geraardsbergen

T. 054 43 22 23

Campus Ninove

Biezenstraat 2

9400 Ninove

T. 053 72 44 48

Campus Wetteren

Wegvoeringstraat 73

9230 Wetteren

T. 09 368 82 68



azorg.be