Alergitrat L
Loratadina

Antialérgico

Venta Libre Industria Argentina

Fórmula
Cada comprimido contiene:
Ingrediente activo: Loratadina 10 miligramos.
Ingredientes inactivos: Lactosa anhidra de compresión directa Celulosamicrocristalina, Almidón glicolato sódico, Estearato de magnesio.
Cada 100 ml de jarabe contiene:
Ingrediente activo: Loratadina 100 miligramos.
Ingredientes inactivos: Acido cítrico anhidro, Propilenglicol, Benzoato de sodio, Glicerina, Azúcar, Sabor artificial de naranja, Agua purificada c.s.p.

Acción Terapéutica
Antialérgico.

Uso del medicamento. Lea detenidamente esta información.

Indicaciones
Tratamiento sintomático y alivio temporario de los síntomas cousados por alergias respiratorias como ser: secresión nasal, estornudos, lagrimeo y picazón en los ojos, nariz y/o garganta. También está indicado para las alergias de la piel que se manifiesten con picazón, ronchas y enrojecimiento.

Cómo usar este medicamento
Comprimidos
Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido (10 mg) por día, con agua con o sin alimentos; no más de un comprimido en 24 horas.
Jarabe
Niños de 6 a 12 años con peso menor a 30 kg: 5 ml (5 mg) 1 vez por día. Niños con peso mayor a 30 kg: 10 ml (10 mg) 1 vez por día.
Ancianos o personas con dificultad para tragar: 10 ml de jarabe (10 mg) por día.
10 ml de jarabe contienen 10 mg de Loratadina.
La duración del tratamiento no debe superar más de 5 días ininterrumpidos.
Niños menores de 6 años de edad consultar previamente al médico.
La administración de ALERGITRAT L 10 mg comprimidos o jarabe no es adecuada para la administración de dosis inferiores a 10 mg.

Contraindicaciones
No use este medicamento si tiene alergia conocida a alguno de los componentes de la fórmula.
Niños menores de 12 años de edad.
Si tiene enfermedad hepática y/o renal.
Si es asmático.
Jarabe: Pacientes diabéticos o con intolerancia a ciertos hidratos de carbono.
Niños menores de 6 años de edad.

Precauciones y Advertencias
Consulte a su médico antes de iniciar el tratamiento con este medicamento si usted tiene alguna enfermedad hepática y/o renal. Algunos medicamentos como los utilizados para tratar la depresión, las infecciones por hongos y algunos antibióticos como la Eritromicina, pueden aumentar los niveles de Loratadina lo que puede causar un aumento de las reacciones adversas. Si sufre ataques agudos de asma, consulte a su médico.
Si tiene más de 65 años. Menores de 12 años.
Si recibe algún otro medicamento.
Suspender el tratamiento 48 horas antes de efectuar cualquier tipo de prueba cutánea de alergia, ya que los antialérgicos pueden interferir eventualmente dando resultados "falsos negativos".
Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar, consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.
ALERGITRAT L puede tomarse con o sin alimentos. Evite el consumo de bebidas alcohólicas.
Jarabe: Menores de 6 años.
Si tiene intolerancia hereditaria a ciertos azúcares.

Reacciones Adversas
Pueden aparecer efectos no deseados causados por este medicamento, como: somnolencia, dolor de cabeza, nerviosismo, cansancio, aumento del apetito y dificultad para dormir. En niños se ha observado nerviosismo.
Si los síntomas alérgicos persisten por más de 5 días o empeoran consulte a su médico.
Suspenda el uso de la medicación si aparecen síntomas que necesitan de una evaluación médica.

Conducción y uso de máquinas
Observe su respuesta a la medicación, porque puede producir disminución de la capacidad de reacción o somnolencia a las dosis recomendadas. Si así fuera, absténgase de conducir y manejar maquinaria peligrosa.

Sobredosis
Llame por teléfono a un Centro de intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.
Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez Tel.: (011) 4962-6666/2247.
Hospital Alejandro Posadas Tel.: (011) 4658-7777 / 4654-6648.
Centro de Asistencia Toxicológica La Plata Tel.: (0221) 451-5555

¿Tiene usted alguna pregunta?
LABORATORIOS FECOFAR Tel.: 4482-5517 / 5522.
ANMAT responde 0800-333-1234.

Presentación
Comprimidos: Envases conteniendo 10, 30 y 100 comprimidos (siendo los dos últimos de uso hospitalario exclusivo).
Jarabe: Envases conteniendo 60 ml.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Conservar en su envase original en lugar fresco y seco entre 15°C y 30°C y al abrigo de la luz.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N°: 53.267
Director Técnico: Carlos A. Fiorito - Farmacéutico.

Fecha de última revisión: 01/16

LABORATORIOS FECOFAR
Av. Pte. J. D. Perón 2742 – B1754AZV – San Justo – Provincia de Buenos Aires

FECOFAR
El valor de nuestra marca

Una vez consumido el contenido y/o cumplida la fecha de vencimiento del producto, desechar en forma responsable.
Cuidar el medioambiente es una responsabilidad de todos.