Bideon
Free
Efedrina 0,1% | Antipirina 0,4%
COLIRIO

Sin T.A.C.C.

PROSPECTO

Venta bajo receta
Industria Argentina

FECOFAR

Fórmula:
Cada 100 ml contienen: Efedrina (como base) 100 mg; Antipirina 400 mg; Excipientes: Cloruro de Benzalconio 3 mg; Acido Bórico 200 mg; Borato de Sodio 100 mg; Cloruro de Sodio 230 mg; Agua purificada c.s.p. 100 ml.

Acción terapéutica:
Descongestivo y analgésico ocular.

Indicaciones:
Bideon Free está indicado para disminuir la irritación ocular causada por factores externos como humo, polvo, sol, agua de mar y piletas. Refresca los ojos cansados y reduce el enrojecimiento por fatiga ocular resultante del trabajo visual intenso o al uso prolongado de computadoras. Alivia los síntomas de la conjuntivitis alérgica.

Posología y forma de administración:
Adultos y niños mayores de 12 años: Como dosis media terapéutica se aconseja colocar 2 gotas en cada ojo, 4 veces al día.
Instilar las gotas del colirio en el saco conjuntival del ojo a ser tratado, evitando que el pico del frasco gotero entre en contacto con la piel o los tejidos oculares. No compartir el medicamento con otras personas. Cerrar cuidadosamente el frasco gotero luego de cada uso.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Si el malestar o la irritación, dolor y/o congestión conjuntival persisten luego de 2 ó 3 días, se recomienda consultar al oftalmólogo. No emplear mientras se usen lentes de contacto o en forma concomitante con las soluciones humectantes para lentes de contacto, colirios u otras preparaciones oftálmicas que contengan alcohol polivinílico. Se aconseja utilizar con prudencia en caso de hipertensión arterial, afecciones cardíacas e hipertiroidismo. **No utilizar este medicamento durante el embarazo y lactancia.**
Evaluar su administración en pacientes con hiperplacia prostática benigna.

Contraindicaciones:
Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula. Glaucoma.

REACCIONES ADVERSAS:
Raramente midriasis (dilatación de las pupilas). Se ha descripto sensación de sequedad nasal. Cefalea, visión borrosa, hiperemia reactiva.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:
La combinación de efedrina con inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO) puede resultar letal. Debe evitarse el uso de efedrina en pacientes que sean sometidos a anestesia con ciclopropano, halotano u otro anestésico volátil. También debe evitarse en pacientes que reciban medicación con glucósidos cardiotónicos, quinidina, antidepresivos tricíclicos, alcaloides del ergot u ocitocina.

SOBREDOSIS:
La sobredosis puede causar náusea, vómitos, dolor de cabeza, sed, irritabilidad, fiebre, taquicardia, sudoración, midriasis, convulsiones, coma y depresión respiratoria.
Ante una eventual sobredosis o ingestión accidental concurra al Hospital más cercano ó comuníquese con alguno de los siguientes Centros de Toxicología:
Hospital A. Posadas:
(011) 4654-6648 ó (011) 4658-7777.
Hospital de Pediatría R. Gutiérrez:
(011) 4962-6666 ó (011) 4962-2247.

PRESENTACION
Envases por 10 ml.

CONSERVAR EN SU ENVASE ORIGINAL, ENTRE 15º Y 30ºC.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Medicamento libre de gluten

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado Nº: 54.044

Director Técnico: Sergio A. Minguila, farmacéutico.
Fecha de Ultima Revisión: 05/09

Laboratorios Fecofar
Av. Pte. J. D. Perón 2742, B1754AZV, San Justo, Pcia. de Buenos Aires.

FECOFAR
El valor de nuestra marca

Una vez consumido el contenido y/o cumplida la fecha de vencimiento del producto, desechar en forma responsable.
Cuidar el medioambiente es una responsabilidad de todos.