Bideon
Ojos Rojos

Tetrahidrozolina Clorhidrato 0,05 %
SOLUCIÓN OFTÁLMICA

PROSPECTO

Venta libre
Industria Argentina

FECOFAR

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO.
CONSERVE ESTE PROSPECTO YA QUE PUEDE TENER QUE VOLVER A LEERLO.
SI TIENE ALGUNA DUDA CONSULTE A SU MEDICO O FARMACÉUTICO.
SI CONSIDERA QUE ALGUNO DE LOS EFECTOS ADVERSOS QUE SUFRE ES GRAVE O SI APARECE CUALQUIER EFECTO ADVERSO NO MENCIONADO EN ESTE PROSPECTO, INFORME A SU MEDICO.

¿QUE CONTIENE BIDEON OJOS ROJOS?
Cada 100 mililitros de solución oftálmica estéril contiene: Ingrediente activo: Tetrahidrozolina Clorhidrato 50,0 miligramos.
Ingredientes inactivos: Cloruro de Benzalconio, Borato de sodio decahidratado, Edta disódico, Cloruro de sodio, Acido bórico, Acido Clorhídrico, Hidróxido de sodio, Agua purificada.

Cada mililitro de producto equivale a 20 gotas.
Cada gota de 0,05 mililitros contiene 0,025 miligramos de Tetrahidrozolina Clorhidrato

¿QUÉ ACCIÓN TIENE BIDEON OJOS ROJOS?
Descongestivo ocular.

¿PARA QUE SE USA BIDEON OJOS ROJOS?
Alivio temporario del disconfort y el enrojecimiento, debido a irritaciones oculares leves.
Calma el malestar y la irritación ocular leve ocasionados por ejemplo tras la exposición a humo, polvo, agua clorada, luz (ya sea solar, rayos ultravioleta, luz de neon, televisión, como por pantallas de computación), o por corrientes de aire, cosméticos, lentes de contacto, entre otros.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN USAR BIDEON OJOS ROJOS?
NO USE este medicamento sí usted:
• Es alérgico al ingrediente activo (Tetrahidrozolina) o a otro de los ingredientes inactivos de la formulación.
• Es hipersensible/alérgico a agentes adrenergicos o aminas simpaticomimeticas.
• Está embarazada o en período de lactancia.
• Si tiene presión intraocular aumentada (glaucoma de ángulo estrecho).
• Si padece enfermedades del corazón o tiene tensión arterial alta (hipertensión).
• Si tiene un tumor en las glándulas adrenales (feocromocitoma).
• Si tiene la glandula tiroides hiperactiva (hipertiroidismo).
• Si tiene diabetes controlada con insulina.
• Si está en tratamiento con antidepresivos de la clase de los inhiboidores de la amino-oxidasa u otros medicamentos elevadores de la presión sanguínea.
• Si tiene rinitis seca.
• Si tiene inflamada la córnea y la membrana conjuntiva ocular (queratoconjuntivitis).
• En niños menores de 2 años.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE USAR BIDEON OJOS ROJOS?
Consulte a su oftalmólogo para saber si padece alguna enfermedad ocular antes de utilizar este producto.
No utilizar si el frasco no tiene el precinto de seguridad de la tapa intacto, previo a su uso.
Tenga en cuenta que BIDEON OJOS ROJOS es una solución oftálmica estéril de uso externo exclusivo y solo de aplicación tópica en el ojo.
La aplicación excesiva de descongestivos oftálmicos, puede aumentar el enrojecimiento ocular.
Si usted recibe algún otro medicamento, esta embarazada o dando el pecho a su bebe, consulte a su medico antes de usar este medicamento.
Si usa lentes de contacto tenga la precaución de quitárselos antes de aplicar BIDEON OJOS ROJOS y colocárselos por lo menos 15 minutos después.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY UTILIZANDO BIDEON OJOS ROJOS?
Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento como aumento del tamaño pupilar (midriasis) temporaria, picazón o ardor ocular (ante el uso excesivo), incremento de la presión ocular.
Ocasionalmente se han descripto cefaleas, mareos, temblor, palpitaciones o insomnio. Suspender el tratamiento en esos casos y consultar con su oftalmólogo.

El uso excesivo o continuo de descongestivos puede producir un aumento del enrojecimiento ocular.

Este medicamento contiene Cloruro de Benzalconio, el cual se puede absorber por las lentes de contacto blandas alterando su color. Retirar las lentes de contacto antes de usar este medicamento y esperar 15 minutos antes de volver a colocarlas. El Cloruro de Benzalconio puede causar irritación ocular, especialmente si padece de ojo seco u otras enfermedades de la córnea (capa transparente de la zona frontal del ojo). Consulte a su médico si tiene una sensación extraña, escozor o dolor en el ojo después de usar este medicamento.

Si se presenta dolor ocular, cambios en la visión, incremento de la irritación o si la afección persiste luego de 3 días de tratamiento, suspenda la aplicación y consulte al oftalmólogo.

¿COMO SE USA BIDEON OJOS ROJOS?
Lea detenidamente esta información.
Antes de administrar el producto verifique en el estuche y en su contenido, que el nombre comercial, lote y fecha de vencimiento sean coincidentes.

Si usa lentes de contacto tenga la precaución de quitárselos antes de aplicar BIDEON OJOS ROJOS y colocárselos por lo menos 15 minutos después.

BIDEON OJOS ROJOS es de administración tópica en los ojos.

Posología y forma de administración:
Adultos y niños mayores de 6 años: La dosis media terapéutica es de 1 a 2 gotas en el/los ojo/s afectados, hasta 4 veces al día.
El efecto descongestivo es inmediato tras la administración y se mantiene de 4 a 6 horas.

Instrucciones de uso:
Para la correcta colocación de las gotas se sugiere el siguiente procedimiento:
Lávese bien las manos antes de aplicar BIDEON OJOS ROJOS
Abra la tapa del envase. Ante el primer uso rompa el precinto de seguridad.
Aplique el producto en el saco conjuntival del/los ojo/s afectado/s evitando que contacte la punta del gotero con el ojo, piel u otras superficies, en caso de utilizar lentes de contacto debe quitárselos antes de la aplicación de BIDEON OJOS ROJOS y luego de 15 minutos volver a colocarlos:

Sugerencia para la auto administración de gotas:
Incline la cabeza levemente hacia atrás y mire hacia un punto fijo en el techo.
Con el dedo índice, presione el párpado inferior hacia abajo con suavidad formando una bolsa, este espacio es el saco conjuntival, presione el frasco gotero para permitir que la gota caiga en la bolsa o saco conjuntival.
Luego de aplicar la gota, de ser posible mantener abierto el ojo tratado, sin parpadear, durante 30 segundos, caso contrario cierre sus ojos suavemente sin apretarlos.
Oprima levemente la parte interior del ojo (por donde salen las lagrimas) Mantenga sus ojos cerrados, antes de abrirlos limpie suavemente con un pañuelo descartable limpio de papel lagrimas o restos de medicamento no absorbidos.

Si fuese necesario, aplicar de igual forma la segunda gota. Luego parpadear normalmente. Seguir el mismo procedimiento si el otro ojo también estuviese irritado.

Finalizada la aplicación coloque nuevamente la tapa en el envase.
El orificio del frasco gotero no debe tocar el ojo ni tocarse con los dedos.
Lávese nuevamente las manos, para evitar transportar posibles restos del medicamento.
Un mismo envase no debe ser utilizado por más de una persona.

El producto tiene una vida útil de 4 semanas tras la apertura del envase. Pasado dicho plazo, el envase con la solución remanente debe descartarse.

¿QUE DEBO HACER ANTE UNA INGESTIÓN ACCIDENTAL O SI ME APLIQUÉ MAS CANTIDAD DE LA NECESARIA DE BIDEON OJOS ROJOS?
En caso de una ingestión accidental o ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:
• Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.
• Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.
• Hospital General de Agudos J. A. Fernández: (011) 4808-2655.
• Hospital de Niños Pedro Elizalde: (011) 4300-2115.
• Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-3330-160.
• Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555

¿SI USTED TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE BIDEON OJOS ROJOS?
• Su médico o farmacéutico le puede dar más información acerca de BIDEON OJOS ROJOS.
• o comuníquese con FED. ARGENTINA DE COOPERATIVAS FARMACÉUTICAS COOP. LTDA. al teléfono 011-4482-5522 o por mail: contacto@fecofar.com.ar.
• o bien llame al teléfono ANMAT responde 0800-333-1234.

¿CÓMO SE PRESENTA BIDEON OJOS ROJOS?
BIDEON OJOS ROJOS se presenta en estuches conteniendo un frasco plástico con inserto gotero conteniendo 15 ml de solución oftálmica.

¿CÓMO CONSERVAR BIDEON OJOS ROJOS?
Conservar en su envase original, a temperatura ambiente entre 15 y 30°C.
Una vez abierto el envase por primera vez, se recomienda utilizarlo para un tratamiento individual y desecharlo transcurridas 4 semanas desde su apertura.
Verifique la fecha de vencimiento antes de utilizar este o cualquier medicamento.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MEDICO Y/O FARMACÉUTICO

Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud. Certificado N°: 59.868

Elaborado en Sub Oficial Perdomo 1619, Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires.

Director Técnico:
Sergio A. Minguila - Farmacéutico.

Fecha de última revisión: 04/2023

Laboratorios Fecofar
Av. Pte. J. D. Perón 2742 - B1754AZV - San Justo - Pcia. de Buenos Aires.

FECOFAR
El valor de nuestra marca

41686-01

Una vez consumido el contenido y/o cumplida la fecha de vencimiento del producto, desechar en forma responsable.
Cuidar el medioambiente es una responsabilidad de todos.