
Branzol

Clorhidrato de Ambroxol



Jarabe

FECOFAR

VENTA LIBRE
Industria Argentina

Fórmula:
Cada 100 ml de Jarabe contiene:
Ingrediente activo: Ambroxol Clorhidrato 300 miligramos.
Ingredientes inactivos: Glicerina, Sorbitol liquido 70 %, Sacarina sódica, Ciclamato sódico, Metilparabeno sódico, Propilparabeno sódico, Acido cítrico anhidro, Povidona K30, Esencia de Frutillas, Colorante rojo amaranto, Agua purificada c.s.p.

Uso del medicamento:
Lea detenidamente esta información.

Accion terapéutica:
Mucolítico y expectorante.

Indicaciones:
Alivio sintomático del catarro bronquial y de la tos.

Como usar este medicamento
Posología
Adultos y mayores de 12 años: 10 ml 3 veces por día (cada 8 horas).
Medir las dosis con el vasito dosificador provisto con el producto.

Modo de Uso
Administrar el producto durante las comidas.
Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 48 hs de tratamiento. No utilizar este medicamento por más de 5 dias.
La vía de administración es oral.
Se recomienda la administración durante las comidas y beber un vaso de agua después de cada dosis y abundante liquido durante el día.

Advertencias y Precauciones
- Dado que durante este tratamiento es de esperar un aumento de las secreciones, no es aconsejable en pacientes con dificultades para expectorar.
- No tome este medicamento si Ud. es un paciente con intolerancia hereditaria a la fructosa.
- Si usted tiene problemas relacionados con el funcionamiento del riñón o hígado, consulte a su médico antes de tomarlo.
- Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.
- No se sugiere la asociación con otros medicamentos para la tos, expectorantes y/o mucolíticos.

Contraindicaciones
No use este medicamento si usted sabe que es alérgico a alguno de los ingredientes.
Niños menores de 12 años.

Reacciones adversas
Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento como: trastornos gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal superior, reacciones en la piel y mucosas: enrojecimiento, picazón, urticaria y reacciones alérgicas.
Suspenda su uso y consulte a su médico si aparece una nueva lesión en piel o mucosas.
Si los síntomas (expectoración) persisten por más de 5 días o empeoran consulte a su médico.

Sobredosificación
Ante la eventualidad de una sobredosis o ingestión accidental concurra al Hospital más cercano o comuníquese con alguno de los siguientes Centros de Toxicología:
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 ó (011) 4658-7777.
Hospital de Pediatría R. Gutiérrez: (011) 4962-6666 ó (011) 4962-2247.
Centro de Asistencia Toxicológica La Plata Tel.: (0221) 451-5555.

¿Tiene Ud. alguna pregunta?
LABORATORIOS FECOFAR Tel: 4482-5517 / 5522.
ANMAT responde: 0800-333-1234

Presentaciones
Envases por 120 ml de jarabe.

Conservar en su envase original a 30ºC, en lugar seco. Proteger de la luz.
Este medicamento, como cualquier otro, debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
Lea atentamente el prospecto y ante cualquier duda consulte a su médico y/o su farmacéutico.

Medicamento libre de gluten.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 54.045
Dirección Técnica: Sergio A. Minguila - Farmacéutico.
Fecha de última revisión: 5/15

Laboratorios Fecofar
Av. Pte. J. D. Perón 2742
(B1754AZV) San Justo, Pcia. de Buenos Aires.