Bucasmol A spray

Benzocaína 1%
Tirotricina 0,05%

ANESTÉSICO, ANTIBIÓTICO Y DESODORANTE DE LA CAVIDAD BUCO-OROFARINGEA.
INCOLORO • SIN AZÚCAR

sin TACC

sabor mentol

Solución Oral
Venta Libre
Industria Argentina

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

¿QUE CONTIENE BUCASMOL A?
Cada 100 mililitros de solución contiene:
Ingrediente activo: Benzocaína 1,000 gramo, Tirotricina 0,050 gramos.
Ingredientes inactivos: Mentol 0,100 g, Sacarina sódica 0,150 g, Eucaliptol 0,100 g, Anethol 0,150 g, Glicerina 10,000 g, Alcohol etílico 96º 40,000 g, Agua purificada c.s.p. 100,00 ml.
Este producto contiene 40% P/V de alcohol.

ACCION:
Antibiótico, Anestésico. Uso tópico bucal.

¿PARA QUE SE USA BUCASMOL A?
Alivia el dolor, las molestias y otros síntomas de afecciones leves de la boca, como aftas, llagas, inflamación de las encías, heridas pequeñas y heridas por uso de brackets. Uso externo.

¿QUE PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR BUCASMOL A?
No use este medicamento si:
- Es alérgico a la Benzocaína y/o a la Tirotricina o a cualquiera de los demás componentes de Bucasmol A.
- Es alérgico a otros anestésicos locales.


No utilizar en menores de 12 años de edad, embarazo o lactancia. Este medicamento contiene alcohol etílico, por lo que no deberá ser utilizado por pacientes que sufran enfermedad hepática, alcoholismo, epilepsia, embarazo y niños.
No usar en pacientes bajo tratamiento con Disulfiram.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?
No use este medicamento y/o consulte a su médico antes de tomar BUCASMOL A si:
- Está utilizando cualquier otro medicamento.
- Está embarazada o dando el pecho a su bebe.
- El niño tiene menos de 12 años.
- Utiliza otros antisépticos bucofaríngeos.
- Se encuentra bajo tratamiento con disulfiram.

No exceder la doisis diaria recomendada.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS TOMA BUCASMOL A?
A las dosis y tiempos de tratamiento recomendados, BUCASMOL A es muy bien tolerado.
Eventualmente se puede experimentar hormigueo de la lengua y la boca. En tratamientos con dosis muy elevadas o en tratamientos prolongados, pueden aparecer infecciones con otras bacterias u hongos, y la posibilidad de aparición de algún tipo de reacción alérgica (reacciones de hipersensibilidad). Si la afección local es acompañada de fiebre y/o náuseas y vómitos, o si aparecen nuevos síntomas, o si el cuadro no mejora luego de 2 días, interrumpir el tratamiento y consultar con su médico.
Si ud. toma regularmente otro medicamento, consulte a su médico y/o farmacéutico antes de consumir este producto a fin de evaluar posibles interacciones entre los mismos.

¿COMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?
Antes de utilizar este medicamento, asegúrese de que coincida el nombre completo, lote y fecha de vencimiento que figura en el envase secundario(caja), con el que figura en el envase primario (frasco).
Lea detenidamente esta información.
Siga estrictamente las instrucciones de aplicación y las dosis recomendadas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico.
En caso de duda, pregunte a su médico o farmacéutico.
No usar antes de comer o beber.
Las dosis recomendadas son: **Adultos y adolescentes mayores de 12 años**: 2 pulsaciones cada 2 a 3 horas, aumentando el tiempo entre aplicaciones a medida que disminuyan las molestias. En ningún caso deben sobrepasarse las 16 aplicaciones diarias.
Forma de administración: Producto para uso bucofaríneo. El medicamento tiene acción local por lo que debe evitarse tragar o aspirar el medicamento. No utilizar el medicamento antes de las comidas o antes de beber.
Antes de utilizar el producto por primera vez, es conveniente efectuar 2 o 3 pulsaciones al aire para conseguir de este modo cebar la válvula de dosificación. No debe enjuagarse la boca luego de su aplicación.



¿QUE DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI INGERÍ POR ERROR BUCASMOL A?
Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.
Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez Tel.: (011) 4962-6506/2247. Hospital Alejandro Posadas Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777. Centro de Asistencia Toxicológica La Plata Tel. (0221) 451-5555.

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?
LABORATORIOS FECOFAR Tel.: 4482-5517 / 5522.
ANMAT responde 0800-333-1234.

ESTE MEDICAMENTO COMO CUALQUIER OTRO, DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Medicamento libre de gluten

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO

Conservar a temperatura ambiente no mayor a 30º C

No utilizar este medicamento luego de la fecha de caducidad indicada en el envase.

PRESENTACIÓN:
Frasco de PEAD con bomba atomizadora spray conteniendo 45 mililitros de solución.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 58.458
Fecha de última revisión: 01/22

LABORATORIOS FECOFAR
Av. Pte. J. D. Perón 2742 - B1754AZV, San Justo, Provincia de Buenos Aires

Director Técnico: Sergio A. Minguila, Farmacéutico.

AFTAS • LLAGAS
DOLOR DE GARGANTA



41782/03

FECOFAR