

FECOFAR

Venta Libre
Industria Argentina

FORMULA:
Cada caramelo contiene: Benzocaína 15,00 mg; Tirotricina 1,00 mg; Clorhexidina Clorhidrato 5,00 mg.
Excipientes: Esencia de Anís, Esencia de Eucaliptol, Mentol Cristal, Glucosa Líquida, Azúcar, Agua c.s.p.

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

ACCIÓN TERAPÉUTICA:
Antiséptico y anestésico bucofaríngeo.

¿PARA QUÉ SE USA?
Se usa para el alivio temporal de los dolores y de las inflamaciones bucofaríngeas. Dolor de garganta, dolor a la deglución, estomatitis, faringitis, aftas.

¿COMO SE USA?
Antes de cada toma verifique en el estuche y en su contenido (blister), que el nombre comercial, lote y fecha de vencimiento sean coincidentes.
En adultos y niños de 12 años o más: dejar disolver un caramelo lentamente en la boca. Puede repetirse la toma cada 3 o 4 horas, con un máximo de 7 caramelos por día.

¿QUE PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR CARAMELOS ANTIBIOTICOS FECOFAR PLUS?
NO USE este medicamento si presenta alergia a cualquiera de los principios activos. NO USE durante el embarazo ni la lactancia. No usar en niños menores de 12 años.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?
• Si el dolor de garganta es severo o se acompaña de dificultades en la respiración o los síntomas no mejoran en 7 días, consulte a su médico.
• Si el dolor de garganta se acompaña o es seguido por fiebre, dolor de cabeza, enrojecimiento, hinchazón, náuseas o vómitos, consulte a su médico a la brevedad.
• Si está embarazada, consulte a su médico.
• Si se encuentra en período de lactancia, consultar con un médico antes de utilizar este medicamento.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?
Pueden aparecer efectos no deseados relacionados con reacciones de alergicas, pero estos raramente ocurren.

Se han detectado reacciones alérgicas graves, aunque muy poco frecuentes, con antisépticos conteniendo GLUCONATO DE CLORHEXIDINA. Se aconseja prestar especial atención si alguna vez ha tenido una reacción alérgica con cualquier antiséptico. En caso de notar algún síntoma inusual, busque atención médica inmediata.

¿QUE HACER EN CASO DE SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA INDICADA?
Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.
TELÉFONOS DE CENTROS DE TOXICOLOGÍA:
Hospital de Pediatría R. Gutiérrez:
(011) 4962-6666 ó (011) 4962-2247.
Hospital A. Posadas:
(011) 4654-6648 ó (011) 4658-7777.

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?
LABORATORIOS FECOFAR
Tel.: 4482-5517 / 5522
https://www.fecofar.com.ar
ANMAT responde 0800-333-1234.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO ES GOLOSINA.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.
Conservar en su envase original entre 15ºC y 30ºC.
PRESENTACION:
Envases conteniendo 9 caramelos en blisters de PVC - Aluminio.

Medicamento libre de gluten.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nº 57.709
Director Técnico: Sergio A. Minguila - Farmacéutico.

Fecha de última revisión: 11/19

41692/02

Laboratorios Fecofar
Av. Pte. J. D. Perón 2742 - B1754AZV - San Justo - Pcia. de Buenos Aires.

www.fecofar.com.ar

FECOFAR
El valor de nuestra marca

Una vez consumido el contenido y/o cumplida la fecha de vencimiento del producto, desechar en forma responsable.
Cuidar el medioambiente es una responsabilidad de todos.