

FECOFAR

Con Isomaltitol, que evita y previene la formación de caries

Venta Libre
Industria Argentina

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

¿QUÉ CONTIENE CARAMELOS ANTIBIOTICOS FECOFAR FREE PLUS?
Cada caramelo contiene:
Ingredientes activos: Benzocaína 15 miligramos; Tirotricina 1 miligramo; Clorhexidina clorhidrato 5 miligramos
Excipientes: Sucralosa, Mentol Cristal, Eucaliptol, Colorante azul brillante C.I. 42090, Colorante amarillo de quinolina C.I. 47005, Glicirricinato de Amonio, Maltitol, Isomaltosa.

ACCIONES:
Antiséptico y anestésico bucofaringeo.

¿PARA QUE SE USA CARAMELOS ANTIBIOTICOS FECOFAR FREE PLUS?
Se usa para el alivio temporal de los dolores y de las inflamaciones bucofaríngeas. Dolor de garganta, dolor a la deglución, estomatitis, faringitis, aftas.

¿COMO SE USA CARAMELOS ANTIBIOTICOS FECOFAR FREE PLUS?
Antes de cada toma verifique en el estuche y en su contenido (blister), que el nombre comercial completo, lote y fecha de vencimiento sean coincidentes.
En adultos y niños de 12 años o más: dejar disolver lentamente en la boca. Puede repetirse la toma cada 3 o 4 horas, con un máximo de 7 caramelos por día.

¿QUE PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR CARAMELOS ANTIBIOTICOS FECOFAR FREE PLUS?
No use este medicamento si presenta alergia a cualquiera de los ingredientes.
No use durante el embarazo, ni la lactancia. No usar en niños menores de 12 años.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE CONSUMIR CARAMELOS ANTIBIOTICOS FECOFAR FREE PLUS?
- Si el dolor de garganta es severo o se acompaña de dificultades en la respiración o los síntomas no mejoran en 2 días, consulte a su médico.
- Si el dolor de garganta se acompaña o es seguido de fiebre, dolor de cabeza, enrojecimiento, hinchazón, náuseas o vómitos, consulte a su médico a la brevedad.
- Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY CONSUMIENDO CARAMELOS ANTIBIOTICOS FECOFAR FREE PLUS?
Pueden aparecer efectos no deseados relacionados con reacciones alérgicas, pero estos raramente ocurren.
Se han detectado reacciones alérgicas graves, aunque muy poco frecuentes, con antisépticos conteniendo GLUCONATO DE CLORHEXIDINA. Se aconseja prestar especial atención si alguna vez ha tenido una reacción alérgica con cualquier antiséptico. En caso de notar algún síntoma inusual, busque atención médica inmediata.

¿QUE HACER EN CASO DE SOBREDOSIS, O SI TOMÓ MAS CANTIDAD DE LA INDICADA?
Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.
Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez Tel.: (011) 4962-6506/2247.
Hospital Alejandro Posadas Tel.:
(011) 4654-6648/4658-7777.
Centro de Asistencia Toxicológica La Plata Tel.: (0221) 451-5555.

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?
LABORATORIOS FECOFAR Tel.: 4482-5517 / 5522.
https://www.fecofar.com.ar
ANMAT responde 0800-333-1234.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
NO ES GOLOSINA.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.
Conservar en su envase original entre 15ºC y 30ºC.

Medicamento libre de gluten.

PRESENTACIONES:
Envases conteniendo 9 caramelos en blisters de PVC – Aluminio.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 57.709
Director Técnico: Sergio A. Minguila - Farmacéutico.
Fecha de última revisión: 09/2021

Laboratorios Fecofar
Av. Pte. J. D. Perón 2742 - B1754AZV - San Justo, Pcia. de Buenos Aires.

www.fecofar.com.ar

41688/03

FECOFAR
El valor de nuestra marca

Una vez consumido el contenido y/o cumplida la fecha de vencimiento del producto, desechar en forma responsable.
Cuidar el medioambiente es una responsabilidad de todos.