LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO.
Antes de cada toma verifique siempre la concordancia del nombre, lote y fecha de vencimiento entre el estuche y el envase primario.

¿QUÉ CONTIENE CATARROSINE N.F. JARABE?
Cada 100 ml de solución contiene: Ingrediente activo: Clorhidrato de bromhexina 80 mg.
Ingredientes inactivos: Acido Benzoico Carboximetilcelulosa Sódica, Glicerina, Sorbitol al 70%, Alcohol etílico 96°, Acido Tartárico, Agua destilada c.s.p.

ACCIONES: Mucolítico y expectorante.

¿PARA QUÉ SE USA CATARROSINE N.F. JARABE?
Catarrosine N.F. alivia de los síntomas del catarro bronquial y la tos, por fluidificación del moco, facilitando la expectoración.


¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR CATARROSINE N.F. JARABE?
No use este medicamento si usted sabe que es alérgico al principio activo o componentes inactivos de la fórmula.
Si tiene úlcera gastroduodenal, si tiene dificultad para expectorar, asma, si tiene enfermedades de hígado o riñón o toma alcohol.
Menores de 6 años. Pacientes en tratamiento con Disulfiram.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?
Consulte con su médico antes de ingerir este medicamento en los siguientes casos:
- Si está tomando simultáneamente algún medicamento, por ejemplo otros medicamentos para la tos.
- Si va a ser utilizado en mayores de 65 años.
- Si usted recibe algún medicamento, está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de tomar este medicamento.
- Este medicamento contiene 4,07 % peso / volumen de alcohol etílico / etanol. No administrar si se encuentra contraindicado el alcohol.
- No debe administrarse en pacientes bajo tratamiento con Disulfiram.
- Dado que durante este tratamiento es de esperar un aumento de la secreción, puede no ser aconsejable en pacientes con dificultades para expectorar.
- Si usted es asmático o tiene antecedentes de alguna enfermedad respiratoria.
Debe emplearse con precaución en pacientes con antecedentes de úlcera gastroduodenal, con enfermedades hepáticas y/o alcoholismo.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?
Pueden aparecer efectos no deseados causados por este medicamento, como trastornos del sistema inmune, respiratorios, mediastinales, gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal superior), torácicos (reacciones alérgicas severas, dificultad para respirar, etc.) y reacciones cutáneas intensas (tales como eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson/necrólisis epidérmica).
Raramente: cefaleas, sudoración, exantema, rash y urticaria. Reacciones de hipersensibilidad
Frecuencia no conocida: Reacciones anafilácticas como choque anafiláctico, angioedema y prurito. Reacciones cutáneas intensas como eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson (SSJ)/necrólisis epidérmica tóxica y pustulosis exantematosa generalizada aguda (PEGA).
Se han recibido informes de reacciones cutáneas intensas asociadas a la administración de bromhexina. Si le aparece una erupción cutánea (incluidas lesiones de las mucosas de, por ejemplo, la boca, la garganta, la nariz, los ojos y los genitales) interrumpa el tratamiento y consulte a su médico inmediatamente.
Si luego de ingerir el medicamento se observan síntomas similares a una gripe que no ceden con la administración de este tratamiento, se debe realizar una consulta médica de inmediato y suspender el tratamiento, como medida de precaución.

Si los síntomas del catarro bronquial persisten por más de 2 días, empeoran o no mejoran, consulte inmediatamente con su médico. No administrar este producto por más de 5 días.
Si usted está tomando algún medicamento o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

¿CÓMO SE USA CATARROSINE N.F. JARABE?
Los niños mayores de 12 años (más de 35 Kg de peso) y adultos pueden tomar 10 ml (una cucharada de sopa) tres veces por día, o sea cada 8 horas. Dosis máxima 20 ml, tres veces por día (no superar).
Para niños de 6 a 12 años (hasta 35 Kg de peso) la dosis es 5 ml (1 cucharadita de té) tres veces por día, o sea cada 8 horas. Dosis máxima 10 ml tres veces por día (no superar). Para niños menores de 6 años consulte a su médico.



¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS O SI TOMÉ MÁS DE LA CANTIDAD NECESARIA?
Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.
Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez Tel.: (011) 4962-6666/2247.
Hospital Alejandro Posadas Tel.: (011) 4658-7777 / 4654-6648.
Centro de Asistencia Toxicológica La Plata Tel.: (0221) 451-5555.

¿TIENE UD. ALGUNA PREGUNTA?
LABORATORIOS FECOFAR Tel: 4482-5517 / 5522.
ANMAT responde: 0800-333-1234

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O A SU FARMACÉUTICO.

MODO DE CONSERVACIÓN:
Conservar en su envase original y no almacenar a temperatura superior a 30°C.

Medicamento libre de gluten.

NOTIFICACIONES DE SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS:
Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento.

PRESENTACIONES:
Envases por 120 ml.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 46.672
Dirección Técnica: Sergio A. Minguila - Farmacéutico.
Fecha de última revisión: 06/18

Laboratorios Fecofar
Av. Pte. J. D. Perón 2742 - B1754AZV - San Justo
Prov. de Buenos Aires.

FECOFAR
El valor de nuestra marca

41707-07

Una vez consumido el contenido y/o cumplida la fecha de vencimiento del producto, desechar en forma responsable.
Cuidar el medioambiente es una responsabilidad de todos.