ALIVIA LOS SÍNTOMAS DE LA GRIPE

# Duflegrip Free

**Paracetamol + Fenilefrina**

ANTIGRIPAL | ANTIFEBRIL | DESCONGESTIVO | ANALGÉSICO

escanear

**20** | Comprimidos recubiertos
Venta Libre




**LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO.**

## ¿QUÉ CONTIENE DUFLEGRIP FREE?

Cada comprimido recubierto contiene:

| | |
|---|---|
| Paracetamol (Como Paracetamol $CD_{90}$) | 500,00 mg |
| Fenilefrina Clorhidrato | 6,00 mg |

Excipientes: Correspondientes al Paracetamol $CD_{90}$ (Povidona, Almidón, Almidón Glicolato de Sodio, Almidón Pregelatinizado, Acido Esteárico, Propil hidroxibenzoato de Sodio, Etil hidroxibenzoato de Sodio); Cellactose 80, Croscaramelosa sódica, Estearato de magnesio, Opadry II blanco, Sacarina sódica, Laca alumínica amarillo de quinolina.

## ACCIONES:

Descongestivo, antifebril y analgésico.

## ¿PARA QUÉ SE USA?

Duflegrip Free está indicado para el alivio de congestión nasal, fiebre y dolor de cabeza asociado al cuadro gripal.

## CÓMO USAR ESTE MEDICAMENTO:

**Adultos y Niños mayores de 12 años: 1 comprimido cada 6 u 8 horas.**
**Dosis máxima de Paracetamol: 4 g/día (8 comprimidos conteniendo 500 mg de Paracetamol).**
**Niños menores de 12 años: consulte con su médico.**
**No exceder las dosis aconsejadas. Si los síntomas (fiebre, dolor o congestión nasal) persisten o empeoran consulte a su médico.**
Especialidad medicinal de administración oral. Ingerir el comprimido con suficiente agua o jugo, sin ser masticado. Su administración puede realizarse con las comidas o alejado de las mismas.

## ¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR DUFLEGRIP FREE?:

**No utilice este producto si tiene alergia a alguno de los componentes de la fórmula.**
**Paracetamol: No debe iniciarse el tratamiento en pacientes a quienes la aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios les producen asma, rinitis, urticaria o reacciones alérgicas severas. Ulcera péptica activa. Antecedentes de úlcera recurrente. El producto no puede ser administrado en caso de enfermedad hepática, hepatitis virales, trastornos renales o alcoholismo.**
**Si sufre hipertiroidismo, glaucoma, si está o ha estado en los 20 días anteriores a la toma de este medicamento en tratamiento con medicamentos usados en el tratamiento de la depresión y/o enfermedad de parkinson (IMAOs). Si padece insuficiencia renal o hepática, si padece enfermedad cardíaca o hipertensión arterial severa, si esta embarazada o en período de lactancia.**

## ¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

No exceder la dosis recomendada, dado que a posologías superiores puede producir nerviosismo, insomnios o mareos. Personas con diabetes, hipertiroidismo, enfermedades prostáticas o estando bajo la ingesta de antidepresivos deberán consultar a su médico.
Si los síntomas perduran por más de 5 días, o la fiebre persiste por más de 3 días, consulte a su médico.
Este producto debe ser administrado con precaución a los pacientes con antecedentes de enfermedades del tracto digestivo superior, por la posibilidad de gastritis, úlcera péptica o sangrado gastrointestinal.
El Paracetamol puede producir daño hepático cuando se ingiere en sobredosis. La ingesta del paracetamol puede alterar ciertas pruebas de laboratorio, análisis de sangre fundamentalmente. Si usted consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica consulte a su médico antes de tomar este medicamento.
No ingiera otra especialidad medicinal que contenga paracetamol conjuntamente con este producto.
Si usted está tomando algún medicamento por alguna enfermedad crónica, consulte a su médico antes de ingerir este producto.
Si Ud. está tomando algún medicamento, está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

**Si usted toma al mismo tiempo:** anticoagulantes, antiinflamatorios, anticonvulsivos o medicación para la epilepsia, anticonceptivos orales, antibióticos, diuréticos, antiespasmódicos, antinauseosos, medicación para el corazón, otros descongestivos por vía oral, oftálmicos o colocados en las fosas nasales, medicamentos para la depresión o para dolores neuropáticos. Consulte a su médico antes de ingerir este producto.

## ¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Puede aparecer efectos no deseados causados por el medicamento como: erupciones cutáneas, alteraciones en la sangre (disminución de plaquetas), náuseas, vómitos y malestar gástrico.

## ¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Vaya al Hospital más cercano ó comunicarse con los Centros de Toxicología:
Hospital de Pediatría R. Gutiérrez: (011) 4962-6666 ó (011) 4962-2247.
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 ó (011) 4658-7777.

## PRESENTACIONES:

Envases por 20 comprimidos recubiertos.

LEA ATENTAMENTE EL PROSPECTO Y ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.
CONSERVAR EN LUGAR FRESCO Y SECO, AL ABRIGO DE LA LUZ.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
MEDICAMENTO LIBRE DE GLUTEN.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 56.445

Director Técnico: Sergio A. Minguila, Farmacéutico.
Fecha de última revisión: 01/13

**Laboratorios Fecofar**
Av. Pte. J. D. Perón 2742 (B1754AZV) San Justo, Pcia. de Buenos Aires.

FECOFAR
El valor de nuestra marca

Una vez consumido el contenido y/o cumplida la fecha de vencimiento del producto, desechar en forma responsable.
**Cuidar el medioambiente es una responsabilidad de todos.**