Eso Ivestron 20

Esomeprazol 20 mg

CAPSULAS CON MICROGRANULOS
GASTRORRESISTENTES
Venta Libre

PROSPECTO PARA EL USUARIO

Industria Argentina

FECOFAR

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO:
Este prospecto contiene información que puede serle útil para volver a leer.
Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aparece cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, consulte a su médico y/o farmacéutico.

¿QUÉ CONTIENE ESO IVESTRON 20?
Fórmula/ Principio activo: Esomeprazol 20 mg
Ingredientes inactivos (excipientes): Dióxido de Titanio 0,722 mg; Gelatina 33,157 mg; Colorante Rojo Eritrosina (C.I. 45430) 0,048 mg; Colorante Amarillo Ocaso (C.I. 15985) 0,061 mg; Azúcar 36,7335 mg; Sacarosa 3,556 mg; Oxido de Magnesio 1,778 mg; Polisorbato 80 2,2225 mg; Hidroxipropilmetilcelulosa 9,3345 mg; Trietilcitrato 0,5334 mg; Manitol 2,667 mg; Hidróxido de sodio 0,0267 mg; Talco 0,889 mg; Dióxido de Titanio 0,889 mg; Copolimero de Ácido Metacrílico 8,001 mg.

ACCIÓN:
ESO IVESTRON 20 contiene un principio activo llamado Esomeprazol, que pertenece a un grupo de medicamentos llamados "inhibidores de la bomba de protones". Estos funcionan reduciendo la cantidad de ácido que produce el estómago.

¿PARA QUÉ SE USA ESO IVESTRON 20?
Se utiliza para el alivio a corto plazo de los síntomas de ardor, acidez o regurgitación ácida (reflujo) en adultos mayores de 18 años.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR ESO IVESTRON 20?
No tome este medicamento si Ud. tiene alergia conocida a alguno de los componentes de la fórmula.
Si es menor de 18 años de edad.
No debe utilizar si padece acidez ocasional ni aquellas personas que necesiten un alivio inmediato de la acidez.
No debe utilizar si Ud. presenta acidez con mareos o transpiración.

¿QUÉ CUIDADOS DEBE TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?
Consulte con su médico si:
• Tiene dificultad o dolor al tragar la comida.
• Tiene vómitos reiterados, aparición de sangre en el vómito o en las deposiciones.
• Tiene diarrea prolongada o que no mejora.
• Tiene acidez desde hace más de tres meses.
• Tiene acidez con mareos o transpiración.
• Tiene dolor de pecho frecuente y hombros con dificultad para respirar, dolor que se propaga a brazos y cuello.
• Tiene dificultad para respirar, particularmente acompañada de acidez.
• Sufre pérdida de peso inexplicable.
• Tiene dolor de estómago, náuseas o vómitos.
• Sufre trastornos renales y/o hepático.

Dado que los síntomas mencionados pueden deberse a una condición clínica seria, que requiera diagnóstico y tratamiento médico.
Si toma durante períodos más largos, es posible que se produzcan riesgos adicionales como: disminución de los niveles de magnesio en sangre (síntomas posibles: fatiga, contracciones musculares involuntarias, desorientación, convulsiones, mareo, aumento del ritmo cardíaco). Además, niveles bajos de potasio y calcio en sangre.
Debe consultar a su médico si ha estado tomando este medicamento por más de 4 semanas. Su médico decidirá realizar análisis de sangre periódicos para controlar los niveles de magnesio.

Si Ud. está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando el pecho a su bebe, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBE TENER MIENTRAS ESTÁ TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?
Si se presenta algunos de los efectos indeseados, consulte inmediatamente a su médico, ya que puede ser necesario suspender la toma del medicamento.
Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento como dolor de cabeza, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, constipación, gases, somnolencia, insomnio, sensación de hormigueo, trastornos renales.
Si aparece erupción cutánea, especialmente en zonas de la piel expuestas al sol.
Debe consultar a su médico si Ud. toma al mismo tiempo otros medicamentos como:
• Naproxeno asociado a Esomeprazol puede provocar trastornos renales graves (nefritis tubulointersticial aguda que puede evolucionar a insuficiencia renal.
• Ketoconazol, Itraconazol (medicamentos contra las infecciones producidas por hongos);
• Warfarina o Clopidogrel (medicamentos utilizados como anticoagulantes);
• Diazepam (medicamento sedante)
• Digoxina (medicamento para el corazón)
• Teofilina (medicamento broncodilatador)
• Tacrolimus o ciclosporina (medicamentos inmunosupresores)
• Antirretrovirales tales como Nelfinavir, Atazanavir (medicamentos para la infección VIHSIDA)
• Fenitoína (medicamento antiepiléptico).
Ya que los medicamentos mencionados pueden interferir con el Esomeprazol.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?
Antes de cada toma verifique en el estuche y en su contenido (blister), que el nombre comercial completo, lote y fecha de vencimiento sean coincidentes.
Es de administración vía oral en adultos mayores de 18 años.

Cuando y como tomar este medicamento:
Tome una cápsula con un vaso de agua antes de desayunar, por la mañana, todos los días durante 14 días.
No rompa ni mastique las cápsulas.

Cuanto tomar:
No exceda la dosis de una cápsula diaria sin consultar a su médico.
Es posible que deba tomar las cápsulas durante 2 o 3 días seguidos antes de que mejoren los síntomas de reflujo (por ejemplo: ardor de estómago y regurgitación ácida).
Cuando sus síntomas de reflujo hayan desaparecido por completo, debe dejar de tomar este medicamento.

No tome por más de 14 días sin consulta médica.
Si los síntomas de ardor, acidez o regurgitación ácida (reflujo) empeoran o no mejoran después de tomar este medicamento durante 14 días seguidos, debe consultar a un médico.

No se debe tomar Esomeprazol como medicación preventiva.
El uso prolongado puede producir otros efectos adversos importantes.

¿QUÉ DEBO HACER SI OLVIDÉ TOMAR UNA DOSIS?
Si usted olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde, en el mismo día. No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?
Si usted toma más ESO IVESTRON de lo recomendado, puede experimentar síntomas como diarrea, dolor de panza, estreñimiento, náuseas o vómitos y debilidad, en ese caso consulte inmediatamente con su médico.

ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN CONCURRIR AL HOSPITAL MAS CERCANO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez:
0800 444 8694/(011)4962-6666 / 2247

Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas:
(011) 4654-6648 / 4658-7777

Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández:
(011) 4808-2655 / 4801-7767

Optativamente otros centros de intoxicaciones.

¿TIENE UD. ALGUNA PREGUNTA?
Puede comunicarse con Fecofar a los teléfonos
011-4482-5483/93/22/49.
Mail: contacto@fecofar.com.ar
ANMAT Responde: 0800 333 1234

¿CÓMO CONSERVAR ESTE MEDICAMENTO?
Conservar a temperatura ambiente entre 15ºC y 30ºC.
Las cápsulas son afectadas por la humedad, por lo que deben mantenerse en el envase original.

PRESENTACIONES:
Envases conteniendo 15, 30, y 60 cápsulas, siendo estas dos últimas de uso hospitalario exclusivo.

Dispenser de 150 cápsulas (en 10 blísteres de 15 cápsulas cada uno) acompañado cada unidad de blíster por su prospecto para ser comercializado en Farmacias.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 59.791.
Director Técnico: Sergio A.Minguila - Farmacéutico.
Elaborado en: Casella Piñero 361, Sarandí, Pcia. de Buenos Aires.
Fecha de última revisión: 09/2025

Laboratorios Fecofar
Av. Pte. J. D. Perón 2742, B1754AZV - San Justo - Pcia. de Bs. As.

41794-00

FECOFAR
El valor de nuestra marca

Una vez consumido el contenido y/o cumplida la fecha de vencimiento del producto, desechar en forma responsable.
Cuidar el medioambiente es una responsabilidad de todos.