Ibufec
Ibuprofeno 400 mg

Dolor leve a moderado
Inflamación
Fiebre

ANALGÉSICO • ANTIINFLAMATORIO • ANTIFEBRIL

liberación inmediata

Comprimidos
Venta Libre
Industria Argentina

alivio por 8 hs

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

¿QUÉ CONTIENE IBUFEC 400?
Cada comprimido contiene: Ingrediente activo: Ibuprofeno (como Ibuprofeno CD 90) 400,00 mg. Ingredientes inactivos: Celulosa microcristalina pH 101, Croscarmelosa sódica, Aerosil 200, Estearato de magnesio.

ACCIONES:
Analgésico (calma el dolor) - Antifebril (baja la fiebre) – Antiinflamatorio (reduce la inflamación).

¿PARA QUÉ SE USA IBUFEC 400?
Este medicamento está indicado para el alivio sintomático de dolores (menstruales, de espalda, de cabeza, musculares, de dientes), dolores asociados a estados gripales y para bajar la fiebre.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR IBUFEC 400?
No use este medicamento si: es alérgico al ibuprofeno, aspirina, a otros antiinflamatorios similares o a otros ingredientes del producto.
Tiene o ha tenido úlcera en el estómago, perforación o sangrado .del estómago.
Está tomando otros productos conteniendo ibuprofeno u otros antiinflamatorios, incluyendo los inhibidores de la COX-2.
Padece enfermedad del hígado, riñones o corazón.
Menores de 12 años.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?
Debe ser tomada la menor dosis por el período de tiempo más corto necesario para aliviar sus síntomas.
Tenga especial precaución y consulte con su médico antes de tomar este medicamento si: - Es mayor de 65 años.- Tiene asma o alergia; presión arterial alta; ciertos problemas circulatorios; problemas de estómago o ha tenido recientemente una cirugía de estómago.
Si usted padece problemas intestinales como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn o padece una enfermedad mixta del tejido conectivo ejemplo lupus eritematoso sistémico.
Si usted recibe algún otro medicamento, o está intentando quedar embarazada, está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?
Suspenda su uso y consulte a su médico inmediatamente si Usted:
- Presenta alergias como erupción en la piel y picazón, que puede acompañarse de problemas respiratorios o hinchazón de los labios, lengua, garganta o cara; erupción en la piel o descamación, o úlceras en la boca: empeoramiento de su asma; moretones o sangrado inusual, fiebre, dolor de garganta, úlceras en la boca, palidez extrema o debilidad, problemas de hígado incluyendo ictericia (los síntomas pueden incluir coloración amarillenta en piel y ojos).
- Desarrolla úlcera en el estómago, vomita sangre o arenilla marrón (como borra de café) o tiene materia fecal negra.
- Empeora una enfermedad intestinal preexistente como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn.
Si Usted consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Hable con su médico o farmacéutico sí:
- Usted tiene una infección (por favor lea bajo del subtítulo "Infecciones").
Infecciones:
IBUFEC 400 puede esconder los signos de infecciones como la fiebre y el dolor. Por lo tanto es posible que IBUFEC 400 pueda retrasar el tratamiento para la infección, lo que puede llevar a un aumento del riesgo de complicaciones. Esto se ha observado en neumonía causada por bacterias o infecciones bacterianas de la piel relacionadas a la varicela. Si usted toma este medicamento mientras sufre una infección y los síntomas infecciosos persisten o empeoran, consulte a su médico sin demora.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?
Antes de cada toma verifique en el estuche y en su contenido (blister), que el nombre comercial, lote y fecha de vencimiento sean coincidentes.
Vía de administración oral. Adultos y mayores de 12 años: 1 comprimido cada 8 horas.
Mientras los síntomas persistan, el intervalo mínimo entre dosis puede ser de 4 horas, sin exceder la dosis máxima de 3 comprimidos de 400 mg (1200 mg l día).
Tomar preferentemente después de las comidas. No tomar por más de 5 días para el dolor o 3 para la fiebre. Sí los síntomas persisten o empeoran por más de 48 - 72 hs consulte a su médico. No usar en niños menores a 12 años.
Debería usar la menor dosis efectiva por el tiempo más corto que sea necesario para aliviar los síntomas. Si usted tiene infección, consulte a un médico sin demora si los síntomas (como fiebre y dolor) persisten o empeoran.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?
Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez
Tel.: (011) 4962-6666/2247.
Hospital Dr. A. Posadas Tel.:
(011) 4654-6648 / 4658-7777.
Centro de Asistencia Toxicológica La Plata
Tel.: (0221) 451-5555.

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?
LABORATORIOS FECOFAR Tel.: 4482-5517 / 5522. ANMAT responde 0800-333-1234.

ESTE MEDICAMENTO, COMO CUALQUIER OTRO DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO YIO FARMACÉUTICO.

Conservar a temperatura menor a 30ºC.

NO USAR SI LA LÁMINA QUE PROTEGE A LOS COMPRIMIDOS NO ESTÁ INTACTA.

PRESENTACIONES:
Envases conteniendo 20 comprimidos.
Envases para uso hospitalario exclusivo (UHE) conteniendo 500 comprimidos.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 40.855. Director Técnico: Sergio A. Minguila - Farmacéutico.
Fecha última revisión: 01/2022

Laboratorios Fecofar
Av. Pte. J. D. Perón 2742 - B1754AZV - San Justo
Prov. de Buenos Aires.

FECOFAR
El valor de nuestra marca

Una vez consumido el contenido y/o cumplida la fecha de vencimiento del producto, desechar en forma responsable.
Cuidar el medioambiente es una responsabilidad de todos.