Ibufec 600

Ibuprofeno 600 mg

Dolor leve a moderado
Inflamación
Fiebre

ANALGÉSICO • ANTIINFLAMATORIO • ANTIFEBRIL



liberación inmediata

Comprimidos
Venta Bajo Receta
Industria Argentina

alivio por 8 hs

escanear

Venta bajo receta • Industria Argentina

Fórmula:
Cada comprimido contiene:

Ibuprofeno CD 90	666,00	mg
(corresponde a Ibuprofeno 600 mg, Almidón de maíz 33,33mg, Estearato de magnesio 33,33mg)		
Celulosa microcristalina pH101	55,78	mg
Almidón Glicolato de Sodio	23,52	mg
Aerosil	5,70	mg
Estearato de Magnesio	5,00	mg

Acción terapéutica
Antiinflamatorio, analgésico, antipirético.

Indicaciones
Tratamiento del dolor medio a moderado. Procesos inflamatorios. Cefaleas. Lumbociática u otros síntomas radiculares. Dolores traumáticos y reumáticos. Neuralgias incluída neuralgia herpética. Mialgias. Gota aguda. Parotiditis. Otitis. Mastoiditis. Sinusitis. Odontalgias. Dismenorrea. Mastitis. Dolor post-parto. Dolor post-operatorio, dolor post-episotomía. Cuadros febriles.Dolor secundario a enfermedad neoplásica. Dolor por neuropatía. Dolores músculo-esqueléticos crónicos. Periartritis escápulohumeral. Espondilitis anquilosante. Discopatías. Artritis reumatoidea, artrosis (osteoartritis) y otras enfermedades del tejido conectivo. Enfermedad de Paget.

Propiedades farmacológicas
El Ibuprofeno es un antinflamatorio no esteroide que actúa inhibiendo la síntesis de prostaglandinas. Controla el dolor y la inflamación asociándose con menores efectos gastrintestinales. Esta droga ha demostrado clínicamente tener también propiedades analgésicas y antifebriles.

Farmacocinética:
Los niveles séricos de ibuprofeno se alcanzan 1 a 2 horas luego de la administración oral. Estas no cambian con el ayuno. Las comidas pueden disminuir levemente la biodisponibilidad de la droga cuando ésta no se administra inmediatamente después de las comidas. Los antiácidos no alteran la absorción de ibuprofeno. La vida media media del ibuprofeno es de 1,8 a 2,0 horas. Se metaboliza rapidamente y se elimina por orina.1% libre y 14 % conjugado. La dosis completa se elimina a las 24 horas de la ingesta.

POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACION:
Antes de cada toma verifique en el estuche y en su contenido (blister), que el nombre comercial, lote y fecha de vencimiento sean coincidentes.
Dolor moderado a medio: 1 comprimido (600 mg) cada 6 u 8 horas.
Dosis de mantenimiento: 1 comprimido (600 mg) cada 12 horas. No exceder los 3200 mg diarios.
Dismenorrea: Comenzando desde el inicio del dolor, 1 comprimido (600 mg) cada 6 horas
Liberación de síntomas de osteoartritis y patologías reumáticas: 1200 a 3200 mg diarios.
Debería utilizarse la dosis efectiva más baja por el menor período de tiempo necesario para el alivio de síntomas.

Contraindicaciones
Alergia al Ibuprofeno, ácido acetilsalicílico u otros analgésicos antiinflamatorios. Últimos 3 meses de embarazo, salvo que sea por indicado por el médico, dado que puede causar problemas en el feto o complicaciones durante el parto.

Precauciones
Aunque el ibuprofeno tiene las mismas indicaciones que el ácido acetilsalicílico y el paracetamol no deben administrarse juntos excepto bajo supervisión médica. Se aconseja no administrar a pacientes con úlcera gástrica o duodenal, enfermedades del hígado o riñón, hipertensión arterial y/o insuficiencia cardíaca.

Advertencias:
Se aconseja no administrar este medicamento a pacientes con antecedentes de úlcera péptica o hemorragia digestiva.
Administrar sólo si es necesario a pacientes con deterioro de la función renal, extremando los cuidados.
Este medicamento puede producir náuseas, acidez, trombocitopenia y reacciones de hipersensibilidad (erupción, prurito, urticaria).
Enmascaramiento de síntomas de infecciones subyacentes:
IBUFEC 600 puede enmascarar síntomas de infección, lo que puede llevar a un retraso en el inicio del tratamiento apropiado y de este modo al empeoramiento de las consecuencias de una infección. Esto ha sido observado en la neumonía adquirida en la comunidad (NAC) bacteriana y complicaciones bacterianas de la varicela. Cuando IBUFEC 600 se administra para la fiebre o el alivio del dolor relacionadas a una infección, se aconseja el monitoreo de dicha infección. En una situación extrahospitalaria, el paciente debería consultar a un médico si los síntomas persisten o empeoran.

Interacciones medicamentosas:
Pueden producirse interacciones medicamentosas con:
Anticoagulantes orales y heparina aumentando el riesgo de hemorragia.
Litio, aumentando el nivel sérico de este elemento así como una disminución de su depuración renal.
Diuréticos, reduciendo el efecto natriurético de la furosemida y de las tiazidas.
Otros AINEs, potenciando lo efectos adversos propios de este tipo de medicamentos.
Metrotexato, disminuyendo la eliminación renal de esta droga y aumentando el nivel plasmático y consecuentemente el riesgo de toxicidad.

Efectos colaterales:
El efecto adverso más frecuente son los trastornos gastrointestinales. Por sobredosis puede producir: desórdenes gastrointestinales como náuseas, vómitos, dolor epigástrico, dolor abdominal, calambres abdominales, trastornos de la sangre (anemia, trombocitopenia), reacciones dermatológicas de hipersensibilidad (erupción, prurito, urticaria), dolores de cabeza, mareos, retención de líquidos, edema, sequedad de boca y ojos, úlcera gingival, rinitis.

Sobredosis:
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología : Hospital de Pediatría Ricardo Gutierrez: (011) 4962-6666 / 2247. Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / (011)-4658-7777.

Presentación:
Envases con 10, 20 y 100 comprimidos.

Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar en lugar fresco y seco, a temperaturas menores de 25ºC.
E.M.A.M.S .Certificado Nº 40.855
Director Técnico: Sergio A. Minguila - Farmacéutico. Fecha de última revisión: 01/2022

Laboratorios Fecofar
Av. Pte. J. D. Perón 2742 (B1754AZV) San Justo, Pcia. de Buenos Aires.

FECOFAR
El valor de nuestra marca

Una vez consumido el contenido y/o cumplida la fecha de vencimiento del producto, desechar en forma responsable.
Cuidar el medioambiente es una responsabilidad de todos.