Iglodine Gel

Diclofenac

GEL

PROSPECTO

Venta bajo receta
Industria Argentina

FECOFAR

Fórmula cuali-cuantitativa:
Cada 100 gr. del gel contienen: Diclofenac Dietilamino 1,16 g; Alcohol isopropílico 5,00 g; Propilenglicol 5,00 g; Vaselina líquida 2,50 g; Triglicéridos de cadena media 2,50 g; Carbomer 940 0,70 g; Imidourea 0,50 g; Cera autoemulsionable no iónica 2,00 g; Aroma 0,04 g; Dietilamina 0,30 g; Agua purificada c.s.p. 100,00 g.

Acción terapéutica:
Analgésico, antiinflamatorio.

Código ATC: m01ab

Propiedades/Efectos:
Diclofenac contiene un principio activo no esteroide, que tiene destacadas propiedades antirreumáticas, antiinflamatorias, analgésicas y antipiréticas. La inhibición de la biosíntesis de las prostaglandinas contribuyen de manera esencial al desarrollo de la inflamación, de los dolores y de la fiebre.
Las propiedades antiinflamatorias y analgésicas del producto se manifiestan clínicamente en las afecciones reumáticas a través de la mejoría neta de los trastornos como por ejemplo dolores en reposo, dolores durante la movilización, rigidez matinal, inflamación articular, como asimismo a través de la mejoría de la capacitación funcional.
En tratamientos breves de las siguientes afecciones agudas: procesos inflamatorios postraumáticos, reumatismo extraarticular.

Farmacocinética

Distribución
La administración repetida no ocasiona acumulación de Diclofenac en plasma, siempre que se respete el intervalo posológico recomendado. El Diclofenac se une en un 97% a las proteínas séricas y principalmente a la albúmina (99,4%).
El diclofenac penetra en el líquido sinovial. Las concentraciones más elevadas se calculan 2,4 horas después de obtener las concentraciones plasmáticas máximas. La vida media de eliminación aparente del líquido sinovial es de 3 a 6 horas. Por ello las concentraciones del principio activo son más elevadas en el líquido sinovial a partir de las 4 a 6 horas después de la administración que en plasma y se mantienen a tasas más altas durante una duración que va hasta 12 horas.

Eliminación
El principio activo se elimina del plasma con una clearance sistémico de 263 ml/min +- (media +- tipo de desviación). La vida media terminal es de 1 a 2 horas. Aproximadamente el 60% de la dosis administrada se elimina por vía renal en forma de metabolitos y menos del 1% en forma del producto no modificado. La fracción restante de las dosis se excreta en forma de metabolitos por intermedio de la bilis en heces.

Cinética en situaciones clínicas particulares
Se han observado diferencias importantes desde el punto de vista de la absorción.

Metabolización y eliminación, unidas a la edad de los pacientes
Cuando el clearence de la creatinina es inferior a 10 ml/min, las concentraciones plasmáticas teóricas de los friccionar con suavidad 3 ó 4 veces al día.

Contraindicaciones
Hipersensibilidad al Diclofenac. Al igual que otros agentes antiinflamatorios no esteroides, está contraindicado en pacientes a quienes el ácido acetil salicílico y otros agentes inhibidores de la prostaglandina sintetasa desencadene ataques de anemia, urticaria o rinitis aguda.

Precauciones y advertencias
Se recomienda su no prescripción durante el período de embarazo. No administrar sobre todo en el tercer trimestre del embarazo, (por posible inhibición de las contracciones uterinas y cierre del ducto arterioso). Aplicar únicamente sobre piel intacta. Evitar el contacto con los ojos o mucosas.

Reacciones adversas:
Dermatológicas: rash o erupción cutánea. Reacciones de hipersensibilidad en casos aislados.

Sobredosis:
Ante la eventualidad de una sobredosis, concurrir a los siguientes centros toxicológicos:

Hospital de Pediatría: Ricardo Gutiérrez:
(011) 4962-6666 / 2247.

Hospital Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

Casa Cuna: (011) 4300-2115.

Presentación:
Pomos con 50 gr. de gel.

Conservación:
Mantener en su envase original a temperatura ambiente (15 y 35°C)

Mantener fuera del alcance de los niños.

Medicamento libre de gluten.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 50.439
Director Técnico: Sergio A. Minguila, Farmacéutico.
Fecha de última revisión: 08/02.

Laboratorios Fecofar
Av. Pte. J. D. Perón 2742 (B1754AZV)
San Justo, Pcia. de Buenos Aires.

FECOFAR
El valor de nuestra marca

Una vez consumido el contenido y/o cumplida la fecha de vencimiento del producto, desechar en forma responsable.
Cuidar el medioambiente es una responsabilidad de todos.