Ivestron
Omeprazol 20 mg

CÁPSULAS
Venta Libre

INHIBIDOR DE LA ACIDEZ GÁSTRICA

FECOFAR

Industria Argentina

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO:
Este prospecto contiene información que puede serle útil para volver a leer.
Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aparece cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, consulte a su médico y/o farmacéutico.

¿QUÉ CONTIENE IVESTRON?
Fórmula/ Principio activo: Omeprazol micronizado 20 mg
Ingredientes inactivos (excipientes): Azúcar pellets; Azúcar grado farmacéutico; Fosfato Disódico; Lauril Sulfato de Sodio; Almidón; Manitol; Metil parabeno sódico; Propil parabeno sódico; Crospovidona; Polivinilpirrolidona (PVPK30); Hidroxipropilmetilcelulosa E5; Acido Metacrílico; Dióxido de Titanio; Talco; Polietilenglicol (PEG); Hidróxido de sodio; Polisorbato 80 (Tween 80); Cápsula de gelatina dura Nº 2: Agua purificada; Azul Brillante; Tartrazina; Dióxido de titanio; Gelatina.

ACCIÓN:
Reduce la producción de ácido estomacal.

¿PARA QUÉ SE USA IVESTRON?
Se utiliza para el alivio a corto plazo de los síntomas de ardor / acidez o regurgitación ácida (reflujo) en adultos mayores de 18 años.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR OMEPRAZOL?
No tome este medicamento si Ud. tiene alergia conocida a alguno de los componentes de la fórmula.
No administrar en menores de 18 años de edad.
No debe utilizar quien padezca de acidez ocasional ni para el alivio inmediato de la acidez.
No debe utilizar si Ud. presenta acidez con mareos o transpiración.

¿QUÉ CUIDADOS DEBE TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?
Consulte con su médico si:
• Tiene dificultad o dolor al tragar la comida.
• Tiene vómitos reiterados, aparición de sangre en el vómito o en las deposiciones.
• Tiene diarrea prolongada o que no mejora.
• Acidez desde hace más de tres meses.
• Acidez con mareos o transpiración.
• Dolor de pecho frecuente y hombros con dificultad para respirar, dolor que se propaga a brazos y cuello.
• Dificultad para respirar, particularmente acompañada de acidez.
• Pérdida de peso inexplicable.
• Dolor de estómago, náuseas o vómitos.
• Trastornos renales y/o hepático.

Si Ud. está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando el pecho a su bebe, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBE TENER MIENTRAS ESTÁ TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?
Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento como dolor de cabeza, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, constipación, gases, somnolencia, insomnio, sensación de hormigueo, trastornos renales.
Si aparece erupción cutánea, especialmente en zonas de la piel expuestas al sol, consulte a su médico, ya que puede ser necesario suspender la toma del medicamento.

Debe consultar a su médico si Ud. toma al mismo tiempo otros medicamentos como:
• Ketoconazol, Itraconazol (medicamentos contra las infecciones producidas por hongos);
• Warfarina o Clopidogrel (medicamentos utilizados como anticoagulantes);
• Diazepam (medicamento sedante)
• Digoxina (medicamento para el corazón)
• Teofilina (medicamento broncodilatador)
• Tacrolimus o ciclosporina (medicamentos inmunosupresores)
• Antirretrovirales tales como Nelfinavir, Atazanavir (medicamentos para la infección VIH-SIDA)
• Fenitoína (medicamento antiepiléptico).
Ya que los medicamentos mencionados pueden interferir con el Omeprazol.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?
Antes de cada toma verifique en el estuche y en su contenido (blister), que el nombre comercial completo, lote y fecha de vencimiento sean coincidentes.
Es de administración vía oral en adultos mayores de 18 años.
Tome una cápsula con un vaso de agua antes de desayunar, por la mañana, todos los días durante 14 días.
No rompa ni mastique las cápsulas.
No exceda la dosis de un comprimido diario sin consultar a su médico.
No tome por más de 14 días sin consulta médica.
Si los síntomas de ardor, acidez o regurgitación ácida (reflujo) empeoran o no mejoran después de tomar este medicamento durante 14 días seguidos, debe consultar a un médico.
No se debe tomar omeprazol como medicación preventiva.
El uso prolongado puede producir otros efectos adversos importantes.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN CONCURRIR AL HOSPITAL MAS CERCANO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA
Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez:
0800 444 8694/(011)4962-6666 / 2247
Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas:
(011) 4654-6648 / 4658-7777
Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández:
(011) 4808-2655 / 4801-7767
Optativamente otros centros de intoxicaciones.

¿TIENE UD. ALGUNA PREGUNTA?
Puede comunicarse con Fecofar a los teléfonos
011-4482-5483/93/22/49.
Mail: contacto@fecofar.com.ar
ANMAT Responde: 0800 333 1234

PRESENTACIONES:
Envases conteniendo 15 y 30 cápsulas.
Dispenser de 150 capsulas (en 10 blísteres de 15 cápsulas cada uno) acompañado cada unidad de blíster por su prospecto para ser comercializado en Farmacias.

MODO DE CONSERVACIÓN:
Conservar en lugar seco, a temperatura ambiente no mayor a 30ºC.
Las cápsulas son afectadas por la humedad, por lo que deben mantenerse en el envoltorio original.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

MEDICAMENTO LIBRE DE GLUTEN.

Verifique la fecha de vencimiento antes de tomar este o cualquier medicamento.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado Nº 55.538
Director Técnico: Sergio A. Minguila - Farmacéutico.

Fecha de última revisión: 09/2024

Laboratorios Fecofar
Av. Pte. J. D. Perón 2742,
B1754AZV - San Justo - Pcia. de Buenos Aires

FECOFAR
El valor de nuestra marca

Una vez consumido el contenido y/o cumplida la fecha de vencimiento del producto, desechar en forma responsable.
Cuidar el medioambiente es una responsabilidad de todos.

Ivestron 40
Omeprazol 40 mg

CÁPSULAS
Venta Libre (solo en farmacias)

PROSPECTO PARA EL USUARIO

FECOFAR

Industria Argentina

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO:
Este prospecto contiene información que puede serle útil para volver a leer.
Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aparece cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, consulte a su médico y/o farmacéutico.

¿QUÉ CONTIENE IVESTRON 40?
Fórmula/ Principio activo: Omeprazol 40 mg. Ingredientes inactivos (excipientes): Azúcar pellets; Azúcar grado farmacéutico; Fosfato Disódico; Lauril Sulfato de Sodio; Almidón; Manitol; Metil parabeno sódico; Propil parabeno sódico; Crospovidona; Polivinilpirrolidona (PVPK30); Hidroxipropilmetilcelulosa E5; Acido Metacrílico; Dióxido de Titanio; Talco; Polietilenglicol (PEG); Hidróxido de sodio; Polisorbato 80 (Tween 80); Carmoisina; Amarillo ocaso; Dióxido de titanio; Gelatina; Agua purificada.

ACCIÓN:
Omeprazol pertenece a un grupo de medicamentos llamados "inhibidores de la bomba de protones". Este medicamento reduce la cantidad de ácido producida por el estómago.

¿PARA QUÉ SE USA IVESTRON 40?
Se utiliza para el tratamiento previo diagnóstico médico en Adultos y mayores de 18 años:
• Enfermedad por reflujo gastroesofágico. En este trastorno, el ácido del estómago pasa al esófago (el tubo que une la garganta con el estómago), provocando dolor, inflamación y ardor.
• Úlceras en la parte superior del intestino (úlcera duodenal) o en el estómago (úlcera gástrica).
• Úlceras infectadas por una bacteria llamada "Helicobacter pylori". Si padece esta enfermedad, es posible que su médico le recete además antibióticos para tratar la infección y permitir que cicatrice la úlcera.
• Úlceras causadas por unos medicamentos denominados AINEs (antiinflamatorios no esteroideos).
• Omeprazol puede usarse además para impedir la formación de úlceras si está tomando AINEs. (antiinflamatorios no esteroideos).
• Tratamiento del Síndrome de Zollinger-Ellison. Exceso de ácido en el estómago provocado por una patología en el páncreas.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR OMEPRAZOL?
No tome este medicamento si Ud. tiene alergia al Omeprazol o a alguno de los componentes de la fórmula.
Si es alérgico a medicamentos que contengan inhibidores de la bomba de protones (ej. Pantoprazol, Lansoprazol, Rabeprazol, Esomeprazol).
Si está tomando un medicamento que contenga nelfinavir (usado para la infección por VIH).
No tome Omeprazol si se encuentra entre alguno de los casos anteriores. Si no está seguro, hable con su médico o farmacéutico antes de tomar.
No administrar en menores de 18 años de edad.
No debe utilizar quien padezca de acidez ocasional ni para el alivio inmediato de la acidez.
No debe utilizar si Ud. presenta acidez con mareos o transpiración.

¿QUÉ CUIDADOS DEBE TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?
Consulte con su médico si:
• Adelgaza mucho sin motivo aparente y tiene problemas para tragar.
• Tiene dolor de estómago o náuseas y vómitos.
• Empieza a vomitar la comida o a vomitar sangre.
• Sus deposiciones son de color negro (heces teñidas de sangre).
• Si presenta diarrea grave o persistente, ya que se ha asociado el Omeprazol a un ligero aumento de diarreas infecciosas.
• Tiene problemas de hígado graves.
• Si alguna vez ha tenido una reacción en la piel después del tratamiento con un medicamento similar a Omeprazol para reducir la acidez de estómago.
• Tiene dolor de pecho frecuente y hombros con dificultad para respirar, dolor que se propaga a brazos y cuello.
• Tiene dificultad para respirar, particularmente acompañada de acidez;
• Tiene trastornos renales y/o hepático.

Tomar Omeprazol, especialmente durante un período prolongado, puede aumentar ligeramente el riesgo de que se fracture la cadera, muñeca o columna vertebral.
Informe a su médico si tiene usted osteoporosis o si está tomando corticosteroides (que pueden aumentar el riesgo de osteoporosis).
Al tomar Omeprazol, puede producirse inflamación en el riñón. Los signos y síntomas pueden incluir disminución del volumen de orina o sangre en la orina y/o reacciones de hipersensibilidad como fiebre, erupción cutánea y rigidez articular.
Debe informar de dichos signos a su médico.
Si aparece erupción cutánea, especialmente en zonas de la piel expuestas al sol, consulte a su médico, ya que puede ser necesario suspender la toma del medicamento.

Si Ud. está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando el pecho a su bebe, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBE TENER MIENTRAS ESTÁ TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?
Informe a su médico y/o farmacéutico si está tomando algunos de los siguientes medicamentos:
• Ketoconazol, Itraconazol, posaconazol o voriconazol (usados para tratar las infecciones producidas por hongos).
• Digoxina (medicamento para el corazón).
• Diazepam (usado para tratar la ansiedad, relajar los músculos o en la epilepsia).
• Fenitoína (medicamento antiepiléptico).
• Medicamentos empleados para impedir la formación de coágulos de sangre, como warfarina u otros antagonistas de la vitamina K.
• Rifampicina (se usa para tratar la tuberculosis).
• Atazanavir y saquinavir (medicamentos para la infección VIH).
• Tacrolimus (medicamentos inmunosupresores).
• Hierba de San Juan (Hypericum perforatum, usada para tratar la depresión leve).
• Cilostazol (usado para tratar la claudicación intermitente).
• Clopidogrel (medicamentos utilizados como anticoagulantes).
• Erlotinib (usado para tratar el cáncer).
• Metotrexato (medicamento para tratar el cáncer). Si está tomando una dosis alta de metotrexato, su médico tendrá que suspender temporalmente el tratamiento con omeprazol.

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento:
• Si sufre alguno de los siguientes efectos adversos raros o muy raros pero graves, deje de tomar Omeprazol y consulte al médico inmediatamente:
• Se han notificado en relación con el tratamiento con omeprazol reacciones adversas cutáneas graves que incluyen enrojecimiento de la piel con formación de ampollas o descamación. También podrían aparecer ampollas intensas y sangrado en los labios, los ojos, la boca, la nariz y los genitales. Podría tratarse de "síndrome de Stevens-Johnson" o "necrólisis epidérmica tóxica".
• Erupción generalizada, temperatura corporal elevada e inflamación de los ganglios (síndrome DRESS o síndrome de hipersensibilidad farmacológica).
• Una erupción roja, recubiertas por pápulas, vesículas y/o ampollas que va acompañada de fiebre. (pustulosis exantemática generalizada aguda).
• Coloración amarilla de la piel, orina oscura y cansancio, que pueden ser síntomas de problemas del hígado.

Efectos adversos frecuentes:
• Dolor de cabeza.
• Diarrea, dolor de estómago, estreñimiento y gases (flatulencia).
• Náuseas o vómitos.
• Pólipos benignos en el estómago.

Efectos adversos poco frecuentes:
• Hinchazón de los pies y los tobillos.
• Trastornos del sueño (insomnio).
• Mareo, sensación de hormigueo, somnolencia.
• Sensación de que todo da vueltas (vértigo).
• Alteraciones de los análisis de sangre que sirven para comprobar el funcionamiento del hígado.
• Erupción en la piel, ronchas y picazón.
• Sensación de malestar general y falta de energía.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?
Antes de cada toma verifique en el estuche y en su contenido (blister), que el nombre comercial completo, lote y fecha de vencimiento sean coincidentes.
Es de administración vía oral en adultos mayores de 18 años.
Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento, previamente indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico y/o farmacéutico.
Tome 1 cápsula por día con alimentos o con el estómago vacío, todos los días por el tiempo indicado por su médico.
Tiempo máximo de tratamiento 4 semanas. Luego deberá consultar con su médico.
Trague las cápsulas con medio vaso de agua. No rompa ni mastique las cápsulas.
Si los síntomas empeoran o no mejoran después de tomar este medicamento durante 14 días seguidos, debe consultar a su médico.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN CONCURRIR AL HOSPITAL MAS CERCANO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA
Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez:
0800 444 8694/(011)4962-6666 / 2247
Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas:
(011) 4654-6648 / 4658-7777
Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández:
(011) 4808-2655 / 4801-7767
Optativamente otros centros de intoxicaciones.

¿TIENE UD. ALGUNA PREGUNTA?
Puede comunicarse con Fecofar a los teléfonos
011-4482-5483/93/22/49.
Mail: contacto@fecofar.com.ar
ANMAT Responde: 0800 333 1234

PRESENTACIONES:
Envases conteniendo 14 y 28 cápsulas.
Dispenser de 140 capsulas (en 10 blísteres de 14 cápsulas cada uno) acompañado cada unidad de blister por su prospecto para ser comercializado en Farmacias.

MODO DE CONSERVACIÓN:
Conservar en lugar seco, a temperatura ambiente no mayor a 30ºC.
Las cápsulas son afectadas por la humedad, por lo que deben mantenerse en el envoltorio original.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

MEDICAMENTO LIBRE DE GLUTEN.

Verifique la fecha de vencimiento antes de tomar este o cualquier medicamento.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 55.538
Director Técnico: Sergio A. Minguila - Farmacéutico.

Fecha de última revisión: 09/2024

Laboratorios Fecofar
Av. Pte. J. D. Perón 2742,
B1754AZV - San Justo - Pcia. de Buenos Aires

FECOFAR
El valor de nuestra marca

Una vez consumido el contenido y/o cumplida la fecha de vencimiento del producto, desechar en forma responsable.
Cuidar el medioambiente es una responsabilidad de todos.