Panto Ivestron 20

Pantoprazol 20 mg

INHIBIDOR DE ACIDEZ GÁSTRICA

Sin T.A.C.C.

COMPRIMIDOS RECUBIERTOS GASTRORRESISTENTES
Venta Libre

PROSPECTO PARA EL USUARIO

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO:
Este prospecto contiene información que puede serle útil para volver a leer.
Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aparece cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, consulte a su médico y/o farmacéutico inmediatamente.

¿QUÉ CONTIENE?
Fórmula / Principio activo: Pantoprazol (como Pantoprazol sódico sesquihidrato) 20 mg. Ingredientes inactivos (excipientes): Manitol; Povidona K25; Carbonato de sodio anhídrido; Crospovidona; Croscaramelosa sódica; Talco; Estearato de magnesio; HPMC 2910 15 cps; Polietilenglicol; Dióxido de Titanio; Copolimero de Acido Metacrilico Tipo C; Dióxido de Silicio Coloidal; Trietilcitrato; Bicarbonato de Sodio; Laca amarillo quinolina (CI 47005) y Laca amarillo ocaso (CI 15985).

ACCIÓN:
Reduce la producción de ácido estomacal.

¿PARA QUÉ SE USA PANTO IVESTRON 20?
Se utiliza para el alivio a corto plazo de los síntomas de ardor / acidez o regurgitación ácida (reflujo) en adultos mayores de 18 años.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR PANTO IVESTRON 20?
No tome este medicamento si Ud. tiene alergia conocida a alguno de los componentes de la fórmula.
No administrar en menores de 18 años de edad.
No debe utilizar quien padezca de acidez ocasional ni para el alivio inmediato de la acidez.
No debe utilizar si Ud. presenta acidez con mareos o transpiración.

¿QUÉ CUIDADOS DEBE TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?
Si Ud. tiene:
- Dificultad o dolor al tragar la comida
- Vómitos reiterados, aparición de sangre en el vómito o en las deposiciones
- Diarrea prolongada o que no mejora
- Acidez desde hace más de tres meses;
- Acidez con mareos o transpiración;
- Dolor de pecho u hombros con dificultad para respirar, dolor que se propaga a brazos y cuello
- Dolor de pecho frecuente;
- Dificultad para respirar, particularmente acompañada de acidez;
- Pérdida de peso inexplicable;
- Dolor de estómago, náuseas o vómitos
- Trastornos renales y/o hepáticos.
- Si toma durante períodos más largos, es posible que se produzcan riesgos adicionales como: disminución de los niveles de magnesio en sangre (síntomas posibles: fatiga, contracciones musculares involuntarias, desorientación, convulsiones, mareo, aumento del ritmo cardíaco). Además, niveles bajos de magnesio pueden producir una disminución de los niveles de potasio y calcio en sangre.

Debe consultar a su médico si ha estado tomando este medicamento durante más de 4 semanas. Su médico decidirá realizar análisis de sangre periódicos para controlar los niveles de magnesio.

Si Ud. Está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando el pecho a su bebe, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBE TENER MIENTRAS ESTÁ TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?
Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento como:
- Dolor de cabeza, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, constipación, meteorismo (gases), somnolencia, insomnio, sensación de hormigueo, trastornos renales.
- Erupción cutánea, especialmente en zonas de la piel expuestas al sol.
- No se debe tomar Pantoprazol como medicación preventiva.

Debe consultar a su médico si Ud. toma al mismo tiempo otros medicamentos como:
- Ketoconazol, Itraconazol (medicamentos contra las infecciones producidas por hongos);
- Warfarina o Clopidogrel (medicamentos utilizados como anticoagulantes);
- Diazepam (medicamento sedante)
- Digoxina (medicamento para el corazón)
- Teofilina (medicamento broncodilatador)
- Tacrolimus o ciclosporina (medicamentos inmunosupresores)
- Antirretrovirales tales como Nelfinavir, Atazanavir (medicación para la infección VIH-SIDA)
- Fenitoína (medicamento antiepiléptico).

Ya que los medicamentos mencionados pueden interferir con el Pantoprazol.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?
Antes de cada toma verifique en el estuche y en su contenido (blister), que el nombre comercial completo, lote y fecha de vencimiento sean coincidentes.

Es de administración vía oral en adultos mayores de 18 años.

Tome un comprimido con un vaso de agua antes de desayunar, por la mañana, todos los días durante 14 días.
No rompa ni mastique los comprimidos.
No exceda la dosis de un comprimido diario sin consultar a su médico.

No tome por más de 14 días sin consulta médica.
Si sus síntomas de ardor, acidez o regurgitación empeoran o no mejoran después de tomar este medicamento durante 14 días seguidos, debe consultar a un médico.

El uso prolongado puede producir otros efectos adversos importantes.
Menores de 18 años de edad deben consultar con su médico antes de tomar este medicamento.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?
ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN CONCURRIR AL HOSPITAL MAS CERCANO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA
Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez:
0800 444 8694 / (011) 4962-6666 / 2247
Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas:
(011) 4654-6648 / 4658-7777
Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández:
(011) 4808-2655 / 4801-7767
Optativamente otros centros de intoxicaciones.

¿TIENE UD. ALGUNA PREGUNTA?
Puede comunicarse con Fecofar a los teléfonos
011 4482-5483 / 93 / 22 /49
Mail: contacto@fecofar.com.ar
ANMAT Responde: 0800 333 1234

PRESENTACIONES:
Envases conteniendo 15 y 30 comprimidos recubiertos gastrorresistentes, siendo esta última de Uso Hospitalario.
Dispenser de 150 comprimidos recubiertos gastrorresistentes (en 10 blísteres de 15 comprimidos cada uno) acompañado cada unidad de blíster por su prospecto para ser comercializado en Farmacias.

MODO DE CONSERVACIÓN:
Conservar en su envase original, a temperatura ambiente (entre 15ºC y 30ºC).

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Medicamento libre de gluten.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Verifique la fecha de vencimiento antes de tomar este o cualquier medicamento.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado Nº: 59.506
Director Técnico:
Sergio A. Minguila - Farmacéutico

Fecha de última revisión: 10/2024

Laboratorios Fecofar
Av. Pte. J. D. Perón 2742 - B1754AZV,
San Justo, Prov. de Buenos Aires.

FECOFAR
El valor de nuestra marca

Una vez consumido el contenido y/o cumplida la fecha de vencimiento del producto, desechar en forma responsable.
Cuidar el medioambiente es una responsabilidad de todos.

Panto Ivestron 40

Pantoprazol 40 mg

INHIBIDOR DE ACIDEZ GÁSTRICA

Sin T.A.C.C.

COMPRIMIDOS RECUBIERTOS GASTRORRESISTENTES
Venta Libre (Solo en farmacias)

PROSPECTO PARA EL USUARIO

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO:
Este prospecto contiene información que puede serle útil para volver a leer.
Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aparece cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, consulte a su médico y/o farmacéutico.

¿QUÉ CONTIENE?
Fórmula/ Principio activo: Pantoprazol (como Pantoprazol sódico sesquihidrato) 40,00 mg.
Ingredientes inactivos (excipientes): Manitol; Povidona K25; Carbonato de sodio anhídrido; Crospovidona; Croscaramelosa sódica; Talco; Estearato de magnesio; HPMC 2910 15 cps; Polietilenglicol; Dióxido de Titanio; Copolímero de ácido Metacrílico Tipo C; Dióxido De Silicio Coloidal; Trietilcitrato; Bicarbonato de Sodio; Laca amarillo quinolina (CI 47005) y Laca amarillo ocaso (CI 15985).

ACCIÓN:
Pantoprazol pertenece a un grupo de medicamentos llamados "inhibidores de la bomba de protones".
Este medicamento reduce la cantidad de ácido producida por el estómago.

¿PARA QUÉ SE USA PANTO IVESTRON 40?
Se utiliza para el tratamiento previo diagnóstico médico en adultos y mayores de 18 años:
• Esofagitis por reflujo. Es una inflamación del esófago (el tubo que conecta la garganta con el estómago) acompañada de regurgitación del ácido desde el estómago.
• Infección de una bacteria llamada Helicobacter pylori en pacientes con úlcera de estómago y/o duodeno en combinación con dos antibióticos (tratamiento de erradicación). El objetivo es deshacerse de la bacteria y reducir así la probabilidad de reaparición de úlceras.
• Úlcera de estómago y de duodeno.
• Síndrome de Zollinger-Ellison. Exceso de ácido en el estómago provocado por una patología del páncreas.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR PANTO IVESTRON 40?
-No tome este medicamento si Ud. tiene alergia al Pantoprazol o a alguno de los componentes de la fórmula.
-Si es alérgico a medicamentos que contengan inhibidores de la bomba de protones (ej. omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, rabeprazol).
No tome PANTO IVESTRON 40 si se encuentra entre alguno de los casos anteriores.
Si no está seguro, hable con su médico o farmacéutico antes de tomar Pantoprazol.
No administrar en menores de 18 años de edad.
No debe utilizar quien padezca de acidez ocasional ni para el alivio inmediato de la acidez.
No debe utilizar si Ud. presenta acidez con mareos o transpiración.

¿QUÉ CUIDADOS DEBE TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?
Consulte a su médico:
• Si usted padece problemas graves de hígado. Su médico le realizará un seguimiento más frecuente de las enzimas hepáticas, especialmente cuando esté en tratamiento a largo plazo con Pantoprazol. En caso de
• Aspecto pálido y sensación de debilidad (anemia)
• Dolor de pecho.
• Dolor de estómago.
• Diarrea grave o persistente, ya que se ha asociado un aumento de las enzimas del hígado el tratamiento deberá interrumpirse.
• Si usted tiene disminución de vitamina B12 o factores de riesgo para ello y recibe tratamiento con Pantoprazol durante un largo periodo de tiempo se podría reducir la absorción de vitamina B12.
• Consulte a su médico si usted está tomando inhibidores de la proteasa del VIH como atazanavir (para el tratamiento por infección de VIH) al mismo tiempo que Pantoprazol.
• Tomar un inhibidor de la bomba de protones como Pantoprazol, especialmente durante más de un año puede aumentar el riesgo de fracturas de caderas, muñeca o columna vertebral. Informe a su médico si tiene osteoporosis (densidad ósea reducida) o si le han dicho que tiene riesgo de padecer osteoporosis (por ejemplo, si está tomando corticoesteroides).
• Si toma Pantoprazol durante más de tres meses, es posible que sufra una disminución de los niveles de magnesio en sangre. Los síntomas de unos niveles bajos de magnesio pueden incluir fatiga, contracciones musculares involuntarias, desorientación, mareo o aumento del ritmo cardíaco. Si tiene alguno de estos síntomas, comuníqueselo a su médico inmediatamente. Además, niveles bajos de magnesio pueden producir una disminución de los niveles de potasio y calcio en sangre. Su médico decidirá realizar análisis de sangre periódicos para controlar los niveles de magnesio.
• Si alguna vez ha tenido una reacción en la piel después del tratamiento con un medicamento similar a Pantoprazol para reducir la acidez de estómago.
• Si sufre una erupción cutánea, especialmente en zonas de la piel expuestas al sol, consulte a su médico lo antes posible, ya que puede ser necesario interrumpir el tratamiento con Pantoprazol. Recuerde mencionar cualquier otro síntoma que pueda notar, como dolor en las articulaciones.

Informe inmediatamente a su médico, antes o después de tomar este medicamento, si nota cualquiera de los siguientes síntomas, los cuales pueden ser signos de otras enfermedades más graves:

• Pérdida inintencionada de peso.
• Vómitos, particularmente si son repetidos.
• Sangre en el vómito: puede aparecer como un pulverizado de café oscuro en su vómito.
• Si nota sangre en sus heces, las cuales pueden ser en apariencia negras u oscuras.
• Dificultad para tragar, o dolor cuando traga.
pantoprazol con un pequeño aumento de la diarrea infecciosa.

Si ud. está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando el pecho a su bebe, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBE TENER MIENTRAS ESTÁ TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?
Informe a su médico o farmacéutico si está tomando alguno de los siguientes medicamentos.
• Ketoconazol, itraconazol y posaconazol (usados para tratar las infecciones producidas por hongos)
• Erlotinib (medicamento usado para tratar el cancer)
• Warfarina y fenprocumón, los cuales afectan a la mayor o menor coagulación de la sangre.
• Medicamentos utilizados para el tratamiento de la infección por VIH, como atazanavir.
• Metotrexato (utilizado para tratar la artritis reumatoide, psoriasis y cáncer).
• Fluvoxamina (utilizada para tratar la depresión y otras enfermedades psiquiátricas)
• Rifampicina (se usa para tratar la tuberculosis u otras infecciones).
• Hierba de San Juan (Hypericum perforatum, usada para tratar la depresión leve).

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento:
Si sufre alguno de los siguientes efectos adversos raros o muy raros pero graves, deje de tomar PANTO IVESTRON 40 y consulte al médico inmediatamente:
• Se han notificado en relación con el tratamiento con Pantoprazol reacciones adversas cutáneas graves que incluyen enrojecimiento de la piel con formación de ampollas o descamación. También podrían aparecer ampollas intensas y sangrado en los labios, los ojos, la boca, la nariz y los genitales. Podría tratarse de "síndrome de Stevens-Johnson" o "necrólisis epidérmica tóxica".
• Erupción generalizada, temperatura corporal elevada e inflamación de los ganglios (síndrome DRESS o síndrome de hipersensibilidad farmacológica).
• Una erupción roja, recubiertas por pápulas, vesículas y/o ampollas que va acompañada de fiebre (pustulosis exantemática generalizada aguda).
• Coloración amarilla de la piel, orina oscura y cansancio, que pueden ser síntomas de problemas del hígado.
• Reacciones alérgicas graves: hinchazón de lengua y/o garganta, dificultad para tragar, sarpullido (urticaria), dificultad para respirar, hinchazón de la cara de origen alérgico (edema de Quincke/angioedema), mareos intensos con latidos del corazón muy rápidos y sudoración abundante.

Otros efectos adversos son:
Efectos adversos frecuentes:
• Pólipos benignos en el estómago.
Efectos adversos poco frecuentes:
• Dolor de cabeza
• Vértigos
• Diarrea
• Sensación de mareo
• Vómitos
• Hinchazón y flatulencias (gases)
• Estreñimiento
• Boca seca
• Dolor y molestias en el abdomen
• Sarpullido en la piel, exantema, erupción
• Hormigueo, sensación de debilidad, de cansancio o de malestar general
• Alteraciones del sueño

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?
Antes de cada toma verifique en el estuche y en su contenido (blister), que el nombre comercial completo, lote y fecha de vencimiento sean coincidentes.
Es de administración vía oral en adultos mayores de 18 años.

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento, previamente indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico y/o farmacéutico.

Tome 1 comprimido una sola vez por día, 1 hora antes de su comida principal, todos los días por el tiempo indicado por su médico.

Tiempo máximo de tratamiento 4 semanas. Luego deberá consultar con su médico.

Trague los comprimidos con medio vaso de agua. No rompa ni mastique los comprimidos.

Si los síntomas empeoran o no mejoran después de tomar este medicamento durante 14 días seguidos, debe consultar a su médico.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?
ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN CONCURRIR AL HOSPITAL MAS CERCANO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA
Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez:
0800 444 8694 / (011) 4962-6666 / 2247
Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas:
(011) 4654-6648 / 4658-7777
Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández:
(011) 4808-2655 / 4801-7767
Optativamente otros centros de intoxicaciones.

¿TIENE UD. ALGUNA PREGUNTA?
Puede comunicarse con Fecofar a los teléfonos
011 4482-5483 / 93 / 22 /49
Mail: contacto@fecofar.com.ar
ANMAT Responde: 0800 333 1234

PRESENTACIONES:
Envases conteniendo 15 y 30 comprimidos recubiertos gastrorresistentes.
Dispenser de 150 comprimidos recubiertos gastrorresistentes (en 10 blísteres de 15 comprimidos cada uno) acompañado cada unidad de blíster por su prospecto para ser comercializado en Farmacias.

MODO DE CONSERVACIÓN:
Conservar en su envase original, a temperatura ambiente (entre 15ºC y 30ºC).

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Medicamento libre de gluten.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Verifique la fecha de vencimiento antes de tomar este o cualquier medicamento.
Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº: 59.506
Director Técnico: Sergio A. Minguila - Farmacéutico.
Fecha de última revisión: 10/2024

Laboratorios Fecofar
Av. Pte. J. D. Perón 2742 - B1754AZV,
San Justo, Prov. de Buenos Aires.

FECOFAR
El valor de nuestra marca

Una vez consumido el contenido y/o cumplida la fecha de vencimiento del producto, desechar en forma responsable.
Cuidar el medioambiente es una responsabilidad de todos.