Lefa Enteril®

Loperamida
Comprimidos

Antidiarreico

Venta Libre
Industria Argentina

Sin T.A.C.C.

FECOFAR

¿QUÉ CONTIENE LEFA ENTERIL L?
Cada comprimido contiene Loperamida Clorhidrato 2,0 miligramos, Lactosa CD, Avicel, Almidón de Maíz y Estearato de Magnesio.

USO DEL MEDICAMENTO: LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACIÓN

ACCIÓN:
Antidiarreico.

SEGURIDAD DEL ENVASE:
Los comprimidos de Lefa Enteril L se envasan en blisters garantizando de esta manera que los mismos lleguen intactos hasta Ud. Si advierte que los mismos han sido dañados o faltan dentro del envase, haga el reclamo correspondiente.

¿PARA QUÉ SE USA?
Está indicada para el alivio de la diarrea aguda no específica.
Es sumamente importante evitar la deshidratación en el tratamiento de la diarrea, por lo tanto debe beberse abundante cantidad de líquidos.
Ante cualquier duda sobre la utilización del medicamento consulte a su médico y/o farmacéutico.

¿QUIÉNES NO PUEDEN RECIBIR LEFA ENTERIL L?
• Pacientes alérgicos a alguno de los componentes de la fórmula.
• Paciente con diarreas debidas al uso de antibióticos
• Pacientes con fiebre y pérdida de sangre en las heces.
• Niños menores de 15 años, salvo indicación médica, (por sensibilidad a la acción de la Loperamida y porque puede ocultar síntomas de deshidratación).
• En casos de embarazo y/o lactancia deberá consultar con su médico.
• En pacientes con enfermedades hepáticas la dosis debe ser adecuada bajo control del médico.

¿CÓMO DEBO USAR ESTE MEDICAMENTO?
Adultos y niños mayores de 15 años
Dosis inicial: tomar una primera dosis de 2 comprimidos con agua y luego 1 comprimido después de cada deposición blanda.
No tomar más de 4 comprimidos en 24 horas.
No utilizar este medicamento durante más de 2 días consecutivos.
Si el cuadro diarreico persiste por más de 48 horas, consulte a su médico.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER AL TOMAR ESTE MEDICAMENTO?
Usar este antidiarreico por períodos breves, usualmente no mayores de 2 días. Se han notificado acontecimientos cardíacos, como prolongación del intervalo QT y torsades de pointes, asociados a sobredosis. Algunos casos tuvieron un desenlace mortal.
Los pacientes no deben superar la dosis recomendada ni la duración recomendada del tratamiento.

Si está tomando antibióticos puede empeorar la diarrea. No ingerir este medicamento en forma conjunta con analgésicos que contengan derivados opioides ya que puede producirse una constipación severa.

Los principales efectos adversos de la Loperamida son gastrointestinales: dolor epigástrico, sequedad de la boca, náuseas, vómitos, calambres abdominales y anorexia.
Sólo con el uso de dosis muy elevadas puede ocasionalmente producir distensión o dolor abdominal, constipación o mareos.
Puede provocar somnolencia por lo que es necesario tomar precauciones en personas que operen maquinarias que requieran atención.

Consulte al médico antes de iniciar el tratamiento. Si está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.
DATOS PRECLÍNICOS SOBRE SEGURIDAD
La evaluación preclínica de loperamida, tanto in vitro como in vivo, no ha mostrado efectos electrofisiológicos cardíacos importantes dentro del rango de concentraciones con interés terapéutico ni con múltiplos significativos de este rango (concentraciones hasta 47 veces mayores). Sin embargo, con concentraciones extremadamente altas asociadas a sobredosis, la loperamida tiene efectos electrofisiológicos cardíacos consistentes en inhibición de las corrientes de potasio (hERG) y sodio, y en arritmias.

¿QUÉ DEBO HACER EN CASO DE SOBREDOSIS?
Se han observado acontecimientos cardíacos, tales como la prolongación del intervalo QT, torsades de pointes, otras arritmias ventriculares graves, parada cardíaca y síncope en pacientes que ingirieron sobredosis. Se han notificado también casos mortales.
En caso de sobredosis concurrir al centro asistencial más próximo o comunicarse con el Centro de Intoxicaciones del HOSPITAL RICARDO GUTIERREZ, teléfono (011) 4962-6666 ó 4962-2247 o el Hospital A. Posadas teléfono (011) 4654-6648 / 4658-7777.

¿CÓMO DEBO ALMACENAR ESTE MEDICAMENTO?
Conservar en su envase original, entre 15º y 30ºC.

PRESENTACIONES:
Envases por 10 y 100 comprimidos.

Medicamento libre de gluten.

Mantener fuera del alcance de los niños.
LEA ATENTAMENTE EL PROSPECTO Y ANTE LA MENOR DUDA CONSULTE A SU MEDICO Y/O FARMACEUTICO.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº: 53.191
Fecha de última revisión: 11/2019
Director Técnico: Sergio A. Minguila, Farmacéutico.

Laboratorios Fecofar
Av. Pte. J. D. Perón 2742
(B1754AZV) San Justo, Pcia. de Buenos Aires.

41758-05

FECOFAR
El valor de nuestra marca

Una vez consumido el contenido y/o cumplida la fecha de vencimiento del producto, desechar en forma responsable.
Cuidar el medioambiente es una responsabilidad de todos.