Lipokemia 10 / 20 / 40

Atorvastatina 10 mg / Atorvastatina 20 mg /Atorvastatina 40 mg
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Sin T.A.C.C.

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Venta bajo receta
Industria Argentina

FECOFAR

CONSULTE A SU MÉDICO

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento.
- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarlas.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

¿Qué es LIPOKEMIA y para qué se utiliza?
LIPOKEMIA pertenece a un grupo de medicamentos denominados estatinas, que corrigen los niveles de sustancias grasas en la sangre llamadas lípidos.

Le han recetado LIPOKEMIA porque:
Tiene altos los niveles de colesterol y triglicéridos.
Le han indicado que debe tomar una estatina porque:
- Los cambios realizados en su dieta y el aumento en el ejercicio físico no han sido suficientes para corregir sus niveles lípidos como el colesterol y los triglicéridos. Debe mantener una dieta que ayude a disminuir el colesterol y debe continuar realizando ejercicio físico mientras esté en tratamiento con LIPOKEMIA.
- Presenta otros factores que aumentan el riesgo de sufrir un ataque al corazón, infarto cerebral u otros problemas relacionados de salud. El ataque al corazón, infarto cerebral y otros problemas relacionados de salud pueden estar provocados por una enfermedad denominada ateroesclerosis. La ateroesclerosis está provocada por la formación de depósitos de sustancias grasas en sus arterias.

¿Qué necesita saber antes de empezar a tomar LIPOKEMIA?
No tome LIPOKEMIA si usted:
• Es alérgico (hipersensible) a la Atorvastatina cálcica o a algún otro medicamento utilizado para reducir los lípidos sanguíneos o a cualquiera de los demás componentes de LIPOKEMIA.
• Si está embarazada o piensa que podría estar embarazada, esta planeando quedar embarazada. LIPOKEMIA puede dañar a su bebe. Si usted quedara embarazada deje de tomar LIPOKEMIA y llame al médico de inmediato.
• Si es una mujer en edad fértil y no utiliza medidas anticonceptivas adecuadas.
• Si está amamantando LIPOKEMIA puede pasar a leche materna y puede dañar a su bebé.
• Si tiene problemas de hígado.
• Si tiene problemas de riñones.

Consulte a su médico o farmacéutico si no está seguro sobre cualquiera de estos casos.

Advertencias y Precauciones
Hable con su médico o farmacéutico antes de tomar LIPOKEMIA si usted:
• Tiene problemas en los riñones moderados (si tiene dudas consulte a su médico)
• Tiene problemas en la glándula tiroides.
• Tiene dolores y calambres musculares repetidos o injustificados, si tiene antecedentes personales o familiares de problemas musculares o una historia previa de problemas musculares durante el tratamiento con otros medicamentos para disminuir los niveles de colesterol.
• Ingiere regularmente grandes cantidades de alcohol.
• Si tiene antecedentes de problemas de hígado.
• Si tiene más de 70 años.
• Insuficiencia respiratoria grave.
• Si usted está tomando o ha tomado en los últimos 7 días un medicamento que contenga ácido fusídico (utilizado para el tratamiento de infecciones bacterianas) por vía oral o por inyección. La combinación de ácido fusídico y Atorvastatina puede producir problemas musculares graves (rabdomiolisis).

Informe a su médico si presenta debilidad muscular constante. Podrían ser necesarias pruebas y medicamentos adicionales para diagnosticar y tratar este problema.

Si tiene colesterol elevado sumado a una disminución de la función de la glándula tiroides (hipotiroidismo) o problemas en los riñones (síndrome nefrótico) debe efectuarse el tratamiento de estas enfermedades antes de iniciar el tratamiento con LIPOKEMIA.

Mientras usted está tomando este medicamento, su médico controlará si tiene diabetes o riesgo de desarrollar diabetes. Este riesgo de diabetes aumenta si usted tiene altos niveles de azúcares y grasas en la sangre, sobrepeso y presión arterial alta.

En cualquiera de estos casos, su médico podrá indicarle si debe realizarse análisis de sangre antes y, posiblemente, durante el tratamiento con LIPOKEMIA para predecir el riesgo de sufrir efectos adversos relacionados con los músculos. Se sabe que el riesgo de sufrir efectos adversos relacionados con los músculos (por ejemplo rabdomiolisis) aumenta cuando se toman ciertos medicamentos al mismo tiempo.

Se han reportado casos raros de miopatía necrotizante inmunomediada durante o después del tratamiento con estatinas. La miopatía necrotizante inmunomediada se caracteriza clínicamente por debilidad muscular proximal y elevación de la creatina kinasa sérica, que persiste a pesar de la discontinuación del tratamiento con estatinas.

Uso de LIPOKEMIA con otros medicamentos
Por favor informe a su médico sobre todos los medicamentos que usted está tomando o planea tomar, incluyendo los medicamentos de prescripción y de venta libre, vitaminas, y suplementos herbarios. Algunos medicamentos pueden interactuar con la Atorvastatina, causando efectos colaterales. Es especialmente importante informar a su médico si usted esta tomando o plantea tomar medicamentos para:
• Su sistema inmunológico
• Colesterol / triglicéridos
• Anticoagulantes
• HIV / SIDA
• Evitar el embarazo
• Ciertas infecciones causadas por bacterias u hongos
• Angina de pecho o tensión arterial alta.

Si tiene que tomar ácido fusídico oral para tratar una infección bacteriana, tendrá que dejar de usar este medicamento. Su médico le indicará cuando podrá reiniciar el tratamiento con Atorvastatina. El uso de Atorvastatina con ácido fusídico puede producir debilidad muscular, sensibilidad o dolor (rabdomiolisis).
Otros medicamentos que interaccionan con Atorvastatina:
• Ezetimibe (que reduce el colesterol)
• Warfarina (que reduce la coagulación sanguínea)
• Estiripentol (anticonvulsivo para tratar la epilepsia)
• Cimetidina (utilizada para el ardor de estómago y úlcera péptica)
• Fenazona (un analgésico)
• Antiácidos (productos para la indigestión que contienen aluminio y magnesio)
• Hierva de San Juan (medicamento de venta libre)

Embarazo y lactancia
No tome LIPOKEMIA si está embarazada o en periodo de amamantamiento. Si se queda embarazada mientras esté tomando LIPOKEMIA deje de tomarlo inmediatamente e informe a su médico. Las mujeres deben evitar quedarse embarazadas durante el tratamiento con LIPOKEMIA empleando un método anticonceptivo apropiado.

Uso de maquinarias y conducción de vehículos
La mayoría de los pacientes pueden conducir vehículos y utilizar máquinas durante el tratamiento con LIPOKEMIA ya que no afectará a su capacidad. Sin embargo, algunas personas pueden sentir mareos durante el tratamiento con LIPOKEMIA. Si se encuentra mareado consulte a su médico antes de intentar conducir o usar máquinas.

¿Cómo tomar LIPOKEMIA?
Antes de cada toma verifique en el estuche y en su contenido (blister), que el nombre comercial completo, lote y fecha de vencimiento sean coincidentes.
Tome LIPOKEMIA exactamente como fuera indicado por su médico. No cambie su dosis ni suspenda LIPOKEMIA sin conversar con su médico, incluso si usted se está sintiendo bien.
Su médico puede hacerle análisis de sangre para controlar sus niveles de colesterol antes y durante el tratamiento con LIPOKEMIA.
Su dosis puede ser modificada en base a los resultados de esos análisis.
LIPOKEMIA puede tomarse en cualquier momento del día, con o sin comida. Trague los comprimidos enteros.
El médico puede comenzar con una dieta para reducir el colesterol antes de darle LIPOKEMIA. Continúe con esta dieta cuando usted toma LIPOKEMIA.
Espere por lo menos 2 horas después de tomar LIPOKEMIA para tomar un antiácido que contenga una combinación de aluminio e hidróxido de magnesio.
Pediatría: no está recomendada su administración en niños.

Dosis recomendadas:
La dosis inicial recomendada es de 10 miligramos por día.
El rango de dosificación de LIPOKEMIA es 10 a 80 miligramos una vez al día.

Tomó más LIPOKEMIA del que debería
Contacte con su médico u hospital más cercano para que le aconsejen.
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico o llame al Servicio de Información Toxicológica, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:
• Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez:
(011) 4962-6666/2247.
• Hospital A. Posadas:
(011) 4654-6648 // 4658-7777 // 0800-333-0160.
• Hospital Fernández:
(011) 4808-2655 // 4801-7767

Si ingresa en un hospital o recibe tratamiento para otra dolencia, informe al personal sanitario de que está tomando LIPOKEMIA.

Si olvidó tomar LIPOKEMIA
Si usted pierde una dosis de LIPOKEMIA, tómela tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, no tome 2 dosis de LIPOKEMIA con un intervalo menor a 12 horas.

Si interrumpe el tratamiento con LIPOKEMIA
Consulte a su médico si quiere interrumpir el tratamiento con LIPOKEMIA. Sus niveles de colesterol pueden aumentar otra vez si deja de tomar LIPOKEMIA.

¿Cuales son los posibles efectos colaterales de LIPOKEMIA?
La Atorvastatina por lo general se tolera bien. Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos colaterales, aunque no todas las personas los sufran.
Es importante que conozca cuales pueden ser estos efectos colaterales.
Su incidencia esta relacionada con la dosis, como sucede con las demás estatinas.

Los efectos colaterales más frecuentes pueden incluir:
Constipación, flatulencia (gases), trastornos de la digestión (nauseas, ardor, vómitos, pesadez) y dolor abdominal.

Los siguientes efectos colaterales han sido reportados con Atorvastatina:
Sinusitis, faringitis, neumonía, asma, epistaxis (pérdida de sangre por la nariz).
Dolor de cabeza, mareos, somnolencia, amnesia, alteraciones del sueño, disminución de la libido.
Hinchazón de los parpados, cara o labios.
Hinchazón de la lengua y la garganta que causa gran dificultad para respirar.
Reacciones de la piel que incluyen erupción cutánea intensa, enrojecimientos de la piel por todo el cuerpo, picor, formación de ampollas, descamación e inflamación de la piel u otras reacciones alérgicas.
Ataque al corazón, latido anormal del corazón.
Palpitaciones (sentirlos latidos del corazón), sofoco.
Aumento de la frecuencia urinaria, infecciones urinarias, hematuria (pérdida de sangre por la orina), impotencia, dolor al orinar, litiasis renal (caculos en la vías urinarias), aumento de la frecuencia urinaria nocturna, quiste en la mama, hemorragia vaginal, agrandamiento de la mama, metrorragia (pérdida de sangre vaginal), incontinencia urinaria, retención urinaria, eyaculación anormal.
Sequedad de ojos, alteraciones de la refracción, ojo rojo, sordera, pérdida del gusto.
Temblor, desmayos, debilidad, tortícolis, parálisis de la cara.
Alteraciones visuales, visión doble.
Alteración del hábito intestinal, diarrea, estreñimiento, indigestión (malestar), sequedad de boca, vómitos.
Disminución del número de glóbulos rojos (anemia) y blancos (leucopenia) de la sangre, disminución de plaquetas de la sangre que puede provocar sangrado fácil o moretones inusuales (daño de los glóbulos rojos).
Gota, aumento de peso, hipoglucemia (azúcar baja en sangre)
Función anormal del hígado, inflamación del hígado (hepatitis), coloración amarillenta de la piel (ictericia), aumento de enzimas hepáticas que pueden tener efecto en algunas pruebas médicas.
Aumento de la tensión y movimientos musculares (hiperkinesia).
Sensibilidad a la luz.
Trastornos combinados de rigidez, temblor y/o trastornos del movimiento.

Consulte la lista completa de eventos colaterales en el prospecto.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si padeciera cualquier efecto adverso no mencionado en esta información para el paciente, informe a su médico o farmacéutico.

Comunicación de efectos adversos:
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

Conservación de LIPOKEMIA
Conservar a temperatura ambiente entre 20 ºC y 25 ºC.

Información adicional
LIPOKEMIA 10 - Cada comprimido recubierto contiene:
Atorvastatina cálcica (equivalente a 10 mg de atorvastatina) 10,34 mg; Lactosa monohidrato; Celulosa microcristalina ph 102; Carboximetilcelulosa cálcica; Lauril sulfato de sodio; Povidona k30; Crospovidona; Dióxido de silicio coloidal; Estearato de magnesio; Hidroxipropilmetilcelulosa 2910 15; Talco; Polietilenglicol 6000; Dióxido de titanio.
LIPOKEMIA 20 - Cada comprimido recubierto con- tiene:
Atorvastatina cálcica (equivalente a 20 mg de atorvastatina) 20,68 mg; Lactosa monohidrato; Celulosa microcristalina ph 102; Carboximetilcelulosa cálcica; Lauril sulfato de sodio; Povidona k30; Crospovidona; Dióxido de silicio coloidal; Estearato de magnesio; Hidroxipropilmetilcelulosa 2910 15; Talco; Polietilenglicol 6000; Dióxido de titanio.
LIPOKEMIA 40 - Cada comprimido recubierto con- tiene:
Atorvastatina Cálcica (equivalente a 40 mg de Atorvastatina) 41,36 miligramos, Lactosa monohidrato, Celulosa microcristalina pH102, Carboximetilcelulosa cálcica, Lauril sulfato de sodio, Povidona K30, Crospovidona, Dióxido de silicio coloidal, Estearato de magnesio, Hidroxipropilmetilcelulosa 2910 15, Talco, Polietilenglicol 6000, Dióxido de titanio.

¿Dónde puedo obtener más información?
• Su médico o farmacéutico le puede dar más información acerca de LIPOKEMIA.
• Recuerde, mantenga ésta y todas las otras medicinas fuera del alcance de los niños, no comparta nunca sus medicinas con otros, y use este medicamento sólo para la condición por la que fue recetada.
"Este medicamento ha sido prescripto solo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas."

"Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT:
http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234"

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Medicamento libre de gluten.

Presentaciones:
Envases conteniendo 30 comprimidos recubiertos.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado Nº: 54.797

Director Técnico: Sergio A. Minguila - Farmacéutico.

Fecha de última revisión: 11/2024

Laboratorios Fecofar
Av. Pte. J. D. Perón 2742 - B1754AZV - San Justo - Pcia. de Buenos Aires

FECOFAR
El valor de nuestra marca

44008/01

Una vez consumido el contenido y/o cumplida la fecha de vencimiento del producto, desechar en forma responsable.
Cuidar el medioambiente es una responsabilidad de todos.