Jarabe Adultos

Pectoral Hebert N.F.

BROMHEXINA CLORHIDRATO
CLOFEDIANOL CLORHIDRATO
JARABE 100 ml
Venta Bajo Receta

Sin T.A.C.C.

INFORMACION PARA EL PACIENTE

FECOFAR

Industria Argentina
CONSULTE A SU MÉDICO

Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar a tomar este medicamento.
- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.
- Este medicamento se le ha recetado a usted sólo para su problema médico actual. No se lo recomiende a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarle.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

QUE ES PECTORAL HEBERT N.F. Y PARA QUE SE UTILIZA:
PECTORAL HEBERT N.F. es un jarabe que contiene los principios activos Bromhexina y Clofedianol.
La Bromhexina es un mucolítico (disuelve las secreciones respiratorias facilitando la expectoración) y el Clofedianol es un supresor de la tos que actúa en el sistema nervioso central.
PECTORAL HEBERT N.F. está indicado para el alivio sintomático de la tos como antitusígeno expectorante.

ANTES DE USAR PECTORAL HEBERT N.F.:
Es importante que utilice la dosis más baja que alivie la tos y no debe tomar este medicamento más tiempo del necesario para controlar sus síntomas.
Se han recibido informes de reacciones cutáneas intensas asociadas a la administración de Bromhexina. Si le aparece una erupción cutánea (incluidas lesiones de las mucosas de, por ejemplo, la boca, la garganta, la nariz, los ojos y los genitales), deje de usar PECTORALHEBERT N.F. y consulte a su médico inmediatamente.
Si es celíaco, tenga en cuenta que este medicamento no contiene derivados del trigo, avena, cebado o centeno, pero no se ha demostrado que sea apto para celíacos.
Este medicamento contiene 4 % Peso / Volumen de alcohol etílico. Basado en la presencia de alcohol etílico / etanol como excipiente se deberán tener precauciones en cuanto apersonas con enfermedad hepática, alcoholismo, epilepsia, embarazadas y niños.

No tome PECTORAL HEBERT N.F. si usted:
- es alérgico o hipersensible a alguno de sus componentes.
- es menor de 12 años.
- está bajo tratamiento con disulfiram.

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar PECTORAL HEBERT N.F. si:
- está tomando depresores del sistema nervioso central como por ejemplo bebidas que contengan alcohol.
- tiene ulcera gastroduodenal.
- padece asma, ya que puede producirse una obstrucción de las vías respiratorias acompañada de una sensación de falta de aire (si se manifiesta, interrumpir inmediatamente el tratamiento).
- padece una enfermedad severa en el hígado o en los riñones, porque pueden disminuir la eliminación del medicamento del cuerpo.
- consume supresores del apetito y/o ingiere bebidas que contengan xantinas (te, café, mate) durante el tratamiento.
- están sus pulmones produciendo mucha mucosidad (moco), ya que su uso podría provocar la retención de la misma.
- padece fibrosis quística, ya que no es efectivo para tratar esta enfermedad.

Si no está seguro de si alguna de las situaciones anteriores le afecta a usted, **hable con su médico antes de tomar PECTORAL HEBERT N.F.** para comprobar si este medicamento es apropiado para usted.

Consultar nuevamente al médico si la tos seca persiste por más de 5 días, o si junto con la tos se presenta fiebre alta, erupción en la piel, dolor de cabeza continuo.

Uso de otros medicamentos: Ciertos medicamentos pueden interaccionar con PECTORAL HEBERT N.F. en estos casos puede ser necesario cambiar la dosis o interrumpir el tratamiento con alguno de ellos.
Los medicamentos que actúen a nivel del sistema nervioso central pueden potenciarse con el Clofedianol por lo que se desaconseja su uso simultáneo.
Medicamentos que producen depresión del sistema nervioso central o IMAOs (Inhibidores de la Mono Amino Oxidasa, un antidepresivo); el uso simultáneo puede potenciar los efectos depresores.
Si está bajo tratamiento con Disulfiram, no debe utilizar este medicamento.
Bebidas que contienen xantinas (te, café, mate) y supresores del apetito, se debe tener precaución al consumirlas durante el tratamiento.
Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o pudiera tener que utilizar cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta.

Embarazo y Lactancia:
No se recomienda la administración del producto durante el embarazo ni durante el período de lactancia.

Conducción y uso de máquinas:
El uso de este medicamento puede disminuir los reflejos, por lo que se recomienda evitar el uso de vehículos, herramientas o maquinaria que requiera permanente atención y uso de reflejos.

COMO TOMAR PECTORAL HEBERT N.F.:
Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico.
Su médico le indicará la dosis y duración de su tratamiento con PECTORAL HEBERT N.F.
No tome más de la dosis recomendada para su enfermedad.
En caso de duda, consulte nuevamente a su médico o farmacéutico.
Dosis sugerida:
Adultos y mayores de 12 años (más de 40 kilos de peso): 10 ml (4 mg de Bromhexina y 25 mg de Clofedianol) 3 a 4 veces por día.
Dosis máxima:
Adultos y mayores de 12 años (más de 40 Kilos de peso): 40 ml por día (16 mg de Bromhexina por día y 100 mg de Clofedianol por día).

MODO DE CONSERVACION: Conservar en lugar fresco y seco.

EFECTOS INDESEABLES:
Al igual que todos los medicamentos, este puede producir efectos indeseables, aunque no todas las personas los sufran.
Si desarrolla alguno de estos signos, deje de tomar PECTORAL HEBERT N.F. y hable con su médico inmediatamente:
Raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas):
- Reacciones de hipersensibilidad.
- Exantema, urticaria.

Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles):
- Reacciones anafilácticas tales como choque anafiláctico, angioedema (hinchazón de rápida progresión de la piel, de los tejidos subcutáneos, de las mucosas o de los tejidos sub-mucosos) y prurito.
- Reacciones adversas cutáneas intensas (tales como eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson/necrólisis epidérmica tóxica y pustulosis exantematosa generalizada aguda).
- Vértigo, alteraciones visuales, mareos, pesadillas y alucinaciones. Excitación, irritabilidad, fiebre alta.
- Boca seca, nauseas, vómitos.
- Dificultad para respirar o falta de aire.
- Aceleración del pulso.
- Aumento de la transpiración.

RECORDATORIO:
"Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas".
Si toma más PECTORAL HEBERT N.F. del que debe:
Nunca debe tomar más jarabe que el que su médico le recomienda. Si toma demasiado jarabe, busque atención médica inmediatamente.
Se recomienda llevar el envase y esta información para el paciente del medicamento al profesional sanitario.
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.
Hospital de Pediatría Dr. Garrahan: (011) 4943-1455.

Si olvidó tomar PECTORAL HEBERT N.F.:
Es importante que tome PECTORAL HEBERT N.F. como su médico le haya indicado. Si olvida una dosis, limítese a reanudar la toma habitual a las 6 u 8 horas según corresponda. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.
Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

INFORMACION ADICIONAL:
Cada 100 ml de Pectoral Hebert N.F. Jarabe Adultos contiene: Clorhidrato de Bromhexina 40 mg, Clorhidrato de Clofedianol 250 mg.
Los demás componentes son Azúcar, Sacarina sódica, Ácido cítrico anhidro, Hidróxido de sodio, Benzoato de sodio, Esencia de bananas, Tartrazina, Alcohol etílico y Agua desionizada c.s.p.

Antes de utilizar este medicamento, asegúrese de que coincida el nombre del envase secundario (caja), con el nombre que figura en el envase primario (frasco).

¿Dónde puedo obtener más información?
- Su médico o farmacéutico le puede dar más información acerca de PECTORAL HEBERT N.F., o puede comunicarse con Laboratorio FECOFAR de la Federación Argentina de Cooperativas Farmacéuticas Coop. Ltda. al teléfono 011-4482-5522 o por mail: contacto@fecofar.com.ar.

PRESENTACION: Frasco por 100 ml.

Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT: http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Medicamento libre de gluten.
E. M. A. M. S. Certificado Nº: 42.840
Director Técnico: Sergio A. Minguila - Farmacéutico.
Fecha de última revisión: 06/2020

Laboratorios Fecofar
Av. Pte. Juan D. Perón 2742 - B1754AZV - San Justo - Pcia. de Buenos Aires.

FECOFAR
El valor de nuestra marca

Una vez consumido el contenido y/o cumplida la fecha de vencimiento del producto, desechar en forma responsable.
Cuidar el medioambiente es una responsabilidad de todos.