Supositorios de Glicerina Fecofar Adultos

Glicerina

10 SUPOSITORIOS
Venta Libre

PROSPECTO

VENTA LIBRE
Industria Argentina

FECOFAR

Fórmula:
Cada supositorio contiene: Glicerina 2,92 g; Estearato de sodio c.s.p 3,24 g.

Acción terapéutica:
Laxante osmótico.

Indicaciones:
Está indicado exclusivamente cuando no pueda utilizarse la vía oral para el tratamiento sintomático, de corta duración, en caso de constipación cuando las medidas higiénico-dietarias han fracasado.
Para la evacuación del colon antes de estudios radiológicos.

Acción farmacológica:
Estimulante del peristaltismo (movimiento) intestinal, obteniéndose como consecuencia el aumento de la frecuencia de las deposiciones.

Farmacocinética:
La glicerina es un agente osmótico que no se absorbe desde el intestino y es resistente a la digestión.

Posologia y forma de administración:
Puede utilizarse una tijera, para facilitar la extracción del supositorio de su envase. Antes de cada aplicación verifique en el estuche y en su contenido, que el nombre comercial completo, lote y fecha de vencimiento sean coincidentes.
Introducir un supositorio en la ampolla rectal y esperar de 15 a 30 minutos.

Contraindicaciones
Hipersensibilidad a la glicerina.

Advertencias y precauciones:
El abuso en el uso de laxantes puede llevar a dolores abdominales, debilidad, sed, vómitos. Se puede producir una gastroenteropatía perdedora de proteínas y un disbalance hidroelectrolitico. Se desconoce la seguridad de uso de los supositorios de glicerina durante el embarazo y la lactancia. Dado que la constipación puede ser síntoma de afecciones severas se recomienda la consulta médica antes de iniciar un tratamiento con supositorios de glicerina. No utilizar este medicamento por más de 5 días ininterrumpidos. Si el síntoma persiste o empeora consultar con un médico. Solo para uso por vía rectal. Ante todo cuadro de constipación reciente no justificado por un cambio en el modo de vida, o acompañado de dolor, fiebre o distensión abdominal, consultar con un médico antes de utilizar este medicamento. No utilizar en presencia de hemorroides, fisura anal o sangrado anal.

Reacciones adversas:
Ocasionalmente irritación (ardor) perianal.

Sobredosificación:
Aún no se han reportado casos en que haya habido sobredosis no tratada.
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez:
(011) 4962-6666 / 2247.
Hospital Posadas:
(011) 4654-6648 / 4658-7777.

Presentaciones:
Envases conteniendo 10 supositorios

Conservar en lugar fresco y seco.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nº 32.364.
Director Técnico: Sergio A. Minguila, Farmacéutico.
Fecha de última revisión: 11/01

Laboratorios Fecofar
Av. Pte. J. D. Perón 2742
(B1754AZV) San Justo, Pcia. de Buenos Aires.

FECOFAR
El valor de nuestra marca

Una vez consumido el contenido y/o cumplida la fecha de vencimiento del producto, desechar en forma responsable.
Cuidar el medioambiente es una responsabilidad de todos.